ALIVIO RÁPIDO
Cápsula blanda, rapidez de acción

PIONEROS
32 Años tratando el dolor, fiebre e inflamación

ALIVIA EL DOLOR DE

PORTAFOLIO

VER MÁS

PRODUCTOS

BUPREX® FLASH MINI 200mg

BUPREX®
RÁPIDO Y EFECTIVO ALIVIO

BUPREX FLASH MINI 200 MG DE IBUPROFENO EN CÁPSULAS BLANDAS.
Indicado para el alivio rápido de dolor y fiebre asociados a procesos inflamatorios o infecciosos. Usos frecuentes: cefalea, dismenorrea, dolor musculoesquelético postraumático o postquirúrgico, dolor dental (incluyendo extracción), fiebre de cualquier origen excepto la causada por dengue.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN.
Adultos y niños desde 15 años: 200–400 mg cada 6 horas según necesidad. Niños desde 12 años o ≥20 kg: pueden usar cápsulas de 200 mg si pueden deglutir sólidos. La dosis puede repetirse cada 6 horas.
CONTRAINDICACIONES: No debe utilizarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al ibuprofeno o a otros agentes antiinflamatorios no esteroidales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Riesgos AINE: Puede causar úlceras pépticas, sangrado gastrointestinal, descompensación de hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o renal. **Coagulación:** Usar con precaución en pacientes con trastornos hemostáticos o bajo tratamiento anticoagulante. **Embarazo:** Categoría C. Contraindicado en el último trimestre. **Lactancia:** No recomendado. **Pediatría:** Uso con precaución. **Geriatría:** Iniciar con dosis bajas y ajustar según necesidad. No suele afectar estas capacidades, pero pueden presentarse efectos como somnolencia o mareo. No administrar por más de 2–3 días sin indicación médica. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
REGISTRO SANITARIO: BUPREX FLASH mini 200 mg cápsulas blandas,
Reg. San. 9707-MEE-0125

BUPREX® FLASH MINI 400mg

BUPREX®
RÁPIDO Y EFECTIVO ALIVIO

BUPREX FLASH MINI 400 MG DE IBUPROFENO EN CÁPSULAS BLANDAS.
Indicado para el alivio rápido de dolor y fiebre asociados a procesos inflamatorios o infecciosos. Usos frecuentes: cefalea, dismenorrea, dolor musculoesquelético postraumático o postquirúrgico, dolor dental (incluyendo extracción), fiebre de cualquier origen excepto la causada por dengue.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN.
Adultos y niños desde 15 años o ≥20 kg: 400 mg cada 6 - 8 horas según necesidad.
CONTRAINDICACIONES: No debe utilizarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al ibuprofeno o a otros agentes antiinflamatorios no esteroidales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Riesgos AINE: Puede causar úlceras pépticas, sangrado gastrointestinal, descompensación de hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o renal. **Coagulación:** Usar con precaución en pacientes con trastornos hemostáticos o bajo tratamiento anticoagulante. **Embarazo:** Categoría C. Contraindicado en el último trimestre. **Lactancia:** No recomendado. **Pediatría:** Uso con precaución. **Geriatría:** Iniciar con dosis bajas y ajustar según necesidad. No suele afectar estas capacidades, pero pueden presentarse efectos como somnolencia o mareo. No administrar por más de 2–3 días sin indicación médica. Si los síntomas persisten, consultar al médico.

REGISTRO SANITARIO: BUPREX FLASH mini 400 mg cápsulas blandas,
Reg. San. 9703-MEE-0125



BUPREX FORTE®
(SUSPENSIÓN)
Contiene 200 mg de ibuprofeno por cada 5 ml de suspensión.

BUPREX®
(SUSPENSIÓN PEDIÁTRICA)
contiene 100 mg de ibuprofeno por cada 5 ml de suspensión

BUPREX®
(GOTAS SUSPENSIÓN)
Contiene 40 mg de ibuprofeno por 1 ml.

Posee propiedades analgésicas y antipiréticas, efectivo en caso de dolor de tipo periférico, injurias traumáticas de tejidos blandos, dismenorrea primaria y dolor postquirúrgico en intervenciones menores.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
La dosis diaria de 10 mg/kg/dosis, se puede repetir hasta 3 o 4 veces al día. La reducción de la fiebre en niños de 6 meses a 12 años requiere ajustar la dosis considerando la temperatura basal. Si la temperatura basal es inferior a 39.2°C la dosis recomendada es de 5 mg/kg; si la temperatura basal es superior a 39.2°C la dosis recomendada es de 10 mg/kg de peso. CONTRAINDICACIONES: No debe utilizarse con antecedentes de hipersensibilidad a la sustancia, pólipos nasales, angioedema o reacción broncoespástica al ácido acetilsalicílico o a otros agentes antiinflamatorios no esteroidales. Contraindicado su uso en Lupus Eritematoso Sistémico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Podría provocar trastornos gastrointestinales en pacientes sensibles a los antiinflamatorios no esteroidales. Se podrían presentar trastornos visuales y en ese caso se recomienda descontinuar el tratamiento. Utilizar con precaución en descompensación cardiaca, hipertensión, función renal alterada y en pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes o alteraciones de la hemostasia. **Embarazo:** contraindicado en el tercer trimestre. **Lactancia:** no se recomienda su uso. **Pediatría:** se debe utilizar con precaución. **Geriatría:** se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas y de ser necesario realizar reajustes de dosis. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: considerar la posibilidad de reacciones adversas de escasa incidencia, como somnolencia o mareo, pudieran interferir el correcto desarrollo de estas actividades.

REGISTRO SANITARIO: BUPREX® suspensión pediátrica N : 01295-MAC-1-05-11, BUPREX® FORTE N : 02490-MAC-03-03, BUPREX® Gotas N : 02491-MAC-03-03

ARTÍCULOS

LEER MÁS

DOLOR MENSTRUAL: CAUSAS Y SOLUCIONES

LEER MÁS

¿MIGRAÑA U OTRO TIPO DE DOLOR DE CABEZA?



LEER MÁS

FIEBRE EN NIÑOS: CUIDADOS Y PREVENCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

Si considera que uno de nuestros productos ha generado un evento adverso

Repórtelo a través del Formulario de Farmacovigilancia.
Reportar evento adverso – Laboratorios LIFE

LLENAR FORMULARIO

¿Para qué tipo de dolores sirve el Ibuprofeno?
El ibuprofeno ayuda a aliviar dolores leves y moderados, reducir la inflamación y bajar la fiebre. Es útil para dolor de cabeza, muscular, dental, menstrual y molestias por resfriados o lesiones.

- ¿Se puede tomar ibuprofeno en el embarazo?
- ¿Me puse la vacuna de la gripe, puedo tomar ibuprofeno?
- ¿Cada cuántas horas puedo tomar ibuprofeno 400mg?
- ¿Cada cuánto puedo darle ibuprofeno pediátrico a un niño?
- ¿La cápsula blanda tiene el mismo efecto que el comprimido?
- ¿A partir de qué temperatura se considera fiebre?

Referencia: 1. Marca más recomendada por Médicos, según data de prescripciones. Fuente: Close up Mat Febrero 2020. 40.25%

Para más información consulte con su médico de confianza o visita nuestras redes sociales.

BUPREX®
Ibuprofeno

(SE DESPLIEGA LA PRESIONAR EN EL BOTÓN) **VER MÁS**

¡ATENCIÓN!

USO DE LA INFORMACIÓN

La información aquí presentada está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud autorizados para prescribir o dispensar medicamentos.

Si desea conocer más sobre los productos de **Laboratorios LIFE**, le recomendamos consultar directamente con su médico o profesional de confianza.

Laboratorios LIFE no se responsabiliza por el no autorizado de la información contenida en este material.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

¡ATENCIÓN!

USO DE LA INFORMACIÓN

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Laboratorios LIFE no se responsabiliza por publicaciones, promociones o cualquier tipo de contenido relacionado con sus productos o servicios que se difunda a través de cuentas no oficiales.

Asi mismo, **Laboratorios LIFE** no avala, patrocina ni incentiva la creación o difusión de contenidos en redes sociales que no pertenezcan a canales oficiales de la compañía.

ACEPTAR **SALIR**

(SE DESPLIEGA LA PRESIONAR EN PREGUNTAS FRECUENTES)

¿Se puede tomar ibuprofeno en el embarazo?

No se recomienda tomar ibuprofeno durante el embarazo sin indicación médica. A partir de las 20 semanas de gestación puede causar problemas en el bebé y reducir el líquido amniótico.

¿Me puse la vacuna de la gripe, puedo tomar ibuprofeno?

Sí. Si presenta dolor, fiebre o molestias después de vacunarse, puede tomar ibuprofeno siguiendo las indicaciones de uso. No se recomienda tomarlo antes de la vacuna para prevenir síntomas.

¿Cada cuántas horas puedo tomar ibuprofeno 400 mg?

La dosis habitual para adultos es 400 mg cada 6 a 8 horas, según necesidad. No exceda la dosis recomendada ni lo use por varios días sin consultar a un profesional de la salud.

¿Cada cuánto puedo darle ibuprofeno pediátrico a un niño?

La dosis depende de la edad y el peso del niño. Generalmente se administra cada 6 a 8 horas y no más de 3 dosis al día, salvo indicación médica.

¿La cápsula blanda tiene el mismo efecto que el comprimido?

Sí. Ambos contienen el mismo principio activo y ofrecen el mismo efecto terapéutico. La diferencia principal es que la cápsula blanda puede absorberse un poco más rápido.

¿A partir de qué temperatura se considera fiebre?

Generalmente se considera fiebre cuando la temperatura corporal es igual o superior a 38 °C.

¿Para qué tipo de dolores sirve el ibuprofeno?

El ibuprofeno ayuda a aliviar dolores leves y moderados, reducir la inflamación y bajar la fiebre. Es útil para dolor de cabeza, muscular, dental, menstrual y molestias por resfriados o lesiones.

Referencias:

1. FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) 2. CDC y MD Anderson Cancer Center. 3. NHS y NICE (Reino Unido). 4. NHS. 5. Información farmacológica de ibuprofeno (NHS y prospectos oficiales). 6. FDA – Programa de farmacovigilancia MedWatch 7. NHS.