

安徽大学 2016—2017 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

1. 过点 $(1, 0, 1)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ x+2y-z-1=0 \end{cases}$ 的平面方程是 _____.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 $z = \arctan \frac{x-y}{x+y}$, 则 _____.

4. 设 $f(x, y)$ 连续, 直角坐标系下交换积分次序

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x=0$ 处收敛于 _____.

二. 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x-y}{x+y}$ ()

- (A) 等于 0 (B) 等于 $\frac{1}{2}$
 (C) 存在但不等于 0 也不等于 $\frac{1}{2}$ (D) 不存在

2. 二元函数 $z = xy^2 - 4xy - y^2 + 4y$ 在 $(1,0)$ 处 ()

- (A) 不取极值 (B) 取得极小值
 (C) 取得极大值 (D) 不能确定是否取得极值

3. 设曲线 L 是区域 D 的正向边界, 那么 D 的面积为 ()

- (A) $\frac{1}{2} \oint_L ydx - xdy$ (B) $\frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$
 (C) $\oint_L ydx - xdy$ (D) $\oint_L xdy - ydx$

4. 设 $P(x,y)$, $Q(x,y)$ 在单连通区域 D 上具有一阶连续偏导数, 则曲线积分 $\int Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关的充要条件是 ()

- (A) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ (B) $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x}$
 (C) $\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}$ (D) $\frac{\partial Q}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial x}$

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2n+1}$ 的收敛域是 ()

- (A) $(-1,1)$ (B) $[-1,1)$
 (C) $(-1,1]$ (D) $[-1,1]$

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

得分

11. 设函数 f 可微, $y = f(e^x, \cos x, x^2 + 1)$, 求 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$.

12. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程.

14. 求抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点, 使它到直线 $x - y + 4 = 0$ 的距离最近.

13. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z^2 dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$.

14. 设 C 为平面曲线 $x^2 + y^2 = 1$, 计算曲线积分 $\oint_C (x+y)^2 ds$.

得分

15. 计算 $\oint_L (y+x)dx + (2x+y)dy$, 其中 L 是圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 逆时针方向.

16. 计算曲面积分 $\iint_S xdydz + (z+1)dxdy$, 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得分	
----	--

17. 将 $f(x) = \ln x$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

18. 求抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点，使它与直线 $x-y+4=0$ 的距离最近.

五、证明题（每小题 4 分，共 4 分）

得分	
----	--

19. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 发散.

安徽大学 2016—2017 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》(B 卷) 参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. $3x - 2y - z - 2 = 0$; 2. 0; 3. $\frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy$;

4. $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$; 5. 0

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D; 7. A; 8. B; 9. A; 10. C

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 解:

$$\frac{dy}{dx} = f_1'(e^x, \cos x, x^2 + 1)e^x + f_2'(e^x, \cos x, x^2 + 1)(-\sin x) + f_3'(e^x, \cos x, x^2 + 1) \cdot 2x$$

$$\text{故 } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = f_1'(1, 1, 1)$$

..... 10 分

12. 解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6$, $G(x, y, z) = x + y + z$

$$\text{故曲线在点 } (1, -2, 1) \text{ 处的切线向量为 } \vec{\tau} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \{-6, 0, 6\}$$

$$\text{故曲线在点 } (1, -2, 1) \text{ 处切线方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{1}$$

..... 10 分

13. 解: 由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 具有轮换对称性, 知

$$\iint_{\Sigma} z^2 dS = \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{4}{3} \pi R^4$$

..... 10 分

14. 解: $\oint_C (x+y)^2 ds = \oint_C (x^2 + y^2 + 2xy) ds$

C 关于 x 轴对称, 而 $2xy$ 关于 y 是奇函数, 由对称性知

$$\oint_C (x+y)^2 ds = \oint_C (x^2 + y^2 + 2xy) ds = \oint_C (x^2 + y^2) ds = \oint_C ds = 2\pi.$$

..... 10 分

15. 解: 由格林公式,

$$\oint_L (y+x)dx + (2x+y)dy = \iint_{\frac{x^2+y^2}{9} \leq 1} (2-1)dx dy = 6\pi.$$

..... 10 分

16. 解: $\iint_S x dy dz + (z+1) dx dy$

$$= \oiint_{S+S_1} x dy dz + (z+1) dx dy - \iint_{S_1} x dy dz + (z+1) dx dy \text{ 其中 } S_1: x^2+y^2 \leq 1, \text{ 取下侧,}$$

由高斯公式

$$\oiint_{S+S_1} x dy dz + (z+1) dx dy = 2 \iiint_V dx dy dz = \frac{4\pi}{3},$$

$$\iint_{S_1} x dy dz + (z+1) dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi,$$

$$\text{故原式} = \frac{7\pi}{3}.$$

..... 10 分

四、应用题 (每小题 8 分, 共 16 分)

17. 解: $f(x) = \ln x = \ln[2+(x-2)] = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x-2}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n$

其中 $0 < x \leq 4$.

..... 8 分

18. 解: 平面上任一点 (x, y) 到直线 $x-y+4=0$ 的距离

$$d = \frac{|x-y+4|}{\sqrt{2}}.$$

由题意求最短距离等价于求以 $y^2=4x$ 为约束条件时, d^2 的极小值点.

令 $L(x, y, \lambda) = \frac{1}{2}(x-y+4)^2 - \lambda(y^2-4x),$ 4 分

$$\begin{cases} L_x' = (x-y+4) + 4\lambda = 0 \\ L_y' = -(x-y+4) - 2\lambda y = 0, \text{ 解得 } \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases} \\ L_\lambda' = y^2 - 4x = 0 \end{cases}$$

显然 d^2 存在最小值, 所以抛物线 $y^2=4x$ 上的点 $(1, 2)$ 到直线 $x-y+4=0$ 的距离最

短.

安徽大学 2016 8 分

《高等数学 B (二) 8 (二)》考试试卷 (A 卷)
(附答 时间 120 分钟)

五、证明题 (每小题 4 分, 共 4 分)

19. 由 $\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 收敛。

另一方面, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故由级数的性质知, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 发散。

..... 4 分

填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

4 分

1. 设直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交点为 P , 则点 P 的坐标是 $(-1, -2, 3)$ 。

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 。

3. $\int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4}$ 。

4. 平面上的曲线 $y = \sin x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为 $y = 1$ 。

5. 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。