

ANALYSE VAN DE GEGEVENS VAN HET MEETNET

HABITATKWALITEIT TEN BEHOEVE VAN DE

RAPPORTAGE VOOR DE HABITATRICHTLIJN (PERIODE

2013-2018)

Technisch rapport

Toon Westra, An Leyssen, Patrik Oosterlynck, Els Lommelen, Jeroen Vanden Borre,
Steven De Saeger, Bart Vandevoorde, Arno Thomaes, Sam Provoost, Desiré
Paelinckx

RapportNr

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Lijst van figuren	3
Lijst van tabellen	3
Samenvatting	4
English abstract	5
1 Inleiding	6
1.1 Situering	6
1.2 Meetnet habitatkwaliteit	6
1.2.1 Meetnetontwerp	6
1.2.2 Synergie andere meetnetten	7
1.3 Opbouw rapport	7
2 Analysestappen	8
2.1 Inlezen ruwe data	8
2.2 Ruwe data omzetten naar invoerformaat voor LSVI-rekenmodule	8
2.3 Bepalen van meetpuntgewichten	9
2.4 Berekening LSVI per meetpunt	9
2.5 Schatting aandeel habitat met gunstige kwaliteit	11
3 Graslanden, moerassen en zilte graslanden (1330_hpr)	13
3.1 Data	13
3.1.1 Ruwe data uit INBOVEG	13
3.1.2 Geobserveerd habitat(sub)type	13
3.1.3 Overzicht meetpunten	13
3.2 LSVI-berekening per meetpunt	14
3.3 Uitspraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio	15
3.4 Resultaten	15
4 Heidehabitats en soortenrijke glanshavergraslanden	16
4.1 Data	16
4.1.1 Ruwe data	16
4.1.2 Overzicht meetpunten	16
4.2 LSVI-berekening per meetpunt	17
4.2.1 Heide	17
4.2.2 Soortenrijke glanshavergraslanden (6510)	18
4.3 Uitspraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio	18
4.4 Resultaten	18
5 Synergie MONEOS: buitendijkse schorren (1330_da) en wilgenvloedbossen (91E0_sf)	19
5.1 Data	19
5.1.1 Ruwe data uit INBOVEG	19
5.1.2 Structuurvariabelen	19
5.2 Overzicht meetpunten	20
5.3 LSVI-berekening	20
5.4 Uitspraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio	20
5.5 resultaten	21
6 Boshabitats	22
6.1 Data	22

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Tabel 2.1	Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de voorwaarden	10
Tabel 2.2	Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de indicatoren	11
Tabel 2.3	Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de status de habitatvlek . . .	11
Tabel 3.1	Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar	14
Tabel 4.1	Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar	17
Tabel 5.1	Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar	20
Tabel 5.2	Overzicht van het aantal meetpunten waarvoor een vegetatieopname werd uitgevoerd per jaar en het aantal meetpunten met een vegetatieopname in beide jaren (nHerhaling)	21
Tabel 6.1	Aantal opgemeten meetpunten in de 2de Bosinventarisatie (VBI2) en in het meetnet habitatkwaliteit (MHK), en totaal aantal gewenste meetpunten na de meetcyclus van 12 jaar	23
Tabel 6.2	Aantal meetpunten die zowel in de eerste als in de tweede Bosinventarisatie werden opgemeten	24
Tabel 7.1	Aantal meetpunten waarvoor een opname gebeurd is in de periode 2010-2017 en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar	28
Tabel 8.1	Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten	31
Tabel 9.1	Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten	33

Samenvatting

pagina 4 van 37

RapportNr

www.inbo.be

1 INLEIDING

1.1 SITUERING

Om de zes jaar rapporteert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) over de staat van instandhouding van de habitattypen van de Habitatrichtlijn. De meest recente rapportage is terug te vinden in [Paelinckx et al \(2019\)](#). In deze rapportage wordt voor het eerst gebruik gemaakt van gegevens van het meetnet habitatkwaliteit ([Westra et al, 2014](#)) dat INBO en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opstartten in 2014.

De staat van instandhouding van de habitattypen is gebaseerd op volgende onderdelen:

- verspreiding,
- oppervlakte,
- specifieke structuren en functies (incl. habitattypische soorten),
- toekomstperspectieven.

De gegevens van het meetnet habitatkwaliteit worden gebruikt om het onderdeel specifieke structuren en functies te beoordelen. In dit rapport geven we de technische achtergrond van de analyse van deze gegevens in functie van de rapportage van [Paelinckx et al \(2019\)](#).

1.2 MEETNET HABITATKWALITEIT

1.2.1 Meetnetontwerp

Het meetnet habitatkwaliteit bestaat uit een steekproef van meetpunten voor elk habitatype in Vlaanderen, uitgezonderd de zeer zeldzame habitattypen (Westra et al, 2014). De zeer zeldzame habitattypen worden gebiedsdekkend opgevolgd via een kartering.

Voor de terrestrische habitattypen bestaat een meetpunt uit een vierkante plot (3 m x 3 m voor open habitattypen en 9 m x 9 m voor boshabitattypen) waarin een vegetatieopname (INBO, 2016) wordt gemaakt, en een cirkelplot (straal 18 m) waarin bijkomende variabelen worden bepaald die voornamelijk betrekking hebben op de habitatstructuur.

Voor aquatische habitattypen in stilstaande wateren bestaat een meetpunt uit een volledig waterlichaam. Voor aquatische habitattypen in stromende wateren bestaat een meetpunt uit een riviersegment van 100 meter, waarin gegevens worden ingezameld overeenkomstig het veldprotocol van [INBO \(2017b\)](#).

Op basis van de ingezamelde gegevens kunnen voor elk meetpunt de indicatoren van de Lokale Staat van Instandhouding, zowel LSVI versie 2 (T’Jollyn et al, 2009) als LSVI versie 3 (Oosterlyncx et al, 2018), berekend worden. Vervolgens kan op basis hiervan een schatting gemaakt worden van het oppervlakteaandeel van een habitatype in Vlaanderen dat een gunstige habitatkwaliteit heeft.

De meetpunten van het meetnet habitatkwaliteit worden bemonsterd over een periode van 12 jaar (= de meetcyclus), waarbij er getracht wordt elk jaar een random gekozen subset van 1/12de van de meetpunten af te werken. Gezien het meetnet pas in 2014 werd opgestart, is er meestal nog maar een beperkt aandeel van de volledige steekproefgrootte afgerond. Toch kunnen we op basis hiervan al representatieve schattingen maken van het aandeel habitat met gunstige habitatkwaliteit. De precisie zal uiteraard lager zijn, wat zich vertaalt in bredere betrouwbaarheidsintervallen.

Uit de analyse van de informatiebehoefte (Adriaens et al, 2011) bleek dat men een grotere precisie wenste te bekomen binnen Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) en dat men ook een uitspraak over de habitatkwaliteit per habitatsubtype wenste te bekomen. Daarom werd er een relatief groter aantal meetpunten binnen SBZ-H geselecteerd en werden de relatief minder algemene habitatsubtypen overbemonsterd. Wanneer we een representatieve uitspraak willen per habitattypen voor Vlaanderen (zowel binnen als buiten SBZ-H), moeten we hiermee rekening houden. Dit kan door gebruik te maken van meetpuntgewichten (zie paragraaf 2.3).

1.2.2 Synergie andere meetnetten

Voor sommige habitattypen lopen er al langer monitoringprogramma's op basis waarvan de habitatkwaliteit kan ingeschat worden. We maken uiteraard zo veel mogelijk gebruik van de gegevens van deze monitoringprogramma's. Het gaat om de volgende monitoringprogramma's:

- Vlaamse Bosinventarisatie (VBI) voor boshabitattypen (Wouters et al, 2008);
- Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust (PINK) voor kustduinhabitattypen (Provoost et al, 2015);
- Geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde-estuarium (MONEOS) voor wilgenvloedbossen (91E0 sf) en buitendijkse schorren (1330 da) (Van Ryckegem et al, 2018).

1.3 OPBOUW RAPPORT

Eerst overlopen we de generieke stappen van de analyse, gevolgd door een detailbespreking per dataset. Deze datasets komen niet volledig overeen met de habitatypegroepen, wat een gevolg is van de manier waarop de gegevensinzameling georganiseerd is. De gegevensinzameling gebeurt door verschillende teams van zowel het INBO als het ANB, waardoor er hier en daar wat verschillen zijn in de manier waarop de data worden opgeslagen. Voor de analyse is het dan ook eenvoudiger om deze dataset per dataset uit te voeren.

2 ANALYSESTAPPEN

Voor de analyse maken we gebruik van de LSVI-rekenmodule. Dit is een R-package genaamd 'LSVI' ontwikkeld door [Lommelen et al \(2019\)](#). De LSVI-rekenmodule maakt gebruik van een databank met alle kenmerken van de LSVI-indicatoren, zoals soortenlijsten en drempelwaarden voor een gunstige staat. Op basis van deze databank en op basis van terreingegevens berekent de LSVI-rekenmodule de waarden voor de verschillende indicatoren van een bepaald habitat(sub)type. Daarnaast wordt er ook een beoordeling gemaakt per indicator en een geïntegreerde beoordeling over alle indicatoren heen.

De R-code van de analyses voor dit rapport kan geraadpleegd worden op [Github](#).

2.1 INLEZEN RUWE DATA

In een eerste stap worden de ruwe data ingelezen. De meeste gegevens die door INBO worden ingezameld zitten in de [Vlaamse databank vegetatieopnamen \(INBOVEG\)](#). ANB maakt gebruik van FieldMap voor de invoer van terreingegevens. Deze gegevens zitten nog niet in INBOVEG of een andere gecentraliseerde databank. We maken daarom gebruik van een export uit FieldMap onder de vorm van een Acces-bestand.

2.2 RUWE DATA OMZETTEN NAAR INVOERFORMAAT VOOR LSVI-REKENMODULE

De LSVI-rekenmodule vereist een specifiek invoerformaat. Onderstaande onderdelen moeten ingevoerd worden in de rekenmodule.

In eerste instantie moet voor elk meetpunt het habitattype of het habitatsubtype (als het habitattype is opgesplitst in verschillende subtypen) opgegeven worden. Dit is noodzakelijk omdat de LSVI-berekening specifiek is voor elk habitat(sub)type. De informatie m.b.t. habitat(sub)typen wordt ingevoerd via het attribuut **Data_habitat**. Daarnaast worden ook de terreingegevens ingevoerd. Een LSVI-indicator bestaat uit één of meerdere voorwaarden. De indicator 'sleutelsoorten' kan bijvoorbeeld onderverdeeld worden in de voorwaarde 'aantal sleutelsoorten' en de voorwaarde 'bedekking sleutelsoorten'. De gebruiker heeft enerzijds de mogelijkheid om de waarden van de voorwaarden rechtstreeks in te voeren in de LSVI-rekenmodule (bv. aantal sleutelsoorten = 3 en bedekking sleutelsoorten = 10 %). Deze gegevens worden ingevoerd via het attribuut **Data_voorwaarden**. Anderzijds kan ook een lijst met de bedekkingen van de aanwezige soorten ingevoerd worden, op basis waarvan de rekenmodule de waarden berekent voor de voorwaarden. Deze gegevens worden ingevoerd via het attribuut **Data_soortenKenmerken**. Ook andere variabelen op basis waarvan de waarde van voorwaarden berekend kan worden, worden ingegeven via Data_soortenKenmerken. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezige groeiklassen bij boshabitattypen (voor de berekening van de voorwaarde 'aantal groeiklassen') of het grondvlak van de aanwezige boomsoorten (voor de berekening van de voorwaarde 'grondvlakaandeel sleutelsoorten').

Voor elke analyse bewaren we de gegevens die als invoer voor de LSVI-rekenmodule gebruikt worden. We maken voor elke analyse een map 'InputRekenmodule' aan met volgende bestanden:

- data_habitat_naamDataset.csv,
- data_soortenKenmerken_naamDataset.csv,
- data_voorwaarden *naamDataset*.csv.

2.3 BEPALEN VAN MEETPUNTGEWICHTEN

Zoals vermeld in paragraaf 1.2.1 is het meetnet habitatkwaliteit zo ontworpen dat de dichtheid aan meetpunten voor een bepaald habitatype niet overal gelijk is. Meer bepaald zijn er verschillen binnen en buiten SBZ-H (relatief groter aantal meetpunten binnen SBZ-H) en tussen de verschillende habitatsubtypen (relatief groter aantal meetpunten in de minder voorkomende habitatsubtypen). We moeten hiermee rekening houden als we een onvertekende schatting wensen te bekomen voor Vlaanderen. Daarnaast bestaan sommige meetpunten maar gedeeltelijk uit het doelhabitattype. Deze meetpunten vertegenwoordigen dus in mindere mate het doelhabitattype dan de meetpunten die volledig uit doelhabitat bestaan.

Voor de terrestrische habitattypen onderscheiden we twee typen gewichten:

- **Plotgewichten.** Dit is de fractie van de cirkelplot (straal 18 m) die uit doelhabitat bestaat.
- **Stratumgewichten.** In het meetnet habitatkwaliteit kunnen verschillende strata onderscheiden worden. Voor een habitatype dat niet is onderverdeeld in subtypen zijn de strata het deel van het habitatype dat gelegen is binnen SBZ-H en het deel buiten SBZ-H. Voor een habitatype dat wel is onderverdeeld in subtypen worden de strata gevormd door de combinatie van de subtypen en de ligging t.o.v. SBZ-H. De strata zijn in dat geval als volgt: subtype 1 binnen SBZ-H, subtype 1 buiten SBZ-H, subtype 2 binnen SBZ-H, subtype 2 buiten SBZ-H, etc... Voor elk stratum berekenen we de dichtheid van de meetpunten, m.a.w. het aantal (bemonsterde) meetpunten gedeeld door de oppervlakte van het stratum. Om een onvertekende schatting te bekomen voor Vlaanderen moeten we compenseren voor verschillen in de dichtheid van meetpunten tussen de strata. Meer bepaald moeten meetpunten in een stratum met een hogere dichtheid een lager gewicht krijgen dan de meetpunten in een stratum met een lagere dichtheid. Dit kan door een stratumgewicht te gebruiken dat omgekeerd evenredig is met de dichtheid van de meetpunten in het stratum. Dit komt dus neer op de oppervlakte van het stratum gedeeld door het aantal meetpunten in het stratum. Het stratumgewicht kan dus geïnterpreteerd worden als de oppervlakte doelhabitat die elk meetpunt vertegenwoordigt.

Op basis van het plotgewicht en het stratumgewicht bepalen we dan de meetpuntgewichten, namelijk het product van beide gewichten.

De bepaling van de meetpuntgewichten voor stilstaande wateren en de stromende wateren bespreken we in respectievelijk Hoofdstuk 8 en Hoofdstuk 9.

2.4 BEREKENING LSVI PER MEETPUNT

We maken gebruik van de LSVI-rekenmodule om per meetpunt de volgende zaken te berekenen:

- de waarde en beoordeling (gunstig/ongunstig) van de **voorwaarden** ;
- de beoordeling (gunstig/ongunstig) van de **indicatoren**;
- de beoordeling (gunstig/ongunstig) van het **meetpunt/de habitatvlek**.

Tabel 2.1 geeft als voorbeeld de uitkomst van de rekenmodule voor de voorwaarden van LSVI versie 3. De tabel bevat de uitkomst voor twee meetpunten met habitatype 4010 die geïdentificeerd worden op basis van de kolom 'ID'.

Tabel 2.1: Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de voorwaarden

ID	Habitatype	Indicator	Belang	Voorwaarde	Waarde	Operator	Referentiewaarde	Status_voorwaarde	VoorwaardelD	Combinatie
11218	4010	dwergstruiken	b	bedekking dwergstruiken	87.5	>=	B	TRUE	704	704
11218	4010	sleutelsoorten	b	aantal sleutelsoorten	1.0	>=	4	FALSE	329	329 AND 547
11218	4010	sleutelsoorten	b	aantal veenmossen	0.0	>=	1	FALSE	547	329 AND 547
11218	4010	verbossing	b	bedekking verbossing	0.0	<=	10	TRUE	1443	1443
11218	4010	vergrassing	zb	bedekking vergrassing	97.0	<=	50	FALSE	1508	1508
100050	4010	dwergstruiken	b	bedekking dwergstruiken	87.5	>=	B	TRUE	704	704
100050	4010	sleutelsoorten	b	aantal sleutelsoorten	3.0	>=	4	FALSE	329	329 AND 547
100050	4010	sleutelsoorten	b	aantal veenmossen	0.0	>=	1	FALSE	547	329 AND 547
100050	4010	verbossing	b	bedekking verbossing	1.0	<=	10	TRUE	1443	1443
100050	4010	vergrassing	zb	bedekking vergrassing	1.0	<=	50	TRUE	1508	1508

Tabel 2.2: Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de indicatoren

ID	Habitattype	Indicator	Belang	Status_indicator
11218	4010	dwergruiken	b	TRUE
11218	4010	sleutelsoorten	b	FALSE
11218	4010	verbossing	b	TRUE
11218	4010	vergrassing	zb	FALSE
100050	4010	dwergruiken	b	TRUE
100050	4010	sleutelsoorten	b	FALSE
100050	4010	verbossing	b	TRUE
100050	4010	vergrassing	zb	TRUE

Tabel 2.3: Voorbeeld van de output van de LSVI-rekenmodule voor de status de habitatvlek

ID	Habitattype	Status_habitatvlek
11218	4010	FALSE
100050	4010	TRUE

- Voorwaarden_*naamDataset*.csv
- Indicatoren_*naamDataset*.csv
- StatusHabitatvlek *naamDataset*.csv

2.5

Op basis van de beoordelingen per meetpunt maken we per habitattype een schatting van het aandeel habitat dat gunstig is en berekenen we het bijhorende 95%-betrouwbaarheidsinterval. We doen dit zowel voor Vlaanderen als voor het deel van Vlaanderen dat in de Atlantische biogeografische regio gelegen is (het deel van Vlaanderen zonder Voeren). Voor veel habitattypen is het onderscheid tussen Vlaanderen en Vlaanderen-Atlantisch evenwel niet relevant, omdat het habitattype enkel in de Atlantische regio voorkomt (bv. kusthabitattypen) of omdat de gebruikte dataset nog geen bemonsterde meetpunten uit Voeren bevat.

Naast een schatting per habitatype maken we ook een schatting van het aandeel:

- per habitatsubtype,
- per habitatype binnen SBZ-H,
- per habitatype buiten SBZ-H.

We schatten de betrouwbaarheidsintervallen op basis van een binomiaal model, zodat deze steeds tussen de 0 en 100% gelegen zijn. Om de meetpuntgewichten op een correcte wijze toe te passen in de analyse, maken we gebruik van het R-package survey (Lumley, 2019).

Het resultaat wordt weggeschreven in het bestand `StatusHabitat naamDataset.csv`.

Tabel 3.1: Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar

HabCode	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
1330_hpr	Binnen	16	73
1330_hpr	Buiten	0	21
6120	Binnen	4	98
6120	Buiten	0	38
6230_ha	Binnen	15	72
6230_ha	Buiten	3	17
6230_hmo	Binnen	20	58
6230_hmo	Buiten	3	11
6230_hn	Binnen	17	49
6230_hn	Buiten	8	34
6230_hnk	Binnen	1	2
6230_hnk	Buiten	0	0
6410_mo	Binnen	23	29
6410_mo	Buiten	9	23
6410_ve	Binnen	11	97
6410_ve	Buiten	1	25
7140_meso	Binnen	23	87
7140_meso	Buiten	0	13
7140_oli	Binnen	11	73
7140_oli	Buiten	0	1

3.2 LSVI-BEREKENING PER MEETPUNT

De onderstaande voorwaarden werden bepaald in de cirkelplot en de waarden ervan worden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule (via attribuut data_voorwaarden, zie paragraaf 2.2).

- bedekking strooisellaag
- bedekking structuurschade
- bedekking verbossing
- bedekking microreliëf
- microreliëf aanwezig
- bedekking naakte bodem

Eén van de voorwaarden van de indicator ‘verruiging/vermossing/vergrassing’ uit LSVI versie 2.0 van circum-neutraal overgangsveen (7140_meso) kan niet berekend worden, namelijk de voorwaarde ‘gemiddelde vegetatiehoogte in cm’. De status van deze indicator evalueren we daarom enkel op basis van de voorwaarde ‘bedekking verruiging/vergrassing/vermossing’.

Onderstaande indicatoren konden niet bepaald worden en werden daarom niet meegerekend bij de bepaling van de status per meetpunt:

- Horizontale structuur voor habitatsubtype 1330_hpr (LSVI versie 2 en LSVI versie 3)
- Horizontale structuur voor habitatsubtype 7140_oli en 7140_meso (LSVI versie 2)

3.3 UITSpraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio

3.4 RESULTATEN

www.inbo.be
RapportNr
pagina 15 van 37

4 HEIDEHABITATS EN SOORTENRIJKE GLANSHAVER-GRASLANDEN

4.1 DATA

4.1.1 Ruwe data

De heidehabitats (2310, 2330, 4010, 4030) en het habitatype soortenrijke glanshavergraslanden (6510) worden opgemeten door het ANB, die de gegevens invoeren in Fieldmap. De gegevens worden vervolgens vanuit Fieldmap naar een Access-bestand geëxporteerd en aangeleverd aan het INBO.

Dit Access-bestand bevat:

- Geobserveerde habitattypen in de meetpunten,
- Vegetatieopname in de vierkante plot,
- Structuurgegevens in de cirkelplot.

4.1.2 Overzicht meetpunten

Tabel 4.1 geeft een overzicht van het huidige aantal opgemeten meetpunten en de totale steekproefgrootte die we na 12 jaar willen bereiken.

Tabel 4.1: Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar

HabCode	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
2310	Binnen	52	169
2310	Buiten	0	7
2330_bu	Binnen	35	160
2330_bu	Buiten	2	19
4010	Binnen	31	168
4010	Buiten	0	3
4030	Binnen	35	169
4030	Buiten	2	13
6510_hu	Binnen	26	141
6510_hu	Buiten	4	59
6510_hua	Binnen	0	0
6510_hua	Buiten	7	73
6510_huk	Binnen	5	52
6510_huk	Buiten	1	19
6510_hus	Binnen	3	44
6510_hus	Buiten	3	13

4.2 LSVI-BEREKENING PER MEETPUNT

4.2.1 Heide

Voor de heidehabitats worden de volgende voorwaarden afgeleid uit de gegevens ingezameld in de cirkelplot en worden de waarden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule:

- bedekking verbossing,
- bedekking dwergstruiken,
- bedekking korstmosvegetaties,
- climax- of degeneratiestadium aanwezig,
- aantal ouderdomsstadia,
- aantal talrijke ouderdomsstadia,
- aantal ontwikkelingsstadia,
- bedekking moslaag,
- bedekking veenmoslaag,
- bedekking naakte bodem,
- bedekking open vegetaties,
- bedekking open zand.

De indicator ‘mozaïek met 2330’ leiden we af uit de Habitatkaart (De Saeger et al, 2018). Ook de waarde van deze voorwaarde wordt rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule.

De indicator 'horizontale structuur' met voorwaarde 'afwisseling dopheidebulten en natte slenken' van LSVI versie 2.0 van habitatype 4010 kan niet bepaald worden en wordt daarom niet meegerekend in de verdere analyse.

De overige voorwaarden van de heidehabitats berekent de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatie-opname in de vierkante plot.

4.2.2 Soortenrijke glanshavergraslanden (6510)

Voor habitatype 6510 bepalen we enkel de voorwaarde 'bedekking verbossing' op het niveau van de cirkelplot. De waarde voeren we rechtstreeks in in de LSVI-rekenmodule. Alle andere voorwaarden worden berekend op basis van de vegetatieopname in de vierkante plot.

4.3 UITSpraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio

Enkel voor habitat 6510 maken we een onderscheid tussen Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio. De opgemeten meetpunten van de heidehabitats liggen allemaal in de Atlantische regio.

4.4 RESULTATEN

De resultaten worden weggeschreven in de folder 'AnalyseHeide6510_2018-11-13'.

5 SYNERGIE MONEOS: BUITENDIJKSE SCHORREN (1330_DA) EN WILGENVLOEDBOSSEN (91E0_SF)

5.1 DATA

5.1.1 Ruwe data uit INBOVEG

De INBOVEG-databank bevat de volgende gegevens voor elk meetpunt:

- vegetatieopname (lijst van alle aanwezige soorten + bedekking per soort),
- bedekking van vegetatielagen.

5.1.2 Structuurvariabelen

5.1.2.1 Wilgenvloedbossen (91E0_sf)

De structuurvariabelen zitten niet in INBOVEG en werden aangeleverd als een afzonderlijk Excel-bestand. Voor habitat 91E0 sf gaat het om de onderstaande voorwaarden:

- aantal groeiklassen aanwezig,
- groeiklasse 5, 6 of 7 aanwezig,
- aantal exemplaren dik dood hout per ha,
- aandeel dood hout,
- grondvlak sleutelsoorten boom- en struiklaag.

Deze voorwaarden worden rechtstreeks op het terrein ingeschat en dus niet afgeleid uit een dendrometrische opname zoals bij de overige boshabitats (zie Hoofdstuk 6). De waarden worden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule.

De volgende voorwaarde kon niet bepaald worden en wordt daarom niet meegerekend in de verdere analyse:

- aandeel overstromende vloedten.

De overige voorwaarden worden berekend via de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatieopname.

5.1.2.2 Buitendijkse schorren (1330_da)

De structuurvariabelen zitten niet in INBOVEG en werden aangeleverd als afzonderlijk Excel-bestand. Voor de buitendijkse schorren (1330_da) gaat het om de onderstaande voorwaarden:

- zowel lage als hoge schorvegetaties aanwezig,
- aanwezigheid kreken, oeverwallen en kommen,
- bedekking riet,
- schorklifvegetaties aanwezig,
- aanwezigheid schorklif/breuksteenbestorting,
- habitatype lager dan het klif,
- intertidale ruimte ter hoogte van gemiddelde hoogwaterstand (GHW) aanwezig.

Deze voorwaarden werden bepaald op het niveau van een schor. Dit betekent dat alle meetpunten die binnen een zelfde schor gelegen zijn, dezelfde waarde voor deze voorwaarden hebben. De waarden van deze voorwaarden worden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule.

De volgende variabele kon niet bepaald worden en wordt daarom niet meegerekend in de verdere analyse:

- structuurvariatie binnen de verschillende zones aanwezig.

Alle overige voorwaarden worden berekend via de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatieopname.

5.2 OVERZICHT MEETPUNTEN

Tabel 5.1 geeft een overzicht van het huidige aantal meetpunten binnen MONEOS en de totale steekproefgrootte die we na 12 jaar willen bereiken. Tabel 5.2 geeft een overzicht van de uitgevoerde vegetatieopnames in de meetpunten. Voor heel wat meetpunten werden zowel in 1995 als in 2013 een vegetatieopname uitgevoerd. Maar de structuurgegevens werden enkel in 2018 bepaald. Daarom zullen we enkel gebruik maken van de vegetatiegegevens uit 2013.

Tabel 5.1: Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar

Habitatype	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
1330_da	Binnen	67	79
1330_da	Buiten	0	6
91E0_sf	Binnen	29	67
91E0_sf	Buiten	1	11

5.3 LSVI-BEREKENING

De indicator 'verruiging' van habitatsubtype 1330_da is enkel van toepassing voor zoutwaterschor. Gezien alle meetpunten in brakwaterschor gelegen zijn, wordt deze indicator niet meegerekend in de analyse.

De indicator 'sleutelsoorten' bestaat uit twee voorwaarden: 'aantal sleutelsoorten hoog schor' en 'aantal sleutelsoorten laag schor'. De indicator is gunstig als beide voorwaarden gunstig scoren. De indicator wordt echter beoordeeld op basis van een vegetatieopname in een plot van 3m x 3m die ofwel in hoog schor ofwel in laag schor gelegen is, waardoor er niet aan beide voorwaarden kan worden voldaan. Daarom beoordelen we in deze analyse de indicator 'sleutelsoorten' als gunstig wanneer (minstens) één van beide voorwaarden gunstig scoort.

Tabel 5.2: Overzicht van het aantal meetpunten waarvoor een vegetatieopname werd uitgevoerd per jaar en het aantal meetpunten met een vegetatieopname in beide jaren (nHerhaling)

Habitatype	SBZH	Jaar	nOpgemeten	nHerhaling
1330_da	Binnen	1995	33	33
1330_da	Binnen	2013	67	
91E0_sf	Binnen	1995	27	27
91E0_sf	Binnen	2013	29	
91E0_sf	Buiten	1995	1	1
91E0_sf	Buiten	2013	1	

5.4 UITSPRAAK VLAANDEREN EN DE VLAAMS-ATLANTISCHE REGIO

Voor habitatype 1330 (Atlantische schorren) maken we een schatting van het aandeel habitat dat gunstig is in Vlaanderen en berekenen we het bijhorende 95%-betrouwbaarheidsinterval. Hiervoor gebruiken we de resultaten voor subtype 1330_da (buitendijkse schorren) en 1330_hpr (zilte graslanden) (zie [hoofdstuk@ref\(h:GrasMoeras\)](#)). Voor het habitatsubtype 1330_da gebruiken we de resultaten gebaseerd op de opnames die dateren van 2013.

De resultaten voor 91E0_sf worden geïntegreerd in de analyse van de boshabitats (zie paragraaf 6).

5.5 RESULTATEN

De resultaten zijn terug te vinden in de folder 'AnalyseMONEOS_2019-01-14'.

6 BOSHABITATS

Voor de boshabitats maken we gebruik van meetpunten uit de Bosinventarisatie (Wouters et al, 2008) en van bijkomende meetpunten uit het meetnet habitatkwaliteit (Westra et al, 2014).

6.1 DATA

6.1.1 Ruwe Data

6.1.1.1 Bosinventarisatie

Een groot deel van de gegevens voor de boshabitats wordt via de Bosinventarisatie ingezameld. De gegevens van de tweede Bosinventarisatie (2009 - 2018) worden door ANB ingevoerd in Fieldmap. De gegevens worden vervolgens vanuit Fieldmap naar een Access-bestand geëxporteerd en aangeleverd aan het INBO. Ook de gegevens van de eerste Bosinventarisatie (1997 - 1999) zitten in een Access-bestand.

Deze Access-bestanden bevatten:

- een vegetatieopname in de vierkante plot,
- dendrometrische gegevens in de cirkelplot,
- een bestandsbeschrijving in de cirkelplot.

Het habitattype waarin elk meetpunt gelegen is, werd niet op het terrein bepaald (dit zal in de toekomst wel gebeuren). Daarom maken we (1) een overlay tussen de meetpunten van de Bosinventarisatie en de Habitatkaart ([De Saeger et al, 2018](#)) om te bepalen welke punten in boshabitat vallen, waarna we vervolgens (2) de punten selecteren die in een polygoon van de Habitatkaart vallen met meer dan 50% van een bepaald boshabitatype.

6.1.1.2 Bijkomende meetpunten van Habitatkwaliteitsmeetnet

De gegevens van het Habitatkwaliteitsmeetnet (Westra et al, 2014) worden eveneens ingezameld door ANB en aangeleverd aan INBO onder de vorm van een Access-bestand. De meetpunten worden op dezelfde manier opgemeten als in de Bosinventarisatie. Bijkomend wordt ook het habitatype per meetpunt bepaald.

6.1.2 Overzicht meetpunten

Tabel 6.1 geeft een overzicht van het aantal opgemeten meetpunten in de tweede Bosinventarisatie en het Habitatkwaliteitsmeetnet, en de totale steekproefgrootte die we na 12 jaar willen bereiken. Deze dataset gebruiken we om de toestand te schatten: het huidige aandeel habitat in een gunstige staat.

Tabel 6.1: Aantal opgemeten meetpunten in de 2de Bosinventarisatie (VBI2) en in het meetnet habitat-kwaliteit (MHK), en totaal aantal gewenste meetpunten na de meetcyclus van 12 jaar

HabCode	SBZH	nOpgemeten VBI2	nOpgemeten MHK	nOpgemeten totaal	nGewenst
9110	Binnen	2	0	2	0
9110	Buiten	1	0	1	0
9120	Binnen	141	1	142	160
9120	Buiten	121	0	121	37
9130_end	Binnen	27	2	29	165
9130_end	Buiten	8	1	9	31
9160	Binnen	24	3	27	168
9160	Buiten	17	2	19	36
9190	Binnen	27	3	30	168
9190	Buiten	27	1	28	47
91E0_va	Binnen	30	0	30	42
91E0_va	Buiten	21	0	21	48
91E0_vc	Binnen	1	14	15	46
91E0_vc	Buiten	3	7	10	33
91E0_vm	Binnen	27	1	28	50
91E0_vm	Buiten	8	1	9	30
91E0_vn	Binnen	7	0	7	46
91E0_vn	Buiten	32	0	32	46
91E0_vo	Binnen	9	6	15	58
91E0_vo	Buiten	2	1	3	21

Voor het schatten van veranderingen in habitatkwaliteit gebruiken we meetpunten die zowel in de eerste als in de tweede Bosinventarisatie werden opgemeten. In de eerste Bosinventarisatie werden meetpunten die op een bosrand liggen, verplaatst naar homogeen bos. Tijdens de tweede Bosinventarisatie werden deze meetpunten echter terug naar de oorspronkelijke locatie verplaatst omdat dit een meer representatief beeld geeft van het bos in Vlaanderen (Wouters et al, 2008). We maken geen gebruik van deze verplaatste punten om de veranderingen in habitatkwaliteit te analyseren.

Tabel 6.2 geeft een overzicht van het aantal meetpunten die:

- zowel in de eerste als in de tweede Bosinventarisatie werden opgemeten EN
- die niet werden verplaatst in de eerste Bosinventarisatie EN
- waarvoor zowel een dendrometrische opname als een vegetatieopname werd uitgevoerd (in de eerste Bosinventarisatie werd slechts in de helft van de meetpunten een vegetatieopname uitgevoerd).

Deze dataset gebruiken we om veranderingen te schatten in het aandeel habitat met gunstige kwaliteit tussen de periode 1997 - 1999 (eerste Bosinventarisatie) en de periode 2009 - 2018 (tweede Bosinventarisatie).

6.4 RESULTATEN

De resultaten worden weggeschreven in de folder 'AnalyseBoshabitats_2019-01-15'.

7 SYNERGIE PINK: KUSTDUINHABITATS

7.1 EMBRYONALE DUINEN (2110)

Voor het habitatype embryonale duinen (2110) werd geen meetnet ontwikkeld omdat het om een zeer dynamisch habitatype gaat ([Westra et al, 2014](#)). In de plaats daarvan wordt de habitatkwaliteit ingeschat via kartering. De kartering werd uitgevoerd in het kader van PINK ([Provoost et al, 2015](#)).

7.1.1 Data

De karteergegevens werden aangeleverd onder de vorm van een Excel-bestand met per polygoon een aantal structuur- en vegetatiegegevens waaruit het merendeel van de verschillende indicatoren/voorwaarden afgeleid kunnen worden.

7.1.2 LSVI-berekening

De waarden van alle voorwaarden worden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule. Voor de voorwaarden 'sleutelsoorten structuurvormend' en 'bedekking Biestarwegras' waren er echter geen gegevens beschikbaar. Beide voorwaarden beschouwen we steeds als gunstig voor alle polygonen op basis van expertinschatting.

Op basis van de LSVI-rekenmodule berekenen we voor elke polygoon van de kartering de habitatkwaliteit. De verhouding van de oppervlakte polygonen in een gunstige staat t.o.v. de totale gekarteerde oppervlakte geeft dan het aandeel habitat in een gunstige staat.

7.2 OVERIGE KUSTDUINHABITATS

Voor de habitattypen vastgelegde duinen (2130), duindoornstruwelen (2160), kruipwilgstruwelen (2170) en vochtige duinvalleien (2190) maken we gebruik van vegetatieopnames in vierkante proefvlakken van 3 m x 3 m die uitgevoerd werden in het kader van PINK.

7.2.1 Data

7.2.1.1 Ruwe data uit INBOVEG

De INBOVEG-databank bevat de volgende gegevens voor elke meetpunt:

- vegetatieopname (lijst van alle aanwezige soorten + bedekking per soort),

- bedekking van vegetatielagen.

7.2.1.2 Geobserveerd habitatype

De shapefile 'PQ_Duinen_20180420' bevat de ligging van de meetpunten en het geobserveerde habitatype. Elk meetpunt heeft een ID waarmee de link naar de opname in INBOVEG kan worden gemaakt.

7.2.1.3 Gegevens verbossing voor duindoornstruwelen

Voor het beoordelen van de voorwaarde 'verbossing' bij het habitatype duindoornstruwelen (2160) maken we gebruik van karteergegevens. De inschatting van verbossing op basis van een kartering is nauwkeuriger dan deze afgeleid uit een vegetatieopname in een proefvlak van 3m x 3m.

7.2.1.4 Overzicht meetpunten

Tabel 7.1 geeft een overzicht van het aantal meetpunten binnen PINK waarvoor een opname is gebeurd in de periode 2010-2017 en de totale steekproefgrootte die we na 12 jaar willen bereiken. Daarbij moet opgemerkt worden dat alle meetpunten binnen ANB-domeinen gelegen zijn en bepaalde beheervormen relatief vaker bemonsterd zijn dan anderen. De meetpunten vormen dus geen representatieve steekproef voor Vlaanderen.

Tabel 7.1: Aantal meetpunten waarvoor een opname gebeurd is in de periode 2010-2017 en totaal aantal gewenste meetpunten na meetcyclus van 12 jaar

Habitatype	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
2130_had	Binnen	29	73
2130_had	Buiten	0	2
2130_hd	Binnen	159	135
2130_hd	Buiten	0	7
2160	Binnen	41	165
2160	Buiten	0	6
2170	Binnen	11	126
2170	Buiten	0	1
2190	Binnen	34	50
2190	Buiten	0	1
2190_mp	Binnen	44	77
2190_mp	Buiten	0	0

7.2.2 LSVI-berekening per meetpunt

Er zijn geen gegevens beschikbaar om de indicator 'horizontale structuur' van het habitatype duindoornstruwelen (2160) te beoordelen. Deze indicator is gebaseerd op de aanwezigheid van open plekken en het aantal struweeltypes. Ook voor de indicator 'ouderdomsstructuur Duindoorn' van habitatype 2160 zijn er geen gegevens beschikbaar om de beoordeling te kunnen uitvoeren. Beide indicatoren worden daarom niet meegenomen in de verdere analyse.

Verder geven we enkel voor de voorwaarde 'verbossing' bij habitattype 2160 de waarden rechtstreeks in in de LSVI-rekenmodule. De waarden voor de overige voorwaarden worden berekend door de LSVI-rekenmodule op basis van de gegevens van de vegetatieopname.

Voor het habitatype 2190 is er maar één beoordelingstabel beschikbaar in T'Jollyn et al (2009) en Oosterlynck et al (2018), namelijk deze voor het subtype 'duinpannen met kalkminnende vegetaties' (2190_mp). Meetpunten met habitatype 2190 die niet tot het subtype 2190_mp behoren worden daarom beoordeeld op basis van de LSVI-beoordelingstabel van 2190_mp.

7.2.3 Uitspraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio

De kustduinen liggen allemaal in de Atlantische regio. Bijgevolg gelden de resultaten voor Vlaanderen evenzeer voor de Vlaams-Atlantische regio.

7.3 RESULTATEN

De resultaten worden weggeschreven in de folder 'AnalysePINK_2019-01-14':

8 STILSTAANDE WATEREN

8.1 DATA

8.1.1 Ruwe data uit INBOVEG

Het veldwerk voor een LSVI-opname van een meetpunt in stilstaande wateren bestaat uit een vegetatieopname van een volledige plas. De werkwijze hiervoor is beschreven door [Oosterlynck et al \(2018\)](#) en [Westra et al \(2014\)](#). Zowel de gegevens voor de toepassing van LSVI-versie 2 ([T'Jollyn et al, 2009](#)) als voor versie 3 ([Oosterlynck et al, 2018](#)) werden tijdens het veldwerk genoteerd.

De ruwe data gebruikt voor de LSVI-bepalingen in functie van de Natura 2000-rapportage 2013-2018 zijn opgenomen in INBOVEG (survey 196: HT31xx_LSVIPlassen). Enkel waarnemingen met een zekere habitat-classificatie werden opgenomen in de analyse (Classification: NotSure = 0). De oudste opname dateert van 1-09-2014; de recentste opname is van 19-10-2018. De INBOVEG databank bevat, naast algemene informatie (datum, waarnemer, locatie, locatiecode), de volgende gegevens voor elk meetpunt:

- habitatype,
- beperkte vegetatieopname: 6-delige Tansley-schatting per sleutelsoort en per verstoringsindicator,
- procentuele bedekking van verstoringsindicatoren,
- structuurvariabelen die nodig zijn voor de LSVI-berekening (afhankelijk van het habitat(sub)type).

Via een MS Access-frontend (iv-query-prd_versie2_LSVIMeren.mdb) werd INBOVEG bevraagd; deze gegevens werden via een koppeling ingeladen in excelbestand. In dit excelbestand zijn ook tabellen opgenomen voor de omzetting van klassen en tekst zodat de data omgevormd kan worden tot een geschikt formaat voor de LSVI-rekenmodule.

8.1.2 Ruwe data uit LIMS databank

Voor de LSVI-bepaling van habitattype 3160 (versie 2) zijn metingen van het elektrisch geleidingsvermogen nodig. Dit werd gemeten tijdens de staalname in het kader van de projecten 'Platform Passende Beoordeling, partim abiotiek oppervlaktewater' (INBOPRJ-10798) en 'Meetnet abiotiek Natura 2000 habitattypen: oppervlaktewater' (INBOPRJ-9430). De meetresultaten zijn opgeslagen in de LIMS-databank. De metingen werden meermaals per staalnamejaar uitgevoerd; het gemiddelde ervan werd berekend en gebruikt in de analyse.

8.1.3 Overzicht meetpunten

Tabel 8.1 geeft een overzicht van het huidige aantal opgemeten meetpunten en de totale steekproefgrootte. Habitattype 3110 en 3140 worden integraal bemonsterd. Dit betekent dat alle gekende waterlichamen die tot deze habitattypen behoren, worden opgemeten. Het gewenste aantal meetpunten voor deze habitattypes zijn gebaseerd op de meest recente versie van de Habitatkaart (De Saeger et al, 2018) en kunnen daarom verschillen van deze vermeld in (Westra et al, 2014).

Tabel 8.1: Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten

HabCode	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
3110	Binnen	2	5
3130	Binnen	71	109
3130	Buiten	7	29
3140	Binnen	16	18
3140	Buiten	3	14
3150	Binnen	24	53
3150	Buiten	5	24
3160	Binnen	23	31
3160	Buiten	2	5

8.2 LSVI-BEREKENING PER MEETPUNT

Voor het merendeel van de voorwaarden worden de waarden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule. Enkel de voorwaarden met betrekking tot sleutelsoorten en de voorwaarde 'bedekking helofyten' (habitattype 3130_aom) worden berekend door de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatiegegevens.

De indicator 'doorzicht' wordt beoordeeld op basis van de secchidiepte. Wanneer de bodem zichtbaar is, zullen we deze indicator steeds als gunstig beschouwen onafhankelijk van de diepte van het waterlichaam. Dit doen we in de praktijk door een secchidiepte van 4 meter in te geven in de rekenmodule. Deze waarde is groter dan de referentiewaarde, wat dus resulteert in een gunstige beoordeling. Ook bij droogval beschouwen we de indicator gunstig en gaan we op dezelfde manier te werk.

8.3 UITSPRAAK VLAANDEREN EN DE VLAAMS-ATLANTISCHE REGIO

Gezien er geen meetpunten in de Vlaams-Continental regio gelegen zijn, is de uitspraak voor Vlaanderen dezelfde als deze voor de Vlaams-Atlantische regio. De werkwijze om tot een uitspraak voor Vlaanderen te komen, is verschillend voor een steekproefbenadering en een integrale bemonstering.

8.3.1 Steekproefbenadering (3130, 3150, 3160)

Voor de habitattypen 3130, 3150 en 3160 maken we gebruik van een steekproef om tot een uitspraak te komen voor Vlaanderen. Net zoals voor de terrestrische habitats, zullen we op basis van de steekproef een schatting maken van het oppervlakteaandeel habitat in een gunstige staat met bijhorende betrouwbaarheidsintervallen.

Om tot een representatieve uitspraak te komen, moeten we ook hier gebruik maken van meetpuntgewichten (zie paragraaf 2.3). De strata worden bij de stilstaande wateren gevormd door een combinatie van de ligging t.o.v. SBZH (binnen SBZH en buiten SBZH) en de oppervlakteklassen van de waterlichamen (< 1 ha; 1 - 5 ha; 5 - 50 ha) (Westra et al, 2014). Het stratumgewicht is omgekeerd evenredig met het oppervlakteaandeel van de stilstaande wateren dat bemonsterd is binnen elk stratum. Het gewicht van het

waterlichaam is evenredig met de oppervlakte van het waterlichaam. Dus niet de oppervlakte aan habitat, maar de oppervlakte van het volledige waterlichaam wordt gebruikt voor de weging. Het meetpuntgewicht is dan het product van het stratumgewicht en het gewicht van het waterlichaam.

8.3.2 Integrale bemonstering (3110, 3140 en plassen > 50 ha)

Voor habitattype 3110 en 3140 en voor de stilstaande wateren die habitat bevatten en een oppervlakte hebben groter dan 50 hectare, wordt er een integrale bemonstering uitgevoerd van alle waterlichamen. Omdat de eerste monitoringscyclus nog niet volledig is afgewerkt, zijn nog niet alle veldgegevens beschikbaar. Enkel van de opgemeten plassen kan de status worden berekend en wordt de oppervlakte meegerekend in het oppervlakteaandeel gunstig of ongunstig. De oppervlakte van het waterlichaamsen die nog niet zijn gemeten wordt bij de categorie 'onbekend' gerekend ('area where condition is not known').

8.3.3 Combinatie steekproef en integrale bemonstering

Voor habitattype 3130 en 3150 bestaat het meetnet uit een steekproef van de waterlichamen met een oppervlakte kleiner dan 50 hectare en een integrale bemonstering van de waterlichamen groter dan 50 hectare. Om een gecombineerde schatting te bekomen, wordt eerst de oppervlakte habitat met een gunstige staat geschat voor de waterlichamen kleiner dan 50 hectare met bijhorende betrouwbaarheidsintervallen. Vervolgens wordt de oppervlakte van de plassen groter dan 50 hectare met een gunstige kwaliteit hierbij opgeteld.

8.4 RESULTATEN

De resultaten zijn terug te vinden in de folder 'AnalyseMeren 2018-11-06'.

9 STROMENDE WATEREN (3260)

9.1 DATA

9.1.1 Ruwe data uit macrofytendatabank waterlopen

Van de 'macrofytendatabank waterlopen' (versie 1.4; 31/07/2018) werden de volgende opnames gebruikt:

- VMM-opnames: vegetatieopnames van VMM verzameld voor de rapportage van de Europese Kaderrichtlijn Water (opnames van 11 juni 2013 - 28 september 2017)
- INBO-opnames: vegetatieopnames van INBO verzameld voor de habitatkwaliteitsmonitoring van habitattype 3260 (opnames van 18 juni 2015 - 5 september 2017; eveneens beschikbaar via INBOVEG: survey HT3260)

Van beide datasets werden enkel de opnames gebruikt die het habitattype bevatten volgens de habitatdefinitie en soortenlijst vermeld door (Leyssen et al, 2018).

De databank bevat, naast algemene informatie (datum, waarnemer, locatie, locatiecode, meetnet), de volgende gegevens voor elk meetpunt:

- vegetatieopname van 100m-traject met een 7-delige Tansley-schaal,
- procentuele bedekking van verstoringindicatoren (helofyten, eutrofiëringsindicatoren en invasieve exoten),
- structuurvariabelen die nodig zijn voor de LSVI-berekening (oppervlakte grootste vegetatievlek en aantal groeivormen).

9.1.2 Overzicht meetpunten

Tabel 9.1 geeft een overzicht van het huidige aantal opgemeten meetpunten en de totale steekproefgrootte na 12 jaar.

Tabel 9.1: Aantal opgemeten meetpunten en totaal aantal gewenste meetpunten

HabCode	SBZH	nOpgemeten	nGewenst
3260	Binnen	34	150
3260	Buiten	12	26

9.2 LSVI-BEREKENING PER MEETPUNT

Voor het merendeel van de voorwaarden worden de waarden rechtstreeks ingevoerd in de LSVI-rekenmodule. De voorwaarden met betrekking tot sleutelsoorten worden echter berekend door de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatiegegevens. Bij de VMM-opnames werd het percentage invasieve exoten niet genoteerd tijdens het veldbezoek. Voor deze opnames wordt de voorwaarde berekend door de LSVI-rekenmodule op basis van de vegetatieopname. Voor de VMM-opnames ontbreekt ook de voorwaarde 'grootste vegetatievlak in m²'. Deze voorwaarde kan niet afgeleid worden uit de vegetatieopname, wat dus resulteert in een ontbrekende waarde.

9.3 UITSpraak Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio

We maken opnieuw gebruik van meetpuntgewichten om tot een representatieve uitspraak te komen voor Vlaanderen en de Vlaams-Atlantische regio. Het habitatkwaliteitsmeetnet bevat immers relatief meer meetpunten binnen SBZH dan erbuiten. Daarnaast liggen de VMM-metpunten allen in een stroomgebied met een oppervlakte groter dan 10 km², terwijl habitatype 3260 ook in stroomgebieden met een oppervlakte kleiner dan 10 km² voorkomt. Ook hiervoor moet dus gecorrigeerd worden via de meetpuntgewichten.

De strata bestaan uit de combinatie van de ligging t.o.v. SBZH (binnen en buiten) en de oppervlakte van het stroomgebied (< 10 km² en > 10 km²). Het meetpuntgewicht is omgekeerd evenredig met het aandeel waterlooptrajecten dat bemonsterd is binnen elk stratum.

9.4 Resultaten

De resultaten worden weggeschreven in de folder 'AnalyseWaterlopen_2018-11-06'

Referenties

- Adriaens, D., Westra, T., Onkelinx, T., Louette, G., Bauwens, D., Waterinckx, M. & Quataert, P. (2011). Monitoring Natura 2000-soorten Fase I: Prioritering van de informatiebehoefte. technisch rapport, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussels, Belgium. URL <http://www.inbo.be/files/bibliotheek/51/226451.pdf>.
- De Saeger, S., Guelinckx, R., Oosterlynck, P., De Bruyn, A., Debusschere, K., Dhaluin, P., Erens, R., Hendrickx, P., Hendrix, R., Hennebel, D., Jacobs, I., Kumpen, M., Op De Beeck, J., Ruymen, J., Spanhove, T., Tamsyn, W., Van Oost, F., Van Dam, G., Van Hove, M., Wils, C. & Paelinckx, D. (2018). Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart: Uitgave 2018. Nummer 71 in Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). doi:10.21436/inbor.15138099.
- INBO (2016). Klassieke vegetatieopname in een proefvlak aan de hand van visuele inschattingen van bedekking van soorten in (semi-)terrestrische vegetatie (versie 1.0). technisch rapport, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- INBO (2017a). Vegetatie-opname met behulp van de beheermonitoringschaal. technisch rapport, Brussel.
- INBO (2017b). Vegetatieopname en LSVI-bepaling habitat 3260. technisch rapport, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Leyssen, A., Denys, L. & De Saeger, S. (2018). Indicatieve situering van het Natura 2000 habitatype 3260. Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion. Uitgave 2018 (versie 1.6). technisch rapport, Brussel.
- Lommelen, E., Oosterlynck, P., Van Spaendonk, G., Van Calster, H., Van Hove, M. & Westra, T. (2019). LSVI: Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding van habitattypen. URL <https://github.com/inbo/LSVI>.
- Lumley, T. (2019). survey: Analysis of Complex Survey Samples.
- Oosterlynck, P., De Saeger, S., Leyssen, A., Provoost, S., Thomaes, A., Vandevoorde, B., Wouters, J. & Paelinckx, D. (2018). Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen in Vlaanderen. Basisinstrumentarium ter bepaling van de mate van instandhouding van habitatlocaties a.d.h.v. indicatoren voor structuur, vegetatieontwikkel. technisch rapport, Brussel.
- Paelinckx, D., De Saeger, S., Oosterlynck, P., Vanden Borre, J., Westra, T., Denys, L., Leyssen, A., Provoost, S., Thomaes, A., Vandevoorde, B. & Spanhove, T. (2019). Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn: Rapportageperiode 2013 - 2019. technisch rapport, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Provoost, S., Van Gompel, W., Vercruysse, E., Packet, J. & Denys, L. (2015). Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, PINK II: eindrapport periode 2012-2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België.
- T'Jollyn, F., Bosch, H., Demolder, H., De Saeger, S., Leyssen, A., Thomaes, A., Wouters, J., Paelinckx, D. & Hoffmann, M. (2009). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen: versie 2.0. Nummer INBO.R.2009.46 in Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
- Van Ryckegem, G., Van Braeckel, A., Elsen, R., Speybroeck, J., Vandevoorde, B., Mertens, W., Breine, J., Spanoghe, G., Bezdenjesnj, O., Buerms, D., De Beukelaer, J., De Regge, N., Hessel, K., Lefranc, C., Soors, J., Terrie, T., Van Lierop, F. & Van den Bergh, E. (2018). MONEOS - Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2017: Monitoringoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Nummer 74 in Rapporten van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, België. doi:10.21436/inbor.15000892.

Westra, T., Oosterlynck, P., Van Calster, H., Paelinckx, D., Denys, L., Leyssen, A., Packet, J., Onkelinx, T., Louette, G., Waterinckx, M. & Quataert, P. (2014). Monitoring Natura 2000 - habitats: Meetnet habitatkwaliteit. technisch rapport, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Wouters, J., Quataert, P., Onkelinx, T. & Bauwens, D. (2008). Ontwerp en handleiding voor de tweede regionale bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. technisch rapport, Brussel. URL <http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwerp-en-handleiding-voor-de-tweede-regionale-bosinventarisatie-van-het-vlaamse-gewest>.

A BIJLAGE: INPUT-BESTANDEN VOOR LSVI-REKENMODULE EN RESULTATEN

Als bijlage geven we de input-bestanden voor LSVI-rekenmodule en de bestanden met de resultaten van de analyse mee. Deze bestanden worden gegroepeerd in de volgende folders:

- AnalyseGraslandMoeras_2018-12-05
- AnalyseHeide6510_2018-11-13
- AnalyseMONEOS_2019-01-14
- AnalyseBoshabitats_2019-01-15
- AnalysePINK_2019-01-14
- AnalyseMeren_2018-11-06
- AnalyseWaterlopen_2018-11-06