## Baltian tie 2001 -joukkuekilpailun tehtävät

Hampuri, 4. marraskuuta 2001 Finnish version

- 1. Koetta varten laadittiin 8 tehtävää. Kukin opiskelija sai niistä 3. Ketkään kaksi opiskelijaa eivät saaneet enempää kuin yhden yhteisen tehtävän. Mikä on suurin mahdollinen opiskelijoiden määrä?
- 2. Olkoon  $n \geq 2$  positiivinen kokonaisluku. Tutki, onko joukolla  $\{1, 2, 3, \dots\}$  n pareittain erillistä epätyhjää osajoukkoa siten, että jokainen positiivinen kokonaisluku voidaan yhdellä ja vain yhdellä tavalla ilmaista korkeintaan n:n kokonaisluvun, joista kukin kuuluu eri osajoukkoon, summana.
- 3. Luvut 1, 2, ..., 49 on sijoitettu  $7 \times 7$ -ruudukkoon, ja jokaisen rivin ja jokaisen sarakkeen lukujen summa on laskettu. Muutamat näistä 14 summasta ovat parittomia ja loput parillisia. Olkoon A kaikkien parittomien summien summa ja B kaikkien parillisten summien summa. Onko mahdollista, että luvut oli sijoitettu ruudukkoon siten, että A = B?
- 4. Olkoot p ja q kaksi eri alkulukua. Todista, että

$$\left| \frac{p}{q} \right| + \left| \frac{2p}{q} \right| + \left| \frac{3p}{q} \right| + \dots + \left| \frac{(q-1)p}{q} \right| = \frac{1}{2}(p-1)(q-1).$$

(Tässä |x| on suurin kokonaisluku, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin x.)

- 5. Annetut 2001 ympyrän kehän pistettä on kukin väritetty joko punaiseksi tai vihreäksi. Kaikki pisteet väritetään samanaikaisesti uudelleen seuraavalla tavalla: Jos pisteen P molemmat viereiset pisteet ovat samanvärisiä kuin P, P:n väri pysyy samana; muuten P:n väri vaihtuu vastakkaiseksi. Aloittamalla värityksestä  $F_1$  päädytään värityksiin  $F_2, F_3, \ldots$  toistamalla tätä uudelleenväritystä. Osoita, että on olemassa luku  $n_0 \leq 1000$  siten, että  $F_{n_0} = F_{n_0+2}$ . Onko väite totta myös jos luku 1000 korvataan luvulla 999?
- **6.** Pisteet A, B, C, D ja E ovat ympyrän c kehällä tässä järjestyksessä. Lisäksi  $AB \parallel EC$  ja  $AC \parallel ED$ . Ympyrän c pisteeseen E piirretty tangentti leikkaa suoran AB pisteessä P. Suorat BD ja EC leikkaavat pisteessä Q. Osoita, että |AC| = |PQ|.
- 7. ABCD on suunnikas. Pisteen A kautta kulkeva ympyrä leikkaa janat AB, AC ja AD näiden sisäpisteissä M, K, N, tässä järjestyksessä. Todista, että

$$|AB|\cdot |AM| + |AD|\cdot |AN| = |AK|\cdot |AC|.$$

8. Olkoon ABCD kupera nelikulmio ja Nsivun BC keskipiste. Olkoon vielä  $\angle AND=135^{\circ}.$  Osoita, että

$$|AB| + |CD| + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |BC| \ge |AD|.$$

- 9. Olkoon ABCD vinoneliö. Määritä niiden vinoneliön sisällä sijaitsevien pisteiden P joukko, joille pätee  $\angle APD + \angle BPC = 180^{\circ}$ .
- 10. Kolmion ABC kulman  $\angle BAC$  puolittaja leikkaa sivun BC pisteessä D. Määritä kolmion ABC kulmat, kun  $|BD| \cdot |CD| = |AD|^2$  ja  $\angle ADB = 45^\circ$ .

1

11. Reaaliarvoinen funktio f on määritelty positiivisten kokonaislukujen joukossa. Kaikille kokonaisluvuille  $a>1,\ b>1$  pätee

$$f(ab) = f(d) \left( f\left(\frac{a}{d}\right) + f\left(\frac{b}{d}\right) \right),$$

missä d = syt(a, b). Määritä f(2001):n kaikki mahdolliset arvot.

- 12. Olkoot  $a_1, a_2, \ldots, a_n$  positiivisia reaalilukuja, joille  $\sum_{i=1}^n a_i^3 = 3$  ja  $\sum_{i=1}^n a_i^5 = 5$ . Osoita, että  $\sum_{i=1}^n a_i > 3/2$ .
- 13. Olkoon  $a_0, a_1, a_2, \ldots$  jono reaalilukuja, jolle pätee  $a_0 = 1$  ja  $a_n = a_{\lfloor 7n/9 \rfloor} + a_{\lfloor n/9 \rfloor}$  kaikilla  $n = 1, 2, \ldots$  Osoita, että on olemassa positiivinen kokonaisluku k siten, että  $a_k < \frac{k}{2001!}$ . (Myös tässä  $\lfloor x \rfloor$  on suurin kokonaisluku, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin x.)
- 14. Pakassa on 2n korttia. Jokaiseen korttiin on kirjoitettu jokin reaaliluku x,  $1 \le x \le 2$ . (Eri korteissa voi olla eri lukuja.) Näytä, että kortit voidaan jakaa kahteen pinoon siten, että niissä oleviin kortteihin kirjoitettujen lukujen summat  $s_1$  ja  $s_2$  toteuttavat epäyhtälön

$$\frac{n}{n+1} \le \frac{s_1}{s_2} \le 1.$$

- **15.** Olkoon  $a_0, a_1, a_2, \ldots$  jono positiivisia reaalilukuja, joille pätee  $i \cdot a_i^2 \ge (i+1) \cdot a_{i-1}a_{i+1}$  kaikilla  $i = 1, 2, \ldots$  Olkoot x ja y positiivisia reaalilukuja, ja olkoon  $b_i = xa_i + ya_{i-1}$  kaikilla  $i = 1, 2, \ldots$  Osoita, että kaikilla kokonaisluvuilla  $i \ge 2$  pätee  $i \cdot b_i^2 > (i+1) \cdot b_{i-1}b_{i+1}$ .
- 16. Olkoon f positiivisten kokonaislukujen joukossa määritelty reaaliarvoinen funktio, joka toteuttaa seuraavan ehdon: kaikilla n > 1 on olemassa n:n alkutekijä p, jolle f(n) = f(n/p) f(p). Määritä f(2002), kun f(2001) = 1.
- 17. Olkoon n positiivinen kokonaisluku. Todista että joukosta  $\{1, 2, 3, ..., 2^n\}$  voidaan valita vähintään  $2^{n-1} + n$  lukua siten, että x + y ei ole  $x \cdot y$ :n tekijä millään kahdella valitulla luvulla x ja y,  $x \neq y$ .
- 18. Olkoon a pariton kokonaisluku. Osoita, että luvuilla  $a^{2^n} + 2^{2^n}$  ja  $a^{2^m} + 2^{2^m}$  ei ole yhteisiä tekijöitä millään positiivisilla kokonaisluvuilla n ja m,  $n \neq m$ .
- 19. Mikä on pienin pariton positiivinen kokonaisluku, jolla on yhtä monta positiivista tekijää kuin luvulla 360?
- **20.** Kokonaislukujono (a, b, c, d) voidaan muuntaa jonoiksi

$$(c, d, a, b), (b, a, d, c), (a + nc, b + nd, c, d), (a + nb, b, c + nd, d),$$

missä n on mielivaltainen kokonaisluku. Voiko jonosta (1,2,3,4) saada jonon (3,4,5,7) toistamalla tällaisia muunnoksia?

2