

《高等数学 I》(下)期末考试模拟试题 (A 卷)

参考答案与评分标准

一、单项选择题

1、C 2、D 3、A 4、C 5、A

二、填空题

1、 $dz = e^{xy}(ydx + xdy)$ 2、 $C_1 e^{-x} + C_2 e^{5x}$ 3、 $\frac{4}{3}\pi$ 4、 a

5、 $2\pi a^3$ 6、 $\int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx$

三、解答下列各题

1、解： 因为 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $x \in (-1, 1)$ 2 分

由 $\frac{1}{1+2x} = \frac{1}{1-(-2x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n x^n$ 6 分

收敛域 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 7 分

2、解：记 $F(x, y, z) = e^{-xy} - 2z + e^z$ 2 分

则 $F_y = -xe^{-xy}$, $F_z = -2 + e^z$, 4 分

所以 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{-2 + e^z}$ 7 分

3、解：方程对应的齐次线性微分方程的特征方程是：

$r^2 + r = 0$ ，其两个特征根分别为 $r = 0, -1$

所以原方程的一个特解可以设为：

$y^* = (Ax + B)xe^{0x} = Ax^2 + Bx$ 3 分

将其代入方程得 $2Ax + 2A + B = x$ 3 分

比较系数得
$$\begin{cases} 2A = 1 \\ 2A + B = 0 \end{cases}$$

解之得
$$\begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -1 \end{cases} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

所以原方程的一个特解是
$$y^* = \frac{1}{2}x^2 - x \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

四、解答下列各题

1、解由
$$\begin{cases} f_x = 2x - 2 = 0 \\ f_y = 2y = 0 \end{cases}, \text{ 得驻点 } (1, 0) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$f_{xx}(x, y) = 2, f_{xy}(x, y) = 0, f_{yy}(x, y) = 2 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$AC - B^2 = 4 > 0, \quad A > 0$$

点 $(1, 0)$ 是函数的极小值点, $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

函数在点 $(1, 0)$ 处取极小值 $f(1, 0) = 0$ 。 $\dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

2、解：积分曲面 Σ 的方程为 $z = 5 - y$ ，它在 xOy 面上的投影为闭区域

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS &= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) dx dy = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + 5) dx dy \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (5 + r \cos \theta) r dr = 125\sqrt{2}\pi \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

3、解：设
$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

易知收敛半径为 $R=1$ $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

所以在区间 $(-1, 1)$ 内可逐项积分，得

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^x nx^{n-1} dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{x}{1-x} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

两边对 x 求导得
$$s(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, 收敛区间为 $|x| < 1$ 9 分

五、解： 因为 $\frac{\partial T}{\partial t} = -ab^2 e^{-ab^2 t} \sin bx$, $\frac{\partial T}{\partial x} = be^{-ab^2 t} \cos bx$ 4 分

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -b^2 e^{-ab^2 t} \sin bx \quad \text{..... 6 分}$$

所以 $a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = -ab^2 e^{-ab^2 t} \sin bx = \frac{\partial T}{\partial t}$ 8 分