

ゼミノート (6 月 20 日分)

Toshi2019

2025 年 6 月 20 日

目次

1	エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])	1
2	凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])	3

1 エネルギー曲面上の周期軌道 ([HZ94, §1.4])

回帰定理の後

- 回帰定理 $\rightarrow S$ 上での周期的な現象は？
- 希望：
ハミルトン系を摂動したら、回帰点の中には無限回戻ってくるだけでなく、無限に近くに帰ってくるものがある。それによって周回軌道をなす
これが所謂「閉問題」。

■閉補題 1983: 「generic にはコンパクト正則エネルギー曲面上で稠密に周期軌道がある」

問い. $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ 内のコンパクト正則エネルギー曲面 S は、ハミルトンベクトル場 X_H の周期解をもつか？

1950 Seifert: S^3 上の任意の 0 にならないベクトル場は閉軌道を持つか？

1974 Schweitzer: S^3 上の C^1 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

1993 Kupenberg: S^3 上の C^∞ 級ベクトル場で閉軌道を持たないものを構成.

$\dim > 3$ のときは,

1966 Wilson: 持たないものがある.

「保体積 C^∞ 級ベクトル場で周期解を持たないものはあるか？」という問いも考えられそう.

しかし, Hofer: S^3 上の任意の滑らかな Reeb ベクトル場は周期解を持つ.

定義 1.1. $X \in \mathfrak{X}(S^3)$ が Reeb ベクトル場とは, $\lambda \in \Omega^1(S^3)$ で次をみたすものが存在すること:

- (i) $\lambda \wedge d\lambda$ が体積形式を定める.
- (ii) $i_X d\lambda = 0$ かつ $i_X \lambda = 1$.

周期解がハミルトニアンに依らないこと

上の問いは S を表すハミルトニアン H の取り方に依らない。これは超曲面とシンプレクティック構造にしか依存しない。

証明. F を S を定める別の関数で

$$S = \{x; H(x) = c\} = \{x; F(x) = c'\}$$

かつ S 上で $dH(x) \neq 0, dF(x) \neq 0$ をみたすものとする。このとき、

$$\text{Ker } dF(x) = \text{Ker } dH(x)$$

であり、次元定理から $\text{Im } dF(x) = \text{Im } dH(x) = \mathbf{R}$ となるので、至る所 0 にならない滑らかな関数 ρ で、任意の $x \in S$ に対し

$$dF(x) = \rho(x)dH(x)$$

となるものが存在する。よって、 X_H と X_F は S 上で同じ軌道を持ち、一般にはパラメータだけ異なる。より正確には、 φ^t を S での X_H の流れとすると、 S での X_F の流れ ψ^t は

$$\psi^s(x) = \varphi^t(x), \quad t = t(s, x), \quad x \in S$$

で与えられる。ただし、 t はパラメータ $x \in S$ に依存する微分方程式

$$\frac{dt}{ds} = \rho(\varphi^t(x)), \quad t(0, x) = 0$$

で定める。よってとくに X_H は X_F と同じ周期軌道をもつ。 □

例. X_H がエネルギー曲面

$$S = \left\{ x \in \mathbf{R}^{2n}; \frac{1}{2}|x|^2 = R > 0 \right\}$$

を持つとすると X_H の S での解はすべて周期解である。実際、ハミルトニアン F を $F(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ で定めると、正則エネルギー曲面として S を

$$S = \{x \in \mathbf{R}^{2n}; F(x) = R\}$$

とかける。

$$X_F = J\nabla F(x) = J \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = Jx$$

なので、その流れ $\psi^s(x)$ は

$$\psi^s(x) = e^{sJ}x = (\cos s)x + (\sin s)Jx$$

であり、周期的である。

抽象的な定式化

$S \subset \mathbf{R}^{2n}$ を超曲面とする. $T_x S$ は $(2n-1)$ 次元なので, $\omega_0|_{T_x S}$ は退化し, $\text{rank}(\omega_0|_{T_x S}) = 2n-2$ となる. よって, ω_0 と S から, 直線束

$$\mathcal{L}_S = \{(x; \xi) \in TS; \omega_0(\xi, v) = 0 \ (\forall v \in T_x S)\}$$

が定まる. S が X_H に関する正則なエネルギー曲面のとき, 任意の $v \in T_x S$ に対し,

$$\omega_0(X_H(x), v) = -dH(x)v = 0$$

となる. したがって, $x \in S$ に対し $X_H(x) \in \mathcal{L}_S(x)$ である.

2 凸エネルギー曲面上の周期軌道の存在 ([HZ94, §1.5])

ここでの目標は変分法における直接法を説明すること.

定理 2.1 ([HZ94, Thm 5]). S を $(\mathbf{R}^{2n}, \omega_0)$ の超曲面で $\mathbf{R}^{2n}$ のコンパクトな狭義の凸領域の C^2 境界であるものとする. このとき, S 上には閉軌道が存在する.

特に任意のハミルトンベクトル場 X_H で S を正則エネルギー曲面とするものは, S 上に周期解を持つことがわかる.

コメント 2.2. ここでいう狭義の凸集合とは, 次をみたす集合 C のことである. 任意の 2 点 $x \neq y \in C$ に対し, $t \in [0, 1]$ で $(1-t)x + ty \in C$ かつ $t \in]0, 1[$ で $(1-t)x + ty \in \text{Int } C$.

例えば正方形の対辺に半円盤を付け足した領域は $\mathbf{R}^2$ の凸領域であるが, 狭義の凸領域ではない.

証明. $S = \text{Bd } C$ とする. C は原点を内部に含むとしてよい. このとき, 原点を始点とする任意の半直線は S と 1 点で交わる. したがって, 任意の $x \neq 0$ に対し, 実数 $\lambda > 0$ で $\xi := \lambda^{-1}x \in S$ となるものがただ 1 つ存在する.

1 点で交わることの証明. L を原点を始点とする半直線とする. $v \in \mathbf{R}^{2n}$ で

$$L = \{tv; t \in [0, \infty[\}$$

となるものが存在する. この v に対し

$$A := \{t \in [0, \infty[; tv \in C\}$$

とおく. $0 \in A \neq \emptyset$ であり, C がコンパクトなので有界である. したがって, $t_0 = \sup A$ は実数である. C が閉凸集合なので $t_0 v \in S$ であり $A = [0, t_0]$ とかける. したがって, $0 \leq t < t_0$ なら, $t \in \text{Int } C$ であり, $t > t_0$ なら $t \notin A$ であり, $tv \notin S$ である. したがって, L は S と $t_0 v$ でのみ交わる. $\square$

$\mathbf{R}^{2n}$ 上の関数 F を, $x \neq 0$ に対しては, $\xi = \lambda^{-1}x \in S$ となる λ を対応させ, $x = 0$ に対し 0 を対応させることで定める. このとき

$$S := \{x; F(x) = 1\}$$

と表せる． S を狭義凸関数 (strictly convex function), すなわちヘッセ行列 $H_{xx}(x)$ が各点 $x \neq 0$ で正定値となる関数 H の等位集合

$$\{x; H(x) = 1\}$$

として表したい．いま, 関数 F は 1 次同次^{*1} (homogeneous of degree 1) である．

∴) $F(x) = \lambda$ とする． $\mu > 0$ に対し, $\xi = \lambda^{-1}x = (\lambda\mu)^{-1}(\mu x)$ であるから, $F(\mu x) = \lambda\mu = \mu F(x)$ である．

したがって, 明らかに F は狭義凸にならない．実際, オイラーの公式^{*2} $\langle F_x, x \rangle = F$ を微分すると

$$\begin{aligned} \nabla \langle F_x, x \rangle &= \nabla \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_{2n}} \left(\sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} + \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{2n} x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_i} \end{bmatrix} \\ &= F_x + \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_{2n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_{2n} \partial x_{2n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{2n} \end{bmatrix} \\ &= F_x + F_{xx}x \\ &= \nabla F = F_x \end{aligned}$$

^{*1}一般に, 関数 f が m 次同次関数であるとは, 実数 λ に対し $f(\lambda x) = \lambda^m f(x)$ が成り立つこと． $\lambda > 0$ のときのみ成り立つ場合, 関数 f は半同次 (positively homogeneous) m 次関数であるという．(和訳は [福 80, 注 5.1] に倣った．) いま, 関数 F は $x = 0$ を除き $F(x) > 0$ なので特に半同次 1 次関数である．(本だとたんに同次であると言っている．)

^{*2}『岩波数学入門辞典』の「オイラーの恒等式」の項に以下の記述があった：

以下の等式はオイラーの恒等式と呼ばれる．

(1) α を実数として, $f(x_1, \dots, x_n)$ が α 次齊次式 (すなわち $f(rx) = r^\alpha f(x), r > 0$) であるとき

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = \alpha f(x)$$

が成立する．

$\alpha = 1$ のときが, いまの場合になる．

他の本でいうと, 岩波数学辞典の偏微分方程式の項や, テラカンの演習問題にも載っていた．

より $F_{xx}x = 0$ となってしまう．そこで、凸性の仮定より $F_{xx}|_{TS} > 0$ となる^{*3} ことから、関数 H を

$$H(x) = (F(x))^2$$

とおくと、 H が狭義凸となるのは、 S が狭義凸のときであることがわかる．以上で、任意の狭義凸エネルギー曲面 S で原点を内部に含むものは関数 $H: \mathbf{R}^{2n} \rightarrow \mathbf{R}$ で

$$(2.1) \quad \begin{cases} \text{(i)} & H \in C^2(\mathbf{R}^{2n} \setminus \{0\}), \quad H(0) = 0 \\ \text{(ii)} & H_{xx} > 0 \quad x \neq 0 \text{ のとき} \\ \text{(iii)} & H(\rho x) = \rho^2 H(x), \quad (\rho \geq 1 \text{ に対し}) \end{cases}$$

をみたすものを用いて

$$(2.2) \quad S = \{x \mid H(x) = 1\}$$

と表せることが示せた．

前節での議論から、この特殊なハミルトンベクトル場 X_H が、このエネルギー曲面 S 上で周期解を持つことが示せればよい．すなわち、 S 上に

$$\dot{x} = J\nabla H(x)$$

の周期解が存在することを示す．

周期を正規化することで、方程式

$$(2.3) \quad \dot{x} = \lambda J\nabla H(x) \quad \text{for some } \lambda \neq 0$$

の周期 2π の解を S 上で見つければよい．例えば、変分原理

$$\min \int_0^{2\pi} H(x(t))dt \quad \text{under} \quad \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \langle Jx, \dot{x} \rangle = 1,$$

ただし、 $x(t)$ は 2π 周期のもの、は上の方程式をオイラー方程式にもつ．しかし、 $H(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ の場合ですら、上界も下界も持たないことが簡単にわかる．そこで、別の変分原理で同じ微分方程式を持つが下界を持つものを用いる． H のルジャンドル変換を構成するが、物理でよく用いるルジャンドル変換とは異なり、全ての変数を変換する． $H(x)$ のルジャンドル変換 $G(y)$ を

$$G(y) = \max_{\xi \in \mathbf{R}^{2n}} (\langle \xi, y \rangle - H(\xi)) = \langle x, y \rangle - H(x)$$

で定める． □

参考文献

- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).
- [福 80] 福原満洲雄, 常微分方程式 (第 2 版), 岩波書店, 1980.

^{*3}謎．以下の質問があった（がちゃんと目を通してない．）<https://math.stackexchange.com/questions/1427093/how-do-i-prove-this-hessian-is-positive-definite>