



# 第四章 向量空间

- 4.1 向量的定义及运算
- 4.2 向量的线性相关性
- 4.3 向量组的极大无关组和秩
- 4.4 子空间
- 4.5 基和维数
- 4.6 矩阵的秩
- 4.7 线性方程组有解的条件及解的结构



## 第四节 子空间

一、子空间的定义

二、矩阵的列空间行空间和零空间



# 一、子空间的定义

**定义** 设  $H$  是  $\mathbb{R}^n$  的非空子集. 若  $H$  满足性质:

- (1)  $\alpha, \beta \in H \Rightarrow \alpha + \beta \in H$ ;
- (2)  $\alpha \in H, k \in \mathbb{R} \Rightarrow k\alpha \in H$ .

则称  $H$  为  $\mathbb{R}^n$  的 **子空间**.

**提醒** 子空间是对加法和数乘运算（或线性运算）封闭的  $\mathbb{R}^n$  的非空子集.

**提醒** 任何子空间  $H$  必含有零向量, 即  $0 \in H$ .

**提醒** 两个特殊子空间, 平凡子空间:  $\mathbb{R}^n, \{0\}$ .



**例题** 若  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}^n$ , 则  $H = \text{span} \{\alpha_1, \alpha_2\}$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

**证明** 对任意的  $k \in \mathbb{R}$ , 及  $H$  中的任意两向量

$$\xi = s_1\alpha_1 + s_2\alpha_2, \quad \eta = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2,$$

有

$$\xi + \eta = (s_1 + t_1)\alpha_1 + (s_2 + t_2)\alpha_2 \in H;$$

$$k\xi = (ks_1)\alpha_1 + (ks_2)\alpha_2 \in H.$$

由定义,  $H$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

**定理** 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}^n$ , 则  
 $H = \text{span} \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.



**定理** 等价向量组生成的子空间必相同.

**证明** 设  $A : \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$  与  $B : \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$  为两个等价向量组.

因  $A$  能由  $B$  线性表示, 则  $A$  的每个线性组合必能表为  $B$  的线性组合, 故

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\} \subset \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t\};$$

同理, 因  $B$  能由  $A$  线性表示, 从而有

$$\text{span}\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}.$$

所以

$$\text{span}\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}.$$





**例题** 过原点的直线是一维子空间，不过原点的直线不是子空间.

**提醒** 子空间的一个直观描述：过原点的平面.

**例题** 判别以下集合是否为向量空间.

$$(1) V_1 = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T : \sum_{i=0}^n x_i = 0 \right\}$$

$$(2) V_2 = \left\{ (1, x_2, \cdots, x_n)^T : x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

**解答** (1) 对  $V_1$  中的任意两个向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T,$$



$$V_1 = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T : \sum_{i=0}^n x_i = 0 \right\}$$

---

$$\text{有 } \sum_{i=0}^n a_i = 0, \sum_{i=0}^n b_i = 0 \Rightarrow \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) = 0$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)^T \in V_1;$$

$$\text{对任意 } \lambda \in \mathbb{R}, \quad \sum_{i=0}^n \lambda a_i = \lambda \sum_{i=0}^n a_i = 0$$

$$\Rightarrow \lambda \alpha = (\lambda a_1, \lambda a_2, \cdots, \lambda a_n)^T \in V_1;$$

所以,  $V_1$  是向量空间.



$$V_2 = \left\{ (1, x_2, \cdots, x_n)^T : x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

---

对集合  $V_2$  而言, 当

$$\alpha = (1, a_2, \cdots, a_n)^T \in V_2,$$

却有

$$2\alpha = (2, 2a_2, \cdots, 2a_n)^T \notin V_2,$$

故  $V_2$  不是子空间.

**提醒** 还可更简单地解释为:

因  $0 \notin V_2$ , 故  $V_2$  不是子空间.





## 二、矩阵的列空间行空间零空间

矩阵  $A$  的列向量组的全部线性组合构成的集合，记为  $\text{Col}A$ .

若  $A = (a_{ij})_{m \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，则

$$\text{Col}A \triangleq \text{span} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \} \subset \mathbb{R}^m.$$

**定理** 若  $A$  为  $m \times n$  矩阵，则  $\text{Col}A$  是  $\mathbb{R}^m$  的子空间.

**定义** 称  $\text{Col}A$  称为矩阵  $A$  的列空间.

**提醒** 显然， $\text{Col}A = \{ \beta : \exists X \in \mathbb{R}^n, \text{ s. t. } \beta = AX \}$ ，  
因此， $\text{Col}A$  也称为  $A$  的值域空间  $\text{Range}(A)$ .



**例题** 已知  $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ ,  $\beta = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ , 判断  $\beta$  是否在  $\text{Col}A$  中.

**解答**  $\beta$  在  $\text{Col}A$  中当且仅当方程组  $AX = \beta$  有解. 用行变换化增广矩阵为行阶梯形矩阵, 有

$$(A, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & 6 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

显然, 线性方程组  $AX = \beta$  相容, 故  $\beta$  在  $\text{Col}A$  中.



矩阵  $A$  的行向量组的全部线性组合构成的集合，记为  $\text{Row} A$ .

设  $m \times n$  矩阵  $A = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{bmatrix}$ ，则

$$\text{Row} A = \text{span} \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m \} \subset \mathbb{R}^n.$$

**定理** 若  $A$  为  $m \times n$  矩阵，则  $\text{Row} A$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

**定义** 称  $\text{Row} A$  称为矩阵  $A$  的行空间.



初等行变换不会改变列向量组的线性关系，但会改变行向量组的线性关系，但如下结果成立.

**定理** 矩阵  $A$  经初等行变换化为  $B$ ，则  $A$  与  $B$  有相同的行空间.

**证明** 因  $B$  由  $A$  经初等行变换得到，则  $B$  的行向量能由  $A$  的行向量组线性表示. 因初等行变换可逆，则  $A$  的行向量组也能由  $B$  的行向量组线性表示. 从而  $A$  与  $B$  两矩阵的行向量组等价，因而生成的子空间相同，即  $\text{Row } A = \text{Row } B$ .

**提醒** 行等价的两个矩阵有相同的行空间.



设  $A$  为一矩阵，齐次线性方程组  $AX = 0$  的全部解构成的集合，记为

$$\text{Nul}A = \{X \in \mathbb{R}^n : AX = 0\}.$$

**定理** 若  $A$  为  $m \times n$  矩阵，则  $\text{Nul}A$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

**定义** 称  $\text{Nul}A$  称为矩阵  $A$  的零空间.

等价地， $m$  个方程  $n$  个未知量的齐次线性方程组  $AX = 0$  的解集是  $\mathbb{R}^n$  的子空间，称为  $AX = 0$  的解空间.





**例题** 求  $\text{Nul}A$  的一个生成集, 其中

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}.$$

**解答** 首先, 用初等行变换可化  $A$  为行最简形.

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} AX = O \text{ 同解于 } \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_3 = -2x_4 + 2x_5 \end{cases} \end{aligned}$$



令自由变量  $x_2 = k_1, x_4 = k_2, x_5 = k_3$ , 得通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_1 + k_2 - 3k_3 \\ k_1 \\ -2k_2 + 2k_3 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

则  $\alpha, \beta, \gamma$  是  $\text{Nul}A$  的生成集, 其中

$$\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



## 怎样求 $\text{Nul}A$ 的生成集?

- (1) 将  $A$  用初等行变换化为行最简形
- (2) 写出相应的最简方程组
- (3) 将全部解用向量表示，并写成线性组合形式
- (4) 解的线性组合中具体的向量构成所求生成集