



第五章 特征值与特征向量

5.1 方阵的特征值与特征向量

5.2 矩阵的相似对角化

5.3 实对称矩阵的正交相似对角化



第二节 矩阵的相似对角化

一、矩阵相似的概念

二、相似矩阵的性质

三、矩阵可对角化的条件

四、矩阵可对角化理论的应用



矩阵分解经常能解决很多问题，我们要考虑一种特殊的分解： $A = P\Lambda P^{-1}$ ，其中 Λ 为对角阵这种分解很有用。问题是：对一般矩阵，这种分解是否存在？若存在，如何求 P, Λ ？



一、矩阵相似的概念

定义 设 A, B 均为 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 A 与 B **相似**，记为 $A \sim B$.

提醒 相似是一种特殊的等价关系，因

$$A \sim B \Rightarrow A \cong B.$$

提醒 相似这种等价关系具有如下三条性质：

- ① **反身性**： $A \sim A$;
- ② **对称性**： $A \sim B \Rightarrow B \sim A$;
- ③ **传递性**： $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$.



思考 若 $A \sim kE$, 则 $A = ?$

答案 $A = kE$

提醒 数量矩阵（包括单位阵）只和自己相似！





二、矩阵相似的性质

定理 若矩阵 $A \sim B$, 则

$$(1) |\lambda E - A| = |\lambda E - B|;$$

相似矩阵具有相同的特征值;

$$(2) \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B, \quad |A| = |B|;$$

$$(3) \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B).$$

提醒 相似矩阵具有相同的特征多项式, 相同的特征值, 相同的迹, 相同的秩, 相同的行列式, 相同的可逆性!

所以, 矩阵之间的这种关系叫 “相似” !



定理 若矩阵 $A \sim B$, 则

- (1) $A^k \sim B^k, \forall k \in \mathbb{N}$;
- (2) $kA \sim kB$, k 为任意常数;
- (3) $f(A) \sim f(B)$, $f(x)$ 为任意多项式;
- (4) $A^T \sim B^T$.

定理 若矩阵 $A \sim B$, 且 A 可逆, 则

- (1) B 可逆;
- (2) $A^{-1} \sim B^{-1}, \quad A^* \sim B^*$;
- (3) $A^k \sim B^k, \forall k \in \mathbb{Z}$.



思考 若 $A \sim B$, 且 A 可逆, 如下结论正确吗?

$$f(A) + A^{-1} + A^* \sim f(B) + B^{-1} + B^*,$$

其中 $f(x)$ 为任意多项式.

思考 若矩阵 $A \sim B$, $C \sim D$, 如下结论正确吗?

$$A + C \sim B + D.$$



例题 已知三阶矩阵 A 与三维列向量 α 使得 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 求 A 的特征值.

解答 因向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 故方阵 $Q = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆, 且

$$\begin{aligned} AQ &= A(\alpha, A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha) \\ &= (A\alpha, A^2\alpha, 3A\alpha - 2A^2\alpha) \\ &= (\alpha, A\alpha, A^2\alpha) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = QB, \end{aligned}$$



其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

则 $Q^{-1}AQ = B$, 即 $A \sim B$, 从而有相同的特征值.
易求得

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1 & \lambda & -3 \\ 0 & -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 3),$$

所以 A 的特征值为 $0, 1, -3$.



相似性质的应用

① 若 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $\lambda = ?$

答案 $1 + 4 + 5 = \lambda + 2 + 2 \Rightarrow \lambda = 6$

② 若 $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & a & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$, 则 $a = ?$ $b = ?$

答案 $\begin{cases} 2 + a + 3 = 1 + 2 + b \\ 2 \times a \times 3 = 1 \times 2 \times b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$



三、矩阵可相似对角化的条件

若矩阵 A 与某对角阵相似，称 A 可相似对角化。

可相似对角化，简称可对角化。

对角阵是结构最简单的矩阵之一。若 $A \sim \Lambda$ ，其中 Λ 为对角矩阵，即 A 可对角化为 Λ ，由相似的性质易知， A 与 Λ 有很多相同的性质，则通过研究 Λ 的性质来达到研究 A 的性质的目的。

可是，一个矩阵在什么时候才可以对角化呢？

下面定理给出了矩阵可对角化的充要条件。



定理 设 A 为 n 阶方阵, 则以下命题等价:

- (1) A 可相似对角化.
- (2) A 有 n 个线性无关的特征向量.

证明 (1) \Rightarrow (2) A 可对角化

\Rightarrow 存在 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 及可逆阵

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

$\Rightarrow AP = P\Lambda$

$\Rightarrow A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$ (i)

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 可逆

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 (ii)

(i)(ii) $\Rightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.



(2) \Rightarrow (1) A 有 n 个线性无关的特征向量, 设为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n,$$

分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 并令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P \text{ 可逆且 } (A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_n) \\ = (\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \cdots, \lambda_n\alpha_n) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P \text{ 可逆且 } AP = P\Lambda$$

$$\Rightarrow P \text{ 可逆且 } P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow A \sim \Lambda$$

$$\Rightarrow A \text{ 能对角化.}$$



提醒 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可对角化, 则

① 与 A 相似的对角阵即是由 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 构成的对角阵

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n);$$

② 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 成立的可逆矩阵 P 即是由 A 的分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的线性无关的特征向量 X_1, X_2, \dots, X_n 为列向量组构成的矩阵

$$P = (X_1, X_2, \dots, X_n).$$



定理 设 A 为 n 阶方阵，则如下命题等价：

- ① A 可对角化；
- ② A 有 n 个线性无关的特征向量；
- ③ A 的任一特征值的代数重数与其几何重数相等.

定理 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 有 n 个不同特征值，或特征值全为单根，则 A 可对角化.

提醒 以上命题是方阵可对角化的**充分**条件！



例题 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 能对角化吗？若能，求

出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

解答 经计算有

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4),$$

即三阶矩阵 A 有 3 个不同的特征值

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4,$$

故 A 可对角化。



解 $(\lambda_1 E - A) X = 0$ 得其基础解系为

$$X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

解 $(\lambda_2 E - A) X = 0$ 得其基础解系为

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix};$$



解 $(\lambda_3 E - A) X = 0$ 得其基础解系为

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{令 } P = (X_1, \xi_1, \eta_1) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{则 } P \text{ 可逆, 使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 4 \end{bmatrix}.$$



提醒 一定要注意可逆矩阵 P 的取法与相似对角阵之间的对应, 如在上例中, 若取

$$P = (X_3, X_1, X_2) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_3 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}.$$



例题 证明矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 不能对角化.

证明 经计算有

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2),$$

则 A 的特征值为 $\lambda_{1,2} = 1, \lambda_3 = 2$.

经初等行变换有

$$\lambda_{1,2}E - A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

只需对多重
根验证即可

即 $3 - r(\lambda_{1,2}E - A) = 1 \neq 2$, 故 A 不能对角化.



例题 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 能对角化吗？若能，求

出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

解答 经计算有 $|\lambda E - A| = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$,
故 A 的特征值为 $\lambda_{1,2} = -1$, $\lambda_3 = 5$.

经初等行变换有

$$\lambda_{1,2}E - A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

只需对多重
根验证即可



$$\lambda_{1,2}E - A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

只需对多重
根验证即可

即 $3 - r(\lambda_{1,2}E - A) = 2$, 即多重特征值 λ_{12} 的代数重数与其几何重数相等, 且没有其它的多重特征值, 故 A 能对角化.

由上知 $(\lambda_{12}E - A)X = 0$ 的基础解系为

$$X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$



解 $(\lambda_3 E - A) X = 0$ 得其基础解系为

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{令 } P = (X_1, X_2, \eta_1) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{则 } P \text{ 可逆, 使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{bmatrix}.$$



思考 在上题中, 若令 $P = (X_1, X_1 + 2X_2, 9\eta_1)$,
 $P^{-1}AP = ?$

思考 二阶方阵 A 满足 $|A| < 0$, A 能对角化吗?
为什么?



四、矩阵可对角化理论的应用

例题 已知 $A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$, 求 A^n .

解答 因 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$,
矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$,
矩阵 A 的特征值全为单根, 故可对角化.

解 $(\lambda_1 E - A) X = 0$ 得基础解系 $\xi = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$;

解 $(\lambda_2 E - A) X = 0$ 得基础解系 $\eta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;



令 $P = (\xi, \eta) = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix},$$

且

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & \\ & -1 \end{bmatrix}.$$

从而有

$$P^{-1}A^nP = (P^{-1}AP)^n = \begin{bmatrix} 2 & \\ & -1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 2^n & \\ & (-1)^n \end{bmatrix},$$



所以

$$A^n = P \begin{bmatrix} 2^n & \\ & (-1)^n \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 \times 2^n - 2 \times (-1)^n & 5 \times (-1)^n - 5 \times 2^n \\ 2^{n+1} - 2 \times (-1)^n & 5 \times (-1)^n - 2^{n+1} \end{bmatrix}$$

思考 以上例题中的 n 可取负整数吗？



例题 设

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

为 $A_{3 \times 3}$ 的分别属于特征值

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$$

的特征向量，求 A .



解答 设 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} AP &= A(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (A\eta_1, A\eta_2, A\eta_3) \\ &= (\lambda_1\eta_1, \lambda_2\eta_2, \lambda_3\eta_3) = (0, \eta_2, 3\eta_3) \end{aligned}$$



从而有

$$A = (0, \eta_2, 3\eta_3) P^{-1}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$



课堂练习

1. 若矩阵 $A_{n \times n}, B_{n \times n}$ 有相同的特征值, 也都有 n 个线性无关的特征向量, 则 ()

(A) $A = B$ (B) $A \neq B$ 但 $|A - B| = 0$

(C) $A \sim B$ (D) $|A| = |B|$ 但未必有 $A \sim B$

2. 已知 $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 x, y .

3. 已知 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & x \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 x, y .