

**线性代数 B 试题 A 卷**

班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
签名											

一、(10 分) 设 3 阶方阵  $A, B$  满足  $A^2B - A - B = I$ , 其中  $I$  为 3 阶单位矩阵, 若

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } |B|.$$

二、(10 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$$

讨论参数  $\lambda$  取何值时, 方程组无解, 有唯一解和无穷多个解? 在方程组有无穷多个解时, 用导出组的基础解系表示解.

三、(10 分) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 14 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

- (1) 求  $A$  的列向量组的秩和它的一个极大无关组;
- (2) 用所求的极大无关组线性表出剩余列向量.

四、(10 分) 已知  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是向量空间  $\mathbf{R}^3$  的一个基,

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_3$$

- (1) 证明  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  为  $\mathbf{R}^3$  的一个基;
- (2) 求基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵;
- (3) 求向量  $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$  关于基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的坐标.

五、(10 分) 用施密特正交化方法, 由向量组

$$\alpha_1 = (0, 1, -1)^T, \quad \alpha_2 = (2, 2, 0)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, -1)^T$$

构造一组标准正交向量组.

六、(10 分) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & 2 \end{pmatrix}$ .

- (1) 求  $A$  的特征值和特征向量;
- (2) 判断  $A$  是否可以相似对角化.

七、(10 分) 如果  $\mathbf{F}^n$  中的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  是线性无关的, 并且向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta$  是线性相关的, 那么  $\beta$  可以由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  线性表示, 并且表示的方法是唯一的.

八、(10 分) 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ .

(1) 用正交变换将它化为标准形, 并给出所用的正交变换; (2) 该二次型是否正定?

九、(10 分) 设  $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 已知线性方程组  $AX = b$  存在两个不

同的解. (1) 求  $\lambda, a$ ; (2) 求  $AX = b$  的通解.

十、(10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明行列式  $|A| = (n+1)a^n$ ;

(2) 当  $a$  为何值时, 方程组  $AX = b$  有唯一解? 当  $AX = b$  有唯一解时, 求  $x_1$ ;

(3) 当  $a$  为何值时, 方程组  $AX = b$  有无穷多个解? 当  $AX = b$  有无穷多个解时, 求它的通解.