Einführung in die Quantenrechnung
Bits und Qubits

Brian Benjamin Pomerantz und Henry Sebastian Graßhorn Gebhardt

P&GG Monotechnische Anstalt

2021 März 20 und 2021 April

Outline

Outline

1. Einfache Computadoras
   - Mathematik
   - Architektur
2. Computadora Cuántica: Eine schwarze Kunst
   - Quantenzustände

Outline

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 +$$

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 +$$

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 +$$

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

From binary to decimal,

$$\begin{aligned} 1001101_2 &= 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 \\ &= 64 + 8 + 4 + 1 \\ &= 77_{10} \end{aligned}$$

Binäre Zahlen

In decimal notation,

$$1572_{10} = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

From binary to decimal,

$$\begin{aligned} 1001101_2 &= 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 \\ &= 64 + 8 + 4 + 1 \\ &= 77_{10} \end{aligned}$$

Going from decimal to binary notation,

$$\begin{aligned} 27_{10} &= 16 + 8 + 2 + 1 \\ &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 11011_2 \end{aligned}$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 && = 000000001_2 \\
2^1 &= \\
2^2 &= \\
2^3 &= \\
2^4 &= \\
2^5 &= \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 & &= 000000001_2 \\
2^1 &= 2 & &= 000000010_2 \\
2^2 &= \\
2^3 &= \\
2^4 &= \\
2^5 &= \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 & &= 000000001_2 \\
2^1 &= 2 & &= 000000010_2 \\
2^2 &= 4 & &= 000000100_2 \\
2^3 &= \\
2^4 &= \\
2^5 &= \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 && = 000000001_2 \\
2^1 &= 2 && = 000000010_2 \\
2^2 &= 4 && = 000000100_2 \\
2^3 &= 8 && = 000001000_2 \\
2^4 &= \\
2^5 &= \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 & &= 000000001_2 \\
2^1 &= 2 & &= 000000010_2 \\
2^2 &= 4 & &= 000000100_2 \\
2^3 &= 8 & &= 000001000_2 \\
2^4 &= 16 & &= 000010000_2 \\
2^5 &= \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 && = 000000001_2 \\
2^1 &= 2 && = 000000010_2 \\
2^2 &= 4 && = 000000100_2 \\
2^3 &= 8 && = 000001000_2 \\
2^4 &= 16 && = 000010000_2 \\
2^5 &= 32 && = 000100000_2 \\
2^6 &= \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 && = 000000001_2 \\
2^1 &= 2 && = 000000010_2 \\
2^2 &= 4 && = 000000100_2 \\
2^3 &= 8 && = 000001000_2 \\
2^4 &= 16 && = 000010000_2 \\
2^5 &= 32 && = 000100000_2 \\
2^6 &= 64 && = 001000000_2 \\
2^7 &= \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$
\begin{aligned}
2^0 &= 1 && = 000000001_2 \\
2^1 &= 2 && = 000000010_2 \\
2^2 &= 4 && = 000000100_2 \\
2^3 &= 8 && = 000001000_2 \\
2^4 &= 16 && = 000010000_2 \\
2^5 &= 32 && = 000100000_2 \\
2^6 &= 64 && = 001000000_2 \\
2^7 &= 128 && = 010000000_2 \\
2^8 &=
\end{aligned}
$$

Powers von zwei

$$2^0 = 1 \qquad = 000000001_2$$
$$2^1 = 2 \qquad = 000000010_2$$
$$2^2 = 4 \qquad = 000000100_2$$
$$2^3 = 8 \qquad = 000001000_2$$
$$2^4 = 16 \qquad = 000010000_2$$
$$2^5 = 32 \qquad = 000100000_2$$
$$2^6 = 64 \qquad = 001000000_2$$
$$2^7 = 128 \qquad = 010000000_2$$
$$2^8 = 256 \qquad = 100000000_2$$

Outline

Logic Gates

AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



XOR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



XNOR

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Adder



Computer Architektur



Computer Architektur



Outline

Outline

A QPU operates on Qubits instead of Bits

- QPU: Quantum Processing Unit
- Bits: 0, 1
- Qubits: $|0\rangle$, $|1\rangle$, and superpositions thereof

Light is a wave



Polarization Experiment



Figure 2.1
Single polaroid attenuates unpolarized light by 50 percent.

Polarization Experiment



Figure 2.2
Two orthogonal polaroids block all photons.

Polarization Experiment



Figure 2.3
Inserting a third polaroid allows photons to pass.

Vektoren

Alle Polarisationsrichtungen können durch zwei Vektoren dargestellt werden:

$$|\psi\rangle = a\,|{\rightarrow}\rangle + b\,|{\uparrow}\rangle$$



Die Notation wird Bra-ket Notation genannt.

Vektoren

$$|\psi\rangle = a\,|{\rightarrow}\rangle + b\,|{\uparrow}\rangle$$



Beispiele:

$$|45^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|{\rightarrow}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|{\uparrow}\rangle$$
$$|135^\circ\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}\,|{\rightarrow}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|{\uparrow}\rangle$$
$$|30^\circ\rangle = \frac{1}{2}\,|{\rightarrow}\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}\,|{\uparrow}\rangle$$
$$|\theta\rangle = \sin\theta\,|{\rightarrow}\rangle + \cos\theta\,|{\uparrow}\rangle$$

Wahrscheinlichkeiten

$$|\psi\rangle = a\,|{\rightarrow}\rangle + b\,|{\uparrow}\rangle$$



Welle: $|a|^2$ und $|b|^2$ sind die relativen Intensitäten des jeweiligen Zustandes.

Teilchen: $|a|^2$ und $|b|^2$ sind die relativen Wahrscheinlichkeiten das Teilchen im jeweiligen Zustand vorzufinden.

Normalisierung eines Vektors: Bras und Kets

[Talk about orthogonality, then inner product, then normalization, then measurements.]

$$\begin{aligned}|\psi\rangle &= a\,|\rightarrow\rangle + b\,|\uparrow\rangle\,,\\ \langle\psi| &= a^*\,\langle\rightarrow| + b^*\,\langle\uparrow|\,,\end{aligned}$$

wobei a^* ist die konjugiert komplexe Zahl von a.

Teilchen: $|a|^2$ und $|b|^2$ sind die relativen Wahrscheinlichkeiten das Teilchen im jeweiligen Zustand vorzufinden.

Messungen

Motivation: Wir wollen den finalen Zustand unseres Experimentes kennen. Darum müssen wir eine Messung durchführen. Jeder Filter ist ein Messapparat.

Pregunta: Was ist das Resultat einer Messung für ein einzelnes Photon?

Antwort: Jede Messung ist eine Projektion auf den Vektor der Messung.

Beispiele eines Messoperators:

$$|\rightarrow\rangle\langle\rightarrow|\,, \quad |\uparrow\rangle\langle\uparrow|$$

Messoperatoren

Auf unseren vorigen Zustand angewendet,

$$\Big(|{\rightarrow}\rangle \langle{\rightarrow}| \Big) |\psi\rangle = \Big(|{\rightarrow}\rangle \langle{\rightarrow}| \Big) \Big(a\,|{\rightarrow}\rangle + b\,|{\uparrow}\rangle \Big),$$
$$|{\uparrow}\rangle \langle{\uparrow}|\psi\rangle = a\,|{\rightarrow}\rangle + b\,|{\uparrow}\rangle$$