



MOTIBOSTON

Giải Pháp Chuyên Sâu Cho Buồn Nôn & Nôn

Tối ưu hóa nhu động dạ dày – Bảo vệ nhịp sống bệnh nhân

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PM & TRÌNH DƯỢC VIÊN

Phần 1: Tổng Quan Sản Phẩm

Thành phần hoạt chất và đặc tính dược lý cơ bản

Thông Tin Cơ Bản Về Motiboston

Chỉ tiêu	Thông tin chi tiết
Hoạt chất chính	Domperidone (dưới dạng maleat) - 10mg
Dạng bào chế	Viên nén bao phim (trắng, tròn, hai mặt khum)
Quy cách đóng gói	Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất	Boston Pharma - Tiêu chuẩn WHO-GMP / EU-GMP



Cơ Chế Tác Dụng


Kháng Dopamin Ngoại Biên

Motiboston tác động chọn lọc lên thụ thể **Dopamine D2** tại vùng cực sau (area postrema) và đường tiêu hóa.

D2 Receptor + Domperidone → Blockade

Kết quả: Tăng trương lực cơ thắt tâm vị, tăng biên độ mở rộng cơ thắt môn vị và thúc đẩy làm rỗng dạ dày.

Domperidone: Mechanism of Action



pharmacyfreak

Chỉ Định Điều Trị

Điều trị triệu chứng

Kiểm soát nhanh các triệu chứng nôn và buồn nôn do nhiều nguyên nhân khác nhau.



Rối loạn vận động

Hỗ trợ đầy hơi, chướng bụng, chậm tiêu do liệt dạ dày hoặc trào ngược thực quản.



Ít tác dụng phụ TW

Do ít qua hàng rào máu não, hiếm khi gây hội chứng ngoại tháp so với Metoclopramide.

Hướng Dẫn Liều Dùng & Cách Dùng

- ✓ **Người lớn (> 12 tuổi, > 35kg):** 10mg/lần, tối đa 3 lần/ngày.
- 🍴 **Thời điểm vàng:** Uống trước bữa ăn 15-30 phút để đạt nồng độ đỉnh tốt nhất.
- 📅 **Thời gian điều trị:** Ngắn nhất có thể, thường không quá 1 tuần.
- ⚠️ **Lưu ý:** Không tự ý tăng liều gấp đôi nếu quên liều.



An Toàn & Chống Chỉ Định

Chống chỉ định tuyệt đối

- U tuyến yên tiết Prolactin.
- Xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột.
- Suy gan trung bình và nặng.
- Bệnh nhân có khoảng QT kéo dài.

Thận trọng đặc biệt

- Bệnh nhân suy thận (giảm tần suất dùng).
- Người cao tuổi (>60 tuổi).
- Phụ nữ có thai và cho con bú (chỉ dùng khi thật cần thiết).

Cảnh Báo Tim Mạch Cần Ghi Nhớ

30mg

Liều Tối Đa Mỗi Ngày

Kiểm soát khoảng QT

Sử dụng Domperidone có liên quan đến nguy cơ kéo dài khoảng QT và loạn nhịp thất. Nguy cơ này tăng cao khi dùng liều >30mg/ngày hoặc ở người bệnh tim mạch sẵn có.

Dừng thuốc ngay nếu có triệu chứng đánh trống ngực hoặc ngất.

Hiệu Quả Kiểm Soát Triệu Chứng



Dữ liệu dựa trên các nghiên cứu lâm sàng về Domperidone trong điều trị rối loạn vận động tiêu hóa.

Lộ Trình Đào Tạo Đội Ngũ Sales

Tuần 1

Kiến thức d● lý và cơ chế
tác dụng D2.

Tuần 2

Phân tích (●) chủ và Key
Selling Points.

Tuần 3


Kỹ năng tư (●) an toàn tìm
mạch cho BS/DS.

Tuần 4

Đánh giá n● lực và thực
chiến điểm bán.

Vì Một Hệ Tiêu Hóa Khỏe Mạnh Hơn

Motiboston – Cam kết chất lượng từ Boston Pharma, đồng hành cùng chuyên gia y tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

A photograph of a modern, multi-story industrial building, likely a pharmaceutical manufacturing facility. The building has a grey facade and large windows. In the foreground, there is a paved parking lot with several empty spaces marked with white lines. To the left, a flagpole flies the Irish tricolor flag (green, white, and orange). A semi-transparent white rectangular box is overlaid on the center of the image, containing text.

Boston Pharma

Cam kết mang đến những sản phẩm dược phẩm chất lượng cao,
đạt chuẩn WHO-GMP và EU-GMP, vì sức khỏe cộng đồng Việt
Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dược thư quốc gia Việt Nam, 2022
2. Tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc Motiboston

Q&A

Giải đáp thắc mắc và thảo luận chuyên môn

Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp!

Bộ phận Đào tạo - Boston Pharma