



Review

- $f \uparrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$;
- f 严格 $\uparrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$, 且在任意 (c, d) 上 $f'(x)$ 不恒为 0.
- $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(2n-1)}(x_0) = 0$, 则
$$f^{(2n)}(x_0) > (<) 0 \Rightarrow x_0 \text{ 为 } f \text{ 的极小(大)值点.}$$
- $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(2n)}(x_0) = 0, f^{(2n+1)}(x_0) \neq 0$
$$\Rightarrow x_0 \text{ 不是极值点.}$$



- $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(2n)}(x_0) = 0$, $f^{(2n+1)}(x)$ 在 x_0 的两侧异号, 则 x_0 是 f 的极值点, 且

$$f^{(2n+1)}(x) \begin{cases} \leq (<) 0, & x < x_0 \\ \geq (>) 0, & x > x_0 \end{cases} \Rightarrow x_0 \text{ 是 } f \text{ 的 (严格) 极小值点;}$$

$$f^{(2n+1)}(x) \begin{cases} \geq (>) 0, & x < x_0 \\ \leq (<) 0, & x > x_0 \end{cases} \Rightarrow x_0 \text{ 是 } f \text{ 的 (严格) 极大值点.}$$

- f 在 $[a, b]$ 上、 \mathbb{R} 上的极值和最值问题.




§ 5. 函数的凸凹性

Def. f 在区间 I 上定义, 若 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 都有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq (\geq) \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的下凸(上凸)函数.

Remark. 下凸函数的
几何意义?





Thm. f 为 I 上的下凸函数, 当且仅当 $\forall x_1, \dots, x_n \in I$, 以及满足

$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$ 的正数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 都有

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

Proof. 充分性显然, 下证必要性.

$n = 1, 2$ 时, 显然.

设 $n = k$ 时结论成立, 当 $n = k + 1$ 时,



$$\frac{\lambda_1}{1-\lambda_{k+1}} + \frac{\lambda_2}{1-\lambda_{k+1}} + \cdots + \frac{\lambda_k}{1-\lambda_{k+1}} = 1,$$

$$f(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_{k+1} x_{k+1}) = f\left(\lambda_{k+1} x_{k+1} + (1-\lambda_{k+1}) \frac{\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k}{1-\lambda_{k+1}}\right)$$

$$\leq \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) + (1-\lambda_{k+1}) f\left(\frac{\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_k x_k}{1-\lambda_{k+1}}\right)$$


$$\leq \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) + (1-\lambda_{k+1}) \left(\frac{\lambda_1 f(x_1)}{1-\lambda_{k+1}} + \cdots + \frac{\lambda_k f(x_k)}{1-\lambda_{k+1}} \right)$$

$$= \lambda_1 f(x_1) + \cdots + \lambda_k f(x_k) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}). \square$$



Thm. f 为 I 上的下凸函数, 当且仅当 $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $x \in (x_1, x_2)$,

有
$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$



Remark. 几何意义.

$$k_{PM} \leq k_{PQ} \leq k_{MQ}.$$

Remark. 我们证明以下更强的定理.



Thm. 以下各命题等价：(1) f 为 I 上的下凸函数；

(2) $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $x \in (x_1, x_2)$, 有


$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1};$$

(3) $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $x \in (x_1, x_2)$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x};$$

(4) $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $x \in (x_1, x_2)$, 有

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$





Proof. $\forall x_1, x, x_2 \in I, x_1 < x < x_2$, 记 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, 则

$$\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \in (0, 1), \quad 1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

(1) \Leftrightarrow (2):

$$f \text{ 下凸} \Leftrightarrow f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow f(x) - f(x_1) &\leq (1 - \lambda)(f(x_2) - f(x_1)) \\ &= \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x_1)), \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$



$$x \in (x_1, x_2), x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2,$$

$$\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \in (0, 1), \quad 1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

(1) \Leftrightarrow (3):

$$f \text{ 下凸} \Leftrightarrow f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(x_2) \leq \lambda(f(x_1) - f(x_2))$$

$$= \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} (f(x_1) - f(x_2))$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$



$$x \in (x_1, x_2), x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} \in (0, 1), 1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

(1) \Leftrightarrow (4):

$$f \text{ 下凸} \Leftrightarrow f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$\Leftrightarrow \lambda(f(x) - f(x_1)) \leq (1 - \lambda)(f(x_2) - f(x))$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} (f(x) - f(x_1)) \leq \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (f(x_2) - f(x))$$

$$\Leftrightarrow \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$



Remark. f 在 I 上下凸, $U_\delta(x_0) \subset I$, 则

$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ 关于 $x_1 < x_0$ 单


增, 有上界 $\frac{f(x_0) - f(x_2)}{x_0 - x_2}$,

故 $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

存在 ($\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$), 且

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'_-(x_0), \quad \forall x < x_0, x \in I,$$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'_-(x_0)(x - x_0), \quad \forall x < x_0, x \in I.$$





Corollary. 开区间 I 上的(上、下)凸函数每一点处左右导数存在。闭区间?

Corollary. 开区间 I 上的(上、下)凸函数连续。

闭区间? (左右端点处不一定连续)

Thm. f 在 (a, b) 上可导, 则 f 在 $[a, b]$ 下凸的充要条件是:

$\forall x_0 \in (a, b), \forall x \in [a, b],$ 有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

即曲线 $y = f(x)$ 上的每一点的切线在曲线下方.



Thm. $f \in C[a, b]$, f 在 (a, b) 上可导, 则

f 在 $[a, b]$ 下(上)凸 $\Leftrightarrow f'$ 在 (a, b) 单调递增(递减).

Proof. \Rightarrow : 任取 $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, f 下凸, 则

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}, \quad \forall x \in (x_1, x_2).$$

分别令 $x \rightarrow x_1, x \rightarrow x_2$, 得

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}, \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

故 $f'(x_1) \leq f'(x_2)$, $f'(x)$ 单调递增.



←: 任取 $x_1, x, x_2 \in I, x_1 < x < x_2$, 由Cauchy中值定理,

$\exists \xi_1 \in (x_1, x), \xi_2 \in (x, x_2), s.t.$

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2).$$

f' 单调递增, $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, 则

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

故 f 下凸. \square



Thm. $f \in C[a, b]$, f 在 (a, b) 上二阶可导, 则

f 在 $[a, b]$ 下(上)凸 \Leftrightarrow 在 (a, b) 中 $f''(x) \geq (\leq) 0$.

Proof. 此为上一定理之推论. \square

Def. 若 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 两侧有不同的凸凹性, 则称 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

Thm. $(x_0, f(x_0))$ 为 $y = f(x)$ 的拐点, $f''(x_0)$ 存在, 则 $f''(x_0) = 0$.

Proof. $f''(x_0)$ 存在, 则 f' 在 x_0 的邻域中有定义. $(x_0, f(x_0))$ 为拐点, 则 $f'(x)$ 在 x_0 两侧有不同的单调性, x_0 为 $f'(x)$ 的极值点, 故 $f''(x_0) = 0$. \square



Ex. $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$, 则 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$.

Proof. 令 $f(x) = \ln x$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

故 f 上凸,

$$\frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n}{n} \leq \ln \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}. \quad \square$$



Ex. 曲线 $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的凸凹性.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t},$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)'}{x'(t)} = \frac{-1}{(1 - \cos t)^2} < 0.$$

故曲线在 $t \in [0, 2\pi]$ 上上凸. \square



§ 6. 函数作图

Def.(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y =$

$f(x)$ 的一条竖直渐近线;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$, 则称 $y = a$ 为 $y = f(x)$

的一条水平渐近线;

(3) 若 $\exists a \neq 0$ 及 b , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax - b) = 0,$$

则称 $y = ax + b$ 为 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.



Remark. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad \& \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b.$$

函数作图关键因素:

- (1)定义域;
- (2)奇偶性、周期性、对称性
- (3)渐近线
- (4)极值点与增减区间
- (5)拐点与凸凹性
- (6)特殊点, 如 $f(x_0) = 0$, 极值点, 拐点的函数值



Ex. 作图 $y = \frac{(x-1)^3}{2(x+1)^2}$.

解: 定义域: $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} y(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x) = \pm\infty,$$

有竖直渐近线 $x = -1$, 无水平渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^3}{2x(x+1)^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(y(x) - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x^2 + 2x - 1}{2(x+1)^2} = -\frac{5}{2}.$$





有斜渐近线: $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$.



$$\ln|y| = 3\ln|x-1| - 2\ln|x+1| - \ln 2, \quad \frac{y'}{y} = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{x+5}{x^2-1},$$

$$y' = \frac{x+5}{x^2-1} y = \frac{(x+5)(x-1)^2}{2(x+1)^3}, \quad \dots, \quad y'' = \frac{12(x-1)}{(x+1)^4},$$


$$y'(-5) = y'(1) = 0. \quad y''(1) = 0.$$

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	无	+	0	+
$f''(x)$	-	-	-	定	-	0	+
$f(x)$		$-\frac{27}{4}$		义		0	

极大

拐点

清华大学





Ex. $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 有 2 条渐近线.

解: $x \neq \pm 1$ 时, $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$.

$y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 是由双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 向右平移一个单位,

再向上平移一个单位得到, 因此它有两条渐近线: $x = 1, y = 1$. \square

Question. 如何求隐函数、参数函数的函数渐近线?



作业：习题4.5 No.2,4,5,9
习题4.6 No.1,2(2,3,8)