

# Algebra 1

Hugo Trebše ([hugo.trebse@gmail.com](mailto:hugo.trebse@gmail.com))

4. oktober 2024

# Kazalo

<b>1</b>	<b>Raznovrstno</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Determinante</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Struktura Endomorfizmov</b>	<b>6</b>
3.1	Korenski podprostor	8
3.2	Jordanova forma	9
3.3	Vaje	9
<b>4</b>	<b>Vektorski prostori s skalarnim produktom</b>	<b>10</b>
4.1	Skalarni produkt ter norma	10
4.2	Ortogonalnost	10
<b>5</b>	<b>Dualna preslikava</b>	<b>12</b>
5.1	Reprezentacija	13
<b>6</b>	<b>Hermitsko adjungirana preslikava</b>	<b>14</b>
6.1	Osnove	14
6.2	Normalni endomorfizmi	16
6.3	Sebi adjungirani endomorfizmi	17
6.3.1	Definitnost	18
6.4	Unitarni endomorfizmi	20
	<b>Literatura</b>	<b>22</b>

# 1 Raznovrstno

## Nasvet

- Matrika  $A$  je ničelna  $\iff \forall v \in V : Av = 0$
- Inverzne matrike komutirajo.
- Diagonalne matrike komutirajo.
- Polinoma v isti matriki komutirata  $A \in \mathcal{O}^{n \times n}$  ter  $p, q \in \mathcal{O}[X]$

$$p(A) \cdot q(A) = q(A) \cdot p(A)$$

## Izrek 1.1: Vandermonde

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j)$$

*Oris dokaza.* Determinanta je polinom v  $n$  spremenljivkah, ter, če je  $x_i = x_j$ , potem je determinanta ničelna. Po faktorskem izreku sledi, da je

$$\det V = c \prod_{i \neq j} (x_i - x_j).$$

□

## Izrek 1.2: Kvadratne matrike z ničelno sledjo

Matrika  $C \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  ima ničelno sled  $\iff$  obstajata matriki  $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ , da velja

$$C = AB - BA.$$

## 2 Determinante

### Trditev 2.1

Naj bo  $e_j = [0, \dots, 1, \dots, 0]$ , kjer je enka na  $j$ -tem mestu. Sledi, da so naslednje matrike obrnljive:

- $P_{pq} = [e_1, \dots, e_{p-1}, e_q, e_{p+1}, \dots, e_{q-1}, e_p, e_{q+1}, \dots, e_n]$ , saj je  $P_{pq}^2 = I_n$
- $P_{\alpha,k} = [e_1, e_2, \dots, \alpha e_k, \dots, e_n]$  in  $\alpha \neq 0$ , saj je  $P_{\alpha,k} \cdot P_{\frac{1}{\alpha},k} = I_n$
- $P = I_n + \alpha \cdot E_{p,q}$ , kjer ima  $E_{p,q}$  edini neničelni vnos v celici  $(p, q)$  in  $p \neq q$ , saj je  $(I_n + \alpha E_{p,q})(I_n - \alpha E_{p,q}) = I_n$

Ker so zgornje matrike obrnljive in zaporedoma predstavljajo menjavo vrstic, množenje vrstice z neničelnim skalarjem ter prištetje večkratnika vrstice neki drugi vrstici lahko na matriki  $A$  izvajamo Gaussov posotpek, ter na koncu dobimo matriko  $PAQ^{-1}$  za obrnljivi matriki  $P$  in  $Q$ .

Če imamo npr. nehomogen sistem enačb

$$Ax = b$$

za znano matriko  $A$  in stolpec  $b$  lahko tvorimo razširjeno matriko  $\hat{A} = [A|b]$  ter izvajamo Gaussov postopek na  $A$  dokler ne dobimo zgornjetrikotne matrike.

Na podoben način lahko rešimo več sistemov, saj zapišemo  $\hat{A} = [A|b_1 \dots b_k]$ . Na ta način lahko prevedemo iskanje inverza na sledeč sistem  $[A|I] = [A|e_1 e_2 \dots e_n]$ , katerega z Gaussovo eliminacijo prevedemo na  $[I|B]$ , kjer je  $A \cdot B = I$

### Izrek 2.2: Cramer

Naj bo  $A \in \mathcal{O}^{n \times n}$  ter  $b \in \mathcal{O}^n$ . Če je  $\det(A) \neq 0$  je rešitev sistema  $Ax = b$  enolična ter enaka  $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ , kjer je

$$x_j = \frac{\det[A^{(1)}, \dots, A^{(j-1)}, b, A^{(j+1)}, \dots, A^{(n)}]}{\det(A)}$$

**Izrek 2.3**

- Lastni vektorji paroma različnih lastnih vrednosti so linearno neodvisni.

- 

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \quad \text{ter} \quad \det(A^T) = \det(A)$$

- Naj bo  $A_{ij}$  minor, ki ga dobimo z delečijo  $i$ -te vrstice ter  $j$ -tega stolpca.

$$\tilde{A} = [\widetilde{a_{ij}}]_{i,j=1}^n = [(-1)^{i+j} \det(A_{ij})]_{i,j=1}^n$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \widetilde{a_{ij}} = a_{1j} \widetilde{a_{1j}} + a_{2j} \widetilde{a_{2j}} + \cdots + a_{nj} \widetilde{a_{nj}}$$

$$A\tilde{A}^T = \det(A)I$$

*Oris dokaza.* Dokaz razvoja po  $j$ -tem stolpcu sledi tako, da zaporedoma izračunamo determinante matrik

$$[A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, e_n] \quad \text{ter} \quad [A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(j-1)}, e_j, A^{(j+1)}, \dots, A^{(n)}]$$

ter na koncu

$$[A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(j-1)}, a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \cdots + a_{nj}e_n, A^{(j+1)}, \dots, A^{(n)}],$$

kjer izračun druge z antisimetričnostjo prevedemo na izračun prve, ter izračun tretje preko antisimetričnosti prevedemo na izračun druge.

Konstrukcijo inverza dokažemo tako, da opazimo da je skalarni produkt vrstic in stolpcev, ki pristanejo na diagonali enak  $\det(A)$  po prejšnji točki, skalarni produkt vrstic in stolpcev, ki pa ne končajo na diagonali pa ničlen, saj je enak determinanti matrike  $[A^{(1)}, \dots, A^{(k-1)}, A^{(j)}, A^{(k+1)}, \dots, A^{(n)}]$ .  $\square$

**Trditev 2.4**

Kot trivialne posledice definicije determinante kot  $n$ -linearni antisimetrični funkcional dobimo naslednje:

- Menjava dveh vrstic/stolpcev spremeni predznak determinante.
- Prištevanje vrstice drugi vrstici ne spremeni vrednosti determinante.
- Množenje stolpca/vrstice s skalarjem  $\lambda$  spremeni determinanto za faktor  $\lambda^n$

**Nasvet**

Determinanto si lahko predstavljamo na par načinov: kot vsoto produktov, ki vsebuje znak permutacije - tedaj je najuporabnejši razpis po vrstici/stolpcu, kot količino ki »meri« obrnljivost matrike ter kot  $n$ -linearni antisimetrični funkcional, ki trivialno poda zgornjo trditev.

### 3 Struktura Endomorfizmov

#### Definicija 3.1

- $\Delta_A(X) = \det(A - XI)$
- $\sigma(A) = \text{spec}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \exists v \neq 0 \in V. Av = \lambda v\}$
- **Algebraična večkratnost** lastne vrednosti  $\lambda$  je večkratnost ničle  $\lambda$  v  $\Delta_A(X)$ , **geometrična večkratnost** pa  $\dim(\ker(A - \lambda I))$

#### Izrek 3.2: Cayley-Hamilton

Naj bo  $A \in \mathcal{O}^{n \times n}$  ter karakteristični polinom  $\Delta_A(X)$ . Potem je  $\Delta_A(A) = 0$ .

*Oris dokaza.*

$$(A - \lambda I)(\widetilde{A - \lambda I})^T = \det(A - \lambda I)I = \Delta_A(\lambda)I,$$

upoštevamo, da so vnosi prirejenke polinomi stopnje kvečjemu  $n - 1$ , nato interpretiramo kot enakost matrik, sledi da so istoležni vnosi enaki ter dobimo telescoping.  $\square$

#### Izrek 3.3

$$\lambda \text{ ničla } \Delta_A(X) \implies \lambda \text{ ničla } m_A(X).$$

*Oris dokaza.*  $\lambda$  je lastna vrednost,  $\exists v \neq 0$ , da je  $Av = \lambda v$ . Delimo  $m_A(X)$  z  $X - \lambda$  ter dobimo

$$\begin{aligned} m_A(X) &= q(X)(X - \lambda) + m_A(\lambda), \\ 0 &= m_A(A) = q(A)(A - \lambda I) + m_A(\lambda)I \\ 0 &= q(A)(A - \lambda I)v + m_A(\lambda)v = m_A(\lambda)v \end{aligned}$$

$\square$

#### Izrek 3.4

Naj bo  $m_{\mathcal{A}}(X)$  minimalni polinom invertibilnega endomorfizma  $\mathcal{A}$ . Potem je  $m_{\mathcal{A}^{-1}}(X)$  večkratnik recipročnega polinoma  $\mathcal{A}$ . Sepravi,

$$m_{\mathcal{A}}(X) = \sum_{i=0}^k a_i X^i \implies m_{\mathcal{A}^{-1}}(X) = \frac{1}{a_0} \sum_{i=0}^k a_{k-i} X^i = \frac{1}{a_0} m_{\mathcal{A}}\left(\frac{1}{X}\right).$$

**Izrek 3.5: Diagonalizacija**

Matrika  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je diagonalizabilna, natanko tedaj ko:

- Ima  $n$  linearno neodvisnih lastnih vektorjev.
- Vaska geometrična večkratnost je enaka algebraični.
- Minimalni polinom  $A$  ima same enostavne ničle.

### 3.1 Korenski podprostor

Dekompozicija na direktno vsoto invariantnih korenskih podprostorov poda bločno diagonalizacijo.

#### Izrek 3.6

Korenski podprostor za lastno vrednost  $\lambda_j$

$$W_j = \ker((\mathcal{A} - \lambda_j \text{id}_V)^{m_j})$$

je invarianten za endomorfizem  $\mathcal{A}$ . Če so  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$  vse lastne vrednosti za  $\mathcal{A}$  velja

$$V = \bigoplus_{j=1}^r W_j$$

*Oris dokaza.* Definiramo

$$p_i(X) = \frac{m_{\mathcal{A}}(X)}{(X - \lambda_i)^{m_i}}$$

ter uporabimo »Bezoutovo lemo«, da dobimo:

$$p_1(\mathcal{A})q_1(\mathcal{A}) + p_2(\mathcal{A})q_2(\mathcal{A}) + \dots + p_r(\mathcal{A})q_r(\mathcal{A}) = \text{id}_V.$$

Obstoj razcepa vektorja  $x \in V$  poda konstrukcija  $x_j = p_j(\mathcal{A})q_j(\mathcal{A})x$ , hitro preverimo tudi  $x_j \in W_j$ . Enoličnost dobimo, saj bi v nasprotnem primeru obstajali  $z_i \in W_i$ , da je  $\sum_{i=1}^r z_i = 0$   $\square$

#### Izrek 3.7

Minimalni ter karakteristični polinom zožitve  $\mathcal{A}$  na  $W_j$  sta, kot pričakovano,

$$m_{\mathcal{A}|_{W_j}}(X) = (X - \lambda_j)^{m_j} \quad \text{ter} \quad \Delta_{\mathcal{A}|_{W_j}}(X) = (X - \lambda_j)^{n_j}$$

*Oris dokaza.* Po definiciji je minimalni polinom  $\mathcal{A}|_{W_j}$  oblike  $(X - \lambda_j)_{j,j}^{s_j}$ , ker ničle minimalnega ter karakterističnega sovpadata hitro dobimo, da je karakteristični polinom zožitve predpisane oblike. Da enako velja za minimalnega velja, ker bi drugače polinom  $(X - \lambda_1)^{s_1} \dots (X - \lambda_r)^{s_r}$  bil večkratnik  $m_{\mathcal{A}}(X)$ , po dekompoziciji, hkrati pa (prav tako po dekompoziciji) velja  $m_j \geq s_j$   $\square$

#### Izrek 3.8

Matrika je diagonalizabilna  $\iff$  vse ničle minimalnega polinoma so enostavne.

*Oris dokaza.* Diagonalizabilnost  $\implies$  enostavne ničle, ker lahko preverimo, da je

$$(\mathcal{A} - \lambda_1 \text{id}_V) \dots (\mathcal{A} - \lambda_r \text{id}_V) = 0,$$

po dekompoziciji. V obratno smer pa z zožitvami.  $\square$



## 3.2 Jordanova forma

### Izrek 3.9

Analiziramo nilpotentni endomorfizem  $\mathcal{N}$  reda  $r$ . Definiramo  $V_j = \ker(N^j)$

- Za  $j \geq n$  je  $V_j = V$
- $x \in V_j \iff \mathcal{N}x \in V_{j-1}$ .
- $\{0\} = V_0 \subseteq V_1 \subseteq \dots \subseteq V_n = V$
- $\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subseteq V_n = V$

*Oris dokaza.* 4. točka sledi, saj obstaja direktni komplement  $\ker(N^{j-1})$  v  $V_j$  □

### Trditev 3.10

Če so  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_r\}$  linearno neodvisni elementi  $V_j$ , ter je  $\text{Lin}(\mathcal{B}) \cup V_{j-1} = \{0\}$  so  $\mathcal{N}v_1, \dots, \mathcal{N}v_r$  linearno neodvisni elementi  $V_{j-1}$ , ter velja  $\mathcal{N}(\mathcal{B}) \cup V_{j-2} = \{0\}$

Zgornja lema omogoča, da dekompoziramo  $V$  na direktno vsoto vektorskih podprostorov, v katerih se zaporedoma nahajajo le vektorji, ki jih uniči neka specifična potenca  $\mathcal{N}$ . Slike teh vektorjev se pomikajo dol po verigi, kar da končno urejenost Jordanove baze.

### Lema 3.11: Jordanova kanonična forma

Za lastno vrednost  $\lambda_j$  v Jordanovi kanonični formi matrike  $A$  velja:

- Lastna vrednost se na diagonalni pojavi tolikokrat, kot je njena algebraična večkratnost
- Velikost največje celice je  $m_j \times m_j$ , kjer je  $m_j$  večkratnost ničle  $\lambda_j$  v  $m_A$
- Število celic za  $\lambda_j$  je enako številu linearno neodvisnih lastnih vektorjev.

## 3.3 Vaje

### Izrek 3.12

- Za  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  z lastnimi vrednostmi (štete z večkratnostmi)  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  velja

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{ter} \quad \det(A) = (-1)^n \cdot \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

- Računanje potenc matrik (ali njihovih korenov) je dosti lažje v diagonalizirani obliki.

*Oris dokaza.* Prva točka je očitna po analizi karakterističnega polinoma. □

## 4 Vektorski prostori s skalarnim produktom

### 4.1 Skalarni produkt ter norma

#### Definicija 4.1: Skalarni produkt

Naj bo  $V$  vektorski prostor ter  $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ . Skalarni produkt je preslikava  $\langle \rangle : V \rightarrow \mathbb{F}$  za katero velja:

- $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ .
- $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ .
- $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ .
- $\langle x, x \rangle \geq 0$  z enakostjo natanko tedaj, ko je  $x = 0$ .

#### Izrek 4.2: Norma

- $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  je homogena, pozitivna, ter zanjo velja trikotniška neenakost.
- Če normo inducira skalarni produkt zanjo velja Pitagorov izrek ter paralelogramska enakost:

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle = 0 &\implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \\ \|x - y\|^2 + \|x + y\|^2 &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)\end{aligned}$$

#### Izrek 4.3: Cauchy-Schwartz-Bunjakowski

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle} = \|x\| \cdot \|y\|$$

*Oris dokaza.*  $p(t) = \langle t\alpha x + y, t\alpha x + y \rangle$  je za  $\alpha \in \mathbb{C}$ , za katerega velja  $|\alpha| = 1$  ter  $\alpha \langle x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$ , nenegativen polinom druge stopnje.  $\square$

### 4.2 Ortogonalnost

#### Definicija 4.4

- Množica  $P$  je ortogonalna, če je  $\forall x, y \in P, \langle x, y \rangle = 0$ .
- Množici  $M, N$  sta pravokotni, če je  $\forall x \in M, y \in N, \langle x, y \rangle = 0$
- Ortogonalni komplement množice  $M$  je množica

$$M^\perp = \{x \in V \mid \forall y \in M. \langle x, y \rangle = 0\}$$

**Izrek 4.5: Gram-Schmidt**

$V$  je vektorski prostor in  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  so linearno neodvisni. Potem obstajajo  $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , ki so ortogonalni ter velja:

$$\forall k < n : \text{Lin}\{x_1, \dots, x_k\} = \text{Lin}\{y_1, \dots, y_k\}$$

*Oris dokaza.*  $y_1 = x_1$  ter iščemo  $y_{m+1}$  v obliki  $y_{m+1} = x_{m+1} - \alpha_1 y_1 - \dots - \alpha_m y_m$ . Ker so  $\{y_i\}$  ortogonalni sledi, da je  $\langle x_{m+1}, y_j \rangle = \alpha_j \cdot \langle y_j, y_j \rangle$ .  $\square$

**Izrek 4.6: Standardne lastnosti**

- Ortogonalna množica brez 0 je linearno neodvisna.
- Če je  $\{v_i\}_{1 \leq i \leq n}$  ortonormirana baza prostora  $V$  je za vse  $x, y \in V$ :

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, v_i \rangle v_i \quad \text{ter} \quad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, v_i \rangle \overline{\langle y, v_i \rangle}$$

- Pravokotna vsota podprostorov je direktna
- Za vsak  $W \subseteq V$  je  $V = W \oplus W^\perp$

**Naloga 4.7: Pravokotni projektor**

Pravokotna projekcija na podprostor  $W \subseteq V$  je linearna preslikava:

$$\text{pr}_W(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i,$$

kjer je  $\{w_1, \dots, w_k\}$  ortogonalna baza za  $W$ . Pokaži, da je najbližja točka vektorju  $v$ , ki je v podprostoru  $W$ , ravno  $\text{pr}_W(v)$ .

## 5 Dualna preslikava

### Definicija 5.1

Če je  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  baza prostora  $V$  je njena dualna baza prostora  $V^*$  linearnih funkcionalov na prostoru  $V$  oblike  $\mathcal{B}_{V^*} = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ , kjer velja

$$\varphi_j(v_k) = \begin{cases} 1, & \text{če je } i = j \\ 0, & \text{drugače} \end{cases}$$

Kot zanimivost omenimo, da če opazujemo vektorje iz  $\mathcal{B}_V$  kot stolpce v  $\mathbb{F}^n$ , potem rotacija stolpcev za  $90^\circ$  v nasprotno smer urinega kazalca predstavlja izomorfizem, ki slika  $\mathcal{B}_V$  v dualno bazo, če si  $V^*$  zapišemo kot vrstice v  $\mathbb{F}^n$ .

Hitro opazimo, da izračun vrednosti linearnega funkcionala  $\varphi$  v vektorju  $x \in V$  ustreza »skalarnem produktu« vrstice, ki predstavlja dekompozicijo  $\varphi$  glede na  $\mathcal{B}_{V^*}$ , ter stolpca, ki predstavlja dekompozicijo  $x$  glede na  $\mathcal{B}_V$ .

### Izrek 5.2

Naj bo  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$  ter  $\mathcal{B}_V$  in  $\mathcal{B}_W$  zaporedoma bazi  $V$  in  $W$ . Definirajmo

$$\mathcal{A}^d(\psi) = \psi \circ \mathcal{A} \quad \text{kjer je } \mathcal{A}^* \in \mathcal{L}(W^*, V^*),$$

ter sta  $W^*$  ter  $V^*$  prostora linearnih funkcionalov na vektorskih prostorih  $W$  in  $V$ .

Če je  $A = \mathcal{A}_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}$ , potem linearni preslikavi  $\mathcal{A}^d$  glede na dualni bazi  $\mathcal{B}_V$  ter  $\mathcal{B}_W$  pripada matrika  $A^T$ . Preslikavo  $\mathcal{A}^d$  imenujemo dualna preslikava preslikavi  $\mathcal{A}$ .

*Oris dokaza.* Na dva načina izračunamo  $\psi_j \circ \mathcal{A}(v_k)$ , kjer je  $\psi_j \in \mathcal{B}_{W^*}$  ter  $v_k \in \mathcal{B}_V$ . □

Tako dobimo znane lastnosti transponiranih matrik, kot so aditivnost, homogenost ter  $(BA)^T = A^T B^T$ , prav tako pa od baze odvisen izomorfizem med  $V$  in  $V^*$ .

## 5.1 Reprezentacija

Želimo od baze neodvisen izomorfizem med  $V$  in  $V^*$ .

### Definicija 5.3

Naj bo  $\varphi_z(x) : x \rightarrow \langle x, z \rangle$  preslikava med  $V$  in  $\mathbb{F}$ . Očitno je  $\varphi_z$  linearni funkcional.

### Trditev 5.4

$\Phi : z \rightarrow \varphi_z$  je kot preslikava iz  $V$  v  $V^*$  poševni izomorfizem.

*Oris dokaza.* Poševna homogenost ter aditivnost sta trivialni. Injektivnost je očitna, saj če za linearni preslikavi  $\mathcal{B}, \mathcal{C}$  ter vse  $x, y$  velja

$$\langle x, \mathcal{B}y \rangle = \langle x, \mathcal{C}y \rangle,$$

potem je  $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ .

Obravnavajmo surjektivnost. Če je  $\varphi$  trivialen funkcional je izbira  $z = 0$  očitna. Denimo, da je  $\varphi$  netrivialen linearni funkcional. Potem je kot preslikava iz  $V$  v  $\mathbb{F}$  surjektivna, po dimenzijski enačbi za  $W = \ker(\varphi)$  velja  $\dim(W) = n - 1$ , sledi da je  $V = W \oplus W^\perp$ , kjer je  $W^\perp$  enodimenzionalni vektorski prostor, posledično oblike  $W^\perp = \mathbb{F} \cdot u$  za nek vektor  $\|u\| = 1$ .

Naj bo  $v \in V$  poljuben, sledi da je  $v = x + \lambda u$  za  $x \in W, y \in W^\perp$ . Sledi  $\langle v, u \rangle = \lambda$ . Posledično je  $\varphi(v) = \varphi(\lambda u) = \langle v, u \rangle \varphi(u) = \langle v, u \overline{\varphi(u)} \rangle$   $\square$

Posledica je:

### Izrek 5.5: Rieszov reprezentacijski izrek

Če je  $V$  končnorazsežen vektorski prostor s skalarnim produktom, potem za vsak  $\varphi \in V^*$  obstaja enolično določen  $z \in V$ , da je

$$\varphi(x) = \langle x, z \rangle$$

## 6 Hermitsko adjungirana preslikava

### 6.1 Osnove

#### Definicija 6.1

Naj bo  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U, V)$  ter  $\Phi_U$  in  $\Phi_V$  izomorfizma med  $U$  in  $U^*$  ter  $V$  in  $V^*$ , kot ju karakterizira Rieszov izrek. Potem je  $\mathcal{A}^* \in \mathcal{L}(V, U)$   $\mathcal{A}^* = \Phi_U^{-1} \circ \mathcal{A}^d \circ \Phi_V$  Hermitsko adjungirana preslikava preslikavi  $\mathcal{A}$ .

#### Izrek 6.2: Lastnosti Hermitsko adjungirane preslikave

- $\mathcal{A}^*$  je linearna
- $\mathcal{A}^*$  je enolična preslikava, da za  $\forall x \in U, y \in V$  velja

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$$

- $\langle \mathcal{A}^*x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$ , posledično  $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$
- Standardne lastnosti, ki bi jih pričakovali od kompozicije transponiranja ter konjugiranja:

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*, \quad (\alpha \mathcal{A})^* = \bar{\alpha} \mathcal{A}^*, \quad (\mathcal{A}\mathcal{C})^* = \mathcal{C}^* \mathcal{A}^*$$

*Oris dokaza.* Prva točka je trivialna. Pri drugi točki enoličnost sledi po znani lemi o ujemanju preslikav, obstoj pa preverimo računsko tako, da prevedemo  $\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$  v  $\langle \mathcal{A}x, y \rangle$  po definiciji  $\mathcal{A}^*$ . Tretja točka sledi po uporabi druge točke ter poševne simetričnosti skalarne produkta, zadnja pa računsko po definiciji Hermitsko adjungirane preslikave.  $\square$

#### Trditev 6.3: Matrika Hermitsko adjungirane preslikave

Naj bo  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U, V)$  ter  $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V$  ortonormirani bazi. Naj bo  $A = [a_{ij}]$  matrika  $\mathcal{A}$  glede na te bazi ter  $\mathcal{A}^*$  Hermitsko adjungirana preslikava preslikavi  $\mathcal{A}$ . Sledi:

- $a_{ij} = \langle \mathcal{A}u_j, v_i \rangle$
- $\mathcal{A}^*$  glede na bazi  $\mathcal{B}_V$  in  $\mathcal{B}_U$  pripada matrika  $A^H = [b_{ij}]$ , kjer je  $b_{ij} = \overline{a_{ji}}$

*Oris dokaza.*

$$\begin{aligned} \mathcal{A}u_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i &\implies \langle \mathcal{A}u_j, v_i \rangle = a_{ij}\langle v_i, v_i \rangle = a_{ij} \\ b_{ij} = \langle \mathcal{A}^*v_j, u_i \rangle &= \langle v_j, \mathcal{A}u_i \rangle = \overline{\langle \mathcal{A}u_i, v_j \rangle} = \overline{a_{ji}} \end{aligned}$$

$\square$

#### Lema 6.4: O pravokotnih vsotah

$\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U, V)$ , potem je  $U = \ker(\mathcal{A}) \oplus \operatorname{im}(\mathcal{A}^*)$  ter  $\operatorname{im}(\mathcal{A}^*) = (\ker(\mathcal{A}))^\perp$

*Oris dokaza.* Dokazati je treba le drugo izjavo, kar dosežemo z obema inkluzijama. Inkluzija  $\text{im}(\mathcal{A}^*) \subseteq (\ker(\mathcal{A}))^T$  sledi hitro po karakteristični lastnosti  $\mathcal{A}^*$ . Za dokaz obratne inkluzije pa predpostavimo  $u \in (\text{im}(\mathcal{A}^*))^T$  ter po analognem postopku dobimo  $u \in \ker(\mathcal{A})$ . Ker ortogonalni komplement obrne vsebovanost sledi tudi druga inkluzija.  $\square$

### Izrek 6.5: Spekter adjungirane preslikave je konjugiran

Naj bo  $\sigma(\mathcal{A})$  spekter preslikave  $\mathcal{A}$ . Potem je  $\sigma(\mathcal{A}^*) = \overline{\sigma(\mathcal{A})}$ .

*Oris dokaza.* Če je jedro preslikave  $\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}_V$  netrivialno je slika preslikave  $(\mathcal{A} - \lambda \cdot \text{id}_V)^* = \mathcal{A}^* - \bar{\lambda} \cdot \text{id}_V$  nepolna, sledi da je jedro te preslikave prav tako netrivialno.  $\square$

### Lema 6.6: O invariantnih podprostorih

Naj bo  $\mathcal{A}$  endomorfizem  $V$  ter  $U \subseteq V$ . Tedaj je  $U$  invarianten za  $\mathcal{A}$  natanko tedaj, ko je  $U^\perp$  invarianten za  $\mathcal{A}^*$ .

*Oris dokaza.* Ker sta  $\cdot^*$  in  $\cdot^\perp$  involuciji je zadosti pokazati le eno implikacijo. Naj bo  $U$  invarianten za  $\mathcal{A}$ . Potem je za vsak  $x \in U^\perp$  in vse  $y \in U$   $\langle \mathcal{A}y, x \rangle = 0$ , sledi  $\langle y, \mathcal{A}^*x \rangle = 0$ . Ker ta enakost velja za vse  $y \in U$  je  $\mathcal{A}^*x \in U^\perp$ .  $\square$

### Izrek 6.7: Schur

Za unitaren prostor  $V$  ter  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  obstaja ortonormirana baza, v kateri je matrika  $\mathcal{A}$  zgornjetrikotna.

*Oris dokaza.* Gram-Schmidtov postopek na Jordanovi bazi.  $\square$

### Naloga 6.8: Gramova matrika

Naj bo  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  baza vektorskega prostora  $V$  s skalarnim produktom. Definirajmo **Gramovo matriko**:

$$G = [\langle v_i, v_j \rangle]_{i,j=1}^n.$$

Pokaži, da je  $G$  obrnljiva matrika, ter da za  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  velja:

$$\mathcal{A}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}^* = \overline{G}^{-1} \circ \mathcal{A}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}^H \circ \overline{G}$$

## 6.2 Normalni endomorfizmi

Iz poglavja o strukturi endomorfizma vemo kdaj se endomorfizem da diagonalizirati, sedaj pa nas zanima še diagonalizacija v ortonormirani bazi.

Če se da matriko  $A$  diagonalizirati v ortonormirani bazi sledi, da je tudi matrika  $A^H$  diagonalna v ortonormirani bazi, posledično velja

$$AA^H = A^H A.$$

### Definicija 6.9: Normalnost

Endomorfizem  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  je *normalen*, če velja  $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$ . Matrika  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je *normalna*, če je  $AA^H = A^H A$ .

Vsak endomorfizem, ki ga lahko diagonaliziramo v ortonormirani bazi je posledično normalen. Velja tudi, da normalnim endomorfizmom v ortonormiranih bazah pripadajo normalne matrike.

### Trditev 6.10

Endomorfizem  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U)$  je normalen natanko tedaj, ko  $\forall x, y \in U$  velja:

$$\langle \mathcal{A}^* x, \mathcal{A}^* y \rangle = \langle \mathcal{A} x, \mathcal{A} y \rangle.$$

Zgornja trditev poda naslednje posledice:

- $\|\mathcal{A}^* x\| = \|\mathcal{A} x\|$  za vse  $x \in U$ .
- $\ker(\mathcal{A}^*) = \ker(\mathcal{A})$ .
- $\mathcal{A} - \alpha \text{id}_U$  je normalen za vsak  $\alpha \in \mathbb{F}$
- Dvojnost lastnih vektorjev:  $\mathcal{A}x = \alpha x \iff \mathcal{A}^* x = \bar{\alpha} x$ .
- $\sigma(\mathcal{A}^*) = \overline{\sigma(\mathcal{A})}$ , saj je  $\ker(\mathcal{A} - \alpha \text{id}_U) = \ker((\mathcal{A} - \alpha \text{id}_U)^*) = \ker(\mathcal{A}^* - \bar{\alpha} \text{id}_U)$
- Lastna vektorja pripadajoča različnim lastnim vrednostim sta pravokotna.

*Oris dokaza.* Po osnovni lastnosti Hermitsko adjungirane preslikave je

$$\langle \mathcal{A}^* x, \mathcal{A}^* y \rangle = \langle x, \mathcal{A} \mathcal{A}^* y \rangle.$$

Zadnjo točko dokažemo tako, da glede na  $\lambda_2$  ter dvojnost lastnih vektorjev izračunamo  $\lambda_1 \langle x_1, x_2 \rangle$  za lastna vektorja  $x_1, x_2$ , ki pripadata lastnim vrednostim  $\lambda_1, \lambda_2$ .  $\square$

### Izrek 6.11: Normalnost je diagonalizabilnost

Naj bo  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U)$  normalen endomorfizem nad poljem  $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ . Sledi:

- Če je  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ , potem se da  $\mathcal{A}$  diagonalizirati v ortonormirani bazi nad  $\mathbb{C}$ .
- Če je  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$  in ima karakteristični polinom  $\Delta_{\mathcal{A}}(X)$  zgolj realne ničle, potem se da  $\mathcal{A}$  diagonalizirati v ortonormirani bazi nad  $\mathbb{R}$ .



*Oris dokaza.* Izvajamo indukcijo na dimenziji prostora. Denimo, da je dimenzija prostora  $U$  enaka  $n + 1$  ter da vse ničle  $\Delta_{\mathcal{A}}$  ležijo v  $\mathbb{F}$ . Najdemo normirani lastni vektor  $v_1$  z lastno vrednostjo  $\lambda_1$  za  $\mathcal{A}$  ter opazujemo njegov ortogonalni komplement  $v_1^\perp$ . Ker je prostor  $\mathbb{F} \cdot v_1$  invarianten za  $\mathcal{A}$  je  $v_1^\perp$  invarianten za  $\mathcal{A}^*$ . Ker je  $\mathcal{A}^* v_1 = \overline{\lambda_1} v_1$  je  $\mathbb{F} \cdot v_1$  invarianten tudi za  $\mathcal{A}^*$ , posledično je  $v_1^\perp$  invarianten za  $\mathcal{A}$ .

Ker induksijska predpostavka velja za endomorfizem  $\mathcal{A}|_{v_1^\perp}$  prostora  $v_1^\perp$  dobimo željeno.  $\square$

### Izrek 6.12

$\mathcal{A}$  je normalen endomorfizem, če obstaja ortonormirana baza iz lastnih vektorjev.

## 6.3 Sebi adjungirani endomorfizmi

### Definicija 6.13

- $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  je *sebi adjungiran*, če velja  $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$
- Matrika  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je *hermitska*, če je  $A^H = A$ .
- Matrika  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  je *simetrična*, če je  $A^T = A$ .

Sebi adjungiranim endomorfizmom glede na ortonormirano bazo pripadajo hermitske matrike.

### Trditev 6.14: Lastnosti sebi adjungiranih endomorfizmov

- $\mathcal{A}$  je sebi adjungiran  $\iff \langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$
- Naj bo  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(U)$  sebi adjungiran. Če je  $\forall x \in U \langle \mathcal{A}x, x \rangle = 0$ , potem je  $\mathcal{A} = 0$ .

*Oris dokaza.* Lotimo se druge točke:  $\langle \mathcal{A}(x + y), x + y \rangle = \langle \mathcal{A}x, y \rangle + \langle y, \mathcal{A}x \rangle$ . Če je  $y = \mathcal{A}x$  dobimo ničelnost.  $\square$

### Izrek 6.15

Vse ničle karakterističnega polinoma sebi adjungiranega endomorfizma so realne.

*Oris dokaza.* Zaradi dvojnosti lastnih vektorjev velja, da je  $\mathcal{A}v = \alpha v \iff \mathcal{A}^*v = \bar{\alpha}v$ .  $\square$

Naj bo  $V$  unitaren vektorski prostor. Za vsak  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  obstajata enolično določena sebi adjungirana endomorfizma  $\mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathcal{L}(V)$ , da je  $\mathcal{A} = \mathcal{B} + i\mathcal{C}$ . Nastavimo namreč

$$\mathcal{B} = \frac{1}{2}(\mathcal{A} + \mathcal{A}^*) \quad \text{ter} \quad \mathcal{C} = \frac{-i}{2}(\mathcal{A} - \mathcal{A}^*)$$

### Izrek 6.16: Karakterizacija sebi adjungiranih endomorfizmov

$\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  je sebi adjungiran  $\iff \mathcal{A}$  lahko diagonaliziramo v ortonormirani bazi ter je pripadajoča matrika realna.

### 6.3.1 Definitnost

#### Definicija 6.17

Naj bo  $\mathcal{A}$  sebi adjungiran endomorfizem prostora  $V$ . Pravimo, da je *pozitivno semi-definiten*, če za vse  $x \in V$  velja

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle \geq 0.$$

Če velja stroga neenakost je  $\mathcal{A}$  *pozitivno definiten*, analogno definiramo *negativno semi-definitnost* ter *negativno definitnost*.

Pozitivno definitnim sebi adjungiranim endomorfizmom glede na ortonormirane baze pripadajo pozitivno definitne matrike, saj je po definiciji  $\mathcal{A}x = Ax$ .

#### Izrek 6.18

Sebi adjungiran endomorfizem  $\mathcal{A}$  je pozitivno (semi)definiten natanko tedaj, ko so vse njegove lastne vrednosti pozitivne (nenegativne).

*Oris dokaza.* Iz leve v desno je očitno. Iz desne v levo uporabimo dejstvo, da lahko  $\mathcal{A}$  diagonaliziramo v ortonormirani bazi nad  $\mathbb{R}$ .  $\square$

Analogna trditev velja za negativno (semi)definitne endomorfizme, dokaz je prav tako analogen.

Naslednji izrek je trivialna posledica pozitivnosti/nenegativnosti lastnih vrednosti  $\mathcal{A}$ .

#### Trditev 6.19

Sebi adjungiran endomorfizem  $\mathcal{A}$  s karakterističnim polinomom

$$\Delta_{\mathcal{A}}(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0$$

je:

- Pozitivno definiten  $\iff$  za vse  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $(-1)^k a_k > 0$ .
- Pozitivno semidefiniten  $\iff$  obstaja  $m \in \mathbb{N}$ , da je za  $k < m$ ,  $a_k = 0$  ter za  $k \geq m$ ,  $(-1)^k a_k > 0$
- Negativno definiten  $\iff$  za vse  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $(-1)^n a_k > 0$ .
- Negativno semidefiniten  $\iff$  obstaja  $m \in \mathbb{N}$ , da je za  $k < m$ ,  $a_k = 0$  ter za  $k \geq m$ ,  $(-1)^n a_k > 0$ .

*Oris dokaza.* Vietove formule.  $\square$

#### Trditev 6.20

$A$  je pozitivno (semi)definitna matrika. Potem je matrika, ki jo dobimo z izbrisom nekaj istoležnih vrstic in stolpcev tudi pozitivno (semi)definitna

*Oris dokaza.* Vektorje iz prostora  $\mathbb{F}^{n-|I|}$  razširimo v vektorje prostora  $\mathbb{F}^n$ , kjer so neobstoječe komponente ničelne.  $\square$

### Lema 6.21

Determinanta matrike je enaka produktu lastnih vrednosti.

Ker je  $A$  pozitivno definitna  $\iff -A$  negativno definitna je naslednji izrek uporabem tudi v tem primeru.

### Izrek 6.22: Sylvestrov kriterij

Matrika  $A$  je pozitivno definitna  $\iff A$  je Hermitska in vsi njeni vodilni minorji so strogo pozitivni.

Opomnik: vodilni minorji so poddeterminante, ki jih dobimo z izbrisom prvih nekaj istoležnih vrstic ter stolpcev.

*Oris dokaza.* Iz leve v desno sledi po izreku zgoraj. Iz desne v levo dokažemo z indukcijo na velikosti matrike. Matrika  $A' \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ , ki jo dobimo z izbrisom  $n$ -te vrstice in stolpca, je pozitivno definitna. Denimo, da  $A$  ni pozitivno definitna, ker je hermitska ima samo realne lastne vrednosti, ker je  $\det(A) > 0$  obstajata vsaj dve negativni lastni vrednosti,  $\alpha$  in  $\beta$ . Ker je  $A$  hermitska jo lahko diagonaliziramo v ortonormirani bazi, med baznimi vektorji sta lahko normirana ter pravokotna lastna vektorja  $u$  in  $v$  za  $\alpha$  in  $\beta$ . Potem obstaja izbira skalarjev  $\lambda, \psi$ , da je zadnja komponenta neničelnega vektorja  $x = \lambda u + \psi v$  ničelna. Potem lahko vložimo  $x \in \mathbb{F}^n$  v  $x' \in \mathbb{F}^{n-1}$ . Sledi:

$$\langle A'x', x' \rangle = \langle Ax, x \rangle = \langle A(\lambda u + \psi v), \lambda u + \psi v \rangle = \lambda^2 \alpha + \psi^2 \beta < 0,$$

kar je v protislovju z pozitivno definitnostjo.  $\square$

Če v izreku zgoraj zamenjamo pozitivno definitnost s pozitivno semidefinitnostjo ter pozitivnost **vodilnih** minorjev z nenegativnostjo le-teh, trditev postane napačna.

Brez dokazov navedemo naslednja izreka.

### Izrek 6.23

Matrika je pozitivno semidefinitna  $\iff$  je hermitska in ima vse glavne minorje nenegativne

Opomnik: glavni minorji so determinante tistih matrik, ki jih dobimo z izbrisom istoležnih vrstic in stolpcev.

### Izrek 6.24

Matrika je negativno definitna  $\iff$  je hermitska in ima vse vodilne minorje lihega reda negativne, vse vodilne minorje sodega reda pa pozitivne.

## 6.4 Unitarni endomorfizmi

### Definicija 6.25

- $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  je *unitaren*, če velja  $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A} = \text{id}_V$ .
- $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je *unitarna*, če velja  $AA^H = A^H A = I_n$ .
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  je *ortogonalna*, če velja  $AA^T = A^T A = I_n$ .

Očitno sledi, da unitarnim endomorfizmom glede na ortonormirano bazo pripadajo unitarne matrike.

### Trditev 6.26: Karakterizacija unitarnih endomorfizmov

$\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$  je unitaren, natanko tedaj ko velja ena izmed naslednjih lastnosti:

- Za vse  $x, y \in V$  velja  $\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle = \langle x, y \rangle$ . Intuitivno to pomeni, da  $\mathcal{A}$  ohranja dolžine in kote; je avtomorfizem  $V$  kot vektorskega prostora s skalarnim produktom.
- Za vse  $x \in V$  je  $\|\mathcal{A}x\| = \|x\|$ .

### Trditev 6.27

Endomorfizem  $\mathcal{A}$  je unitaren natanko tedaj, ko velja ena izmed naslednjih trditev.

- $\mathcal{A}$  vsako ortonormirano množico preslika v ortonormirano množico
- $\mathcal{A}$  vsako ortonormirano bazo preslika v ortonormirano bazo.
- $\mathcal{A}$  vsaj eno ortonormirano bazo preslika v ortonormirano bazo.

Sledi, da je matrika unitarna oz. ortogonalna natanko tedaj, ko njeni stolpci/vrstice tvorijo ortonormirano bazo.

Hitro preverimo tudi naslednje dejstvo:

### Trditev 6.28

Množica unitarnih endomorfizmov prostora  $V$  je grupa za komponiranje

### Izrek 6.29

Spekter unitarnega endomorfizma je vsebovan v enotski krožnici.

*Oris dokaza.* Naj bo  $\lambda$  lastna vrednost za lastni vektor  $v$ . Velja:

$$\|v\|^2 = \|\mathcal{A}v\|^2 = \|\lambda v\|^2 = |\lambda|^2 \|v\|^2.$$

□

**Izrek 6.30**

Naj bo  $V$  unitaren prostor in  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V)$ . Potem je  $\mathcal{A}$  unitaren natanko tedaj, ko se ga da diagonalizirati v ortonormirani bazi in so na diagonalni številke iz enotske krožnice.

*Oris dokaza.* Iz leve proti desni sledi, ker so vsi unitarni endomorfizmi normalni in iz prejšnje trditve. Iz desne proti levi pa, ker glede na ortonormirano bazo matriki  $A$  kot pripada  $A^H$ , očitno pa je  $AA^H = I_n$   $\square$

**Definicija 6.31**

Naj sta  $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$  matriki.

- $B$  je *unitarno podobna*  $A$ , če obstaja unitarna matrika  $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , da je  $B = U^H A U = U^{-1} A U$ .
- Realna matrika  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  je *ortogonalno podobna* realni matriki  $A$ , ko obstaja ortogonalna matrika  $Q$ , da je  $B = Q^T A Q = Q^{-1} A Q$

Očitno sta ortogonalna ter unitarna podobnost ekvivalenčni relaciji. Dokažemo tudi, da sta matriki unitarno/ortogonalno podobni natanko tedaj, ko pripadata istemu endomorfizmu.

Če združimo že dokazane izreke dobimo:

**Izrek 6.32**

- Vsaka matrika  $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$  je unitarno podobna zgornjetrikotni matriki.
- $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je normalna natanko tedaj, ko je unitarno podobna diagonalni.
- $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je hermitska natanko tedaj, ko je unitarno podobna realni diagonalni.
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  je simetrična natanko tedaj, ko je ortogonalno podobna realni diagonalni matriki.
- $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  je unitarna natanko tedaj, ko je unitarno podobna diagonalni matriki z lastnimi vrednostmi iz enotske krožnice.

## Literatura

- [1] doc. dr. Klemen Šivic. *Zapiski predavanj iz Algebre 1*. 2020.