

ESERCIZI VAR. ALE. ASSOLUTAMENTE CONTINUE

Eseecizio 3) Il voto ad un esame è un numero in $[0,10]$.

L'esame si passa con 6. Il voto di Mario è una v.a. a.c. di densità:

$$f(x) = c \cdot \begin{cases} \frac{4}{10}x & \text{PER } 0 \leq x \leq 5 \\ 4 - \frac{4}{10}x & \text{PER } 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- calcolare c.
- qual è la probabilità che Mario passi l'esame?
- Sappiamo che Mario otterrà almeno il voto x con una probabilità del 80%? Calcolare x.

1) CALCOLARE c: PER CALCOLARE LA COSTANTE c NORMALIZZIAMO LA FUNZIONE DI DENSITÀ $f(x)$, IMPONENDO CHE L'INTEGRALE SIA UGUALE AD 1 (EVENTO CERTO):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

NEL MIO CASO LA FUNZIONE DI DENSITÀ È DEFINITA IN $[0,10]$, QUINDI:

$$\int_0^{10} f(x) \cdot dx = 1$$

E POICHÉ $f(x) = c \cdot g(x)$, DOBBIAMO CALCOLARE:

$$\int_0^{10} c \cdot g(x) \cdot dx = 1 \Rightarrow c \cdot \int_0^{10} g(x) \cdot dx = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{\int_0^{10} g(x) \cdot dx}$$

DIVIDIAMO L'INTEGRALE IN DUE INTERVALLI:

$$\int_0^{10} g(x) \cdot dx = \int_0^5 \frac{4}{10}x \cdot dx + \int_5^{10} \left(4 - \frac{4}{10}x\right) \cdot dx$$

RISOLVIAMO IL PRIMO:

$$\int_0^5 \frac{4}{10}x \cdot dx = \frac{4}{10} \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^5 = \frac{4}{10} \cdot \frac{25}{2} = 5$$

RISOLVIAMO IL SECONDO:

$$\begin{aligned} \int_5^{10} \left(4 - \frac{4}{10}x\right) \cdot dx &= \int_5^{10} 4 \cdot dx - \int_5^{10} \frac{4}{10}x \cdot dx = 4 \cdot (10 - 5) - \frac{4}{10} \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_5^{10} \\ &= 20 - \frac{4}{10} \cdot \left(\frac{100 - 25}{2}\right) = 20 - 15 = 5 \end{aligned}$$


QUINDI CALCOLIAMO: $\int_0^{10} g(x) \cdot dx = 5 + 5 = 10$

POSSIAMO CALCOLARE C:

$$C = \frac{1}{\int_0^{10} g(x) \cdot dx} = \frac{1}{10}$$

COMPLETIAMO ALLORA $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{10} \cdot g(x) = \begin{cases} \frac{4}{100}x & \text{PER } 0 \leq x \leq 5 \\ \left(4 - \frac{4}{10}x\right) \frac{1}{10} & \text{PER } 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$



MEDIANA: $f(5) = \frac{4}{100} \cdot 5 = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$, $Q(\frac{1}{2}) = 5$

2) "PROB. CHE MARIO PASSI L'ESAME" = $P(X \geq 6)$

1° METODO: $P(X \geq 6) = 1 - F(6) = 1 - \int_{-\infty}^6 f(y) \cdot dy \stackrel{*1}{=} 1 - \int_0^6 f(y) \cdot dy \dots$

2° METODO: $P(X \geq 6) = \int_6^{+\infty} f(y) \cdot dy \stackrel{*2}{=} \int_6^{10} f(x) \cdot dx = \int_6^{10} \left(4 - \frac{4}{10}x\right) \frac{1}{10} \cdot dx$

PERCHÉ TRA $x \in (-\infty, 0)$ ^{*1}

LA FUNZIONE f FA 0.

$$= \int_0^{10} \left(\frac{4}{10} - \frac{4}{100}x\right) \cdot dx = \int_0^{10} \frac{4}{10} \cdot dx - \int_0^{10} \frac{4}{100}x \cdot dx$$

PERCHÉ TRA $x \in (10, +\infty)$ ^{*2}

LA FUNZIONE f FA 0.

$$= \frac{4}{10} (10 - 6) - \frac{4}{100} \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_6^{10} = \frac{8}{5} - \frac{4}{100} \left(\frac{100 - 36}{2}\right) = \dots$$

3) "SAPPIAMO CHE MARIO OTTERRÀ ALMENO VOTO x CON UNA PROBABILITÀ DEL 80%. CALCOLARE x ."

CHE SIGNIFICA:

$$0.80 = P(X \geq x)$$

CHE RISCITTA:

$$0.80 = 1 - P(X \leq x) \Rightarrow P(X \leq x) = 1 - 0.80 = 0.20$$

QUINDI:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx \stackrel{*1}{=} \int_0^x f(x) \cdot dx = 0.20$$

POICHÉ 0.20 È MINORE DI 0.5, POSSIAMO LIMITARCI ALLA PRIMA PARTE DELLA FUNZIONE:

ABBIAMO:

$$f(x) = \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{10} \cdot x = \frac{4}{100}x \quad \text{OATO } x \in [0, 5]$$


QUINDI:

$$\int_0^x \frac{4}{100}t \cdot dt = \frac{4}{100} \cdot \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^x = \frac{4}{100} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{1}{50} \cdot x^2$$

POSIAMO $f(x) = 0.20$:

$$\frac{1}{50} \cdot x^2 = 0.20 \quad x^2 = 0.20 \cdot 50 = 10$$

$$x = \sqrt{10} \approx 3.16$$



Esercizio 2) Sia X una v.a. a.c. con distribuzione:

$$F(x) = \begin{cases} 1 & \text{PER } 1 \leq x \\ 2x^2 - x^4 & \text{PER } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{PER } x \leq 0 \end{cases}$$


- calcolare $P(1/4 \leq X \leq 3/4)$,
- calcolare la densità di probabilità di X .

SUPPORTO: $X \in S_X = [0, 1]$

1) CALCOLARE:

$$P(\alpha \leq x \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}\right) &= F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right) \\ &= 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 - 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \dots \end{aligned}$$



2) CALCOLARE LA DENSITÀ DI PROBABILITÀ $f(x)$:

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0 & x \notin [0, 1] \\ 4x - 4x^3 & x \in [0, 1] \end{cases}$$

$$\bullet D(1) = 0$$

$$\bullet D(0) = 0$$

$$\bullet D(2x^2 - x^4) = 4x - 4x^3$$

Esercizio 1) Sia X una v.a. a.c. con densità di probabilità:

$$f(x) = \begin{cases} cx + 3 & \text{PER } -3 \leq x \leq -2 \\ 3 - cx & \text{PER } 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- calcolare c ,
- calcolare la funzione di distribuzione di X .