



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

**О Т Ч Е Т**

по домашнему заданию № 1

**Название:** Метод резолюций в логике предикатов первого порядка

**Дисциплина:** Математическая логика и теория алгоритмов

Студент

ИУ6-72Б

(Группа)

(Подпись, дата)

С.В. Астахов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

В.В. Гуренко

(И.О. Фамилия)

Москва, 2022

**Предметная область:** автомобильные гонки RDS GP

**Утверждения:**

1. Для любого пилота верно утверждение: если он принадлежит к элитной команде или не новичок, то он хорошо подготовлен.
2. Для любого автомобиля верно: если он японский или его пилот (у каждого автомобиля есть пилот) принадлежит к элитной команде, то он мощный.
3. Существует (хотя бы один) такой пилот, что, если пилот не имеет большого опыта или не состоит в элитной команде, то он не будет допущен до гонки.
4. Существует (хотя бы один) такой автомобиль японского производства, что все его пилоты (могут быть запасные пилоты) допущены до гонки.
5. Для любого пилота верно: если пилот допущен до гонки и {хорошо подготовлен или его автомобиль — мощный}, то пилот займет призовое место.

**Факты:**

1. Автомобиль Nissan Skyline — японского производства
2. Автомобиль Nissan Silvia — японского производства
3. Автомобиль Dodge Viper — не японского производства
4. Автомобиль Dodge Challenger — не японского производства
5. Пилот Георгий Чевчян — не новичок
6. Пилот Аркадий Цареградцев — не новичок
7. Пилот Леонид Шнайдер — новичок
8. Пилот Валерия Кама — новичок
9. Пилот Георгий Чевчян допущен до гонки
10. Пилот Аркадий Цареградцев допущен до гонки
11. Пилот Леонид Шнайдер допущен до гонки
12. Пилот Валерия Кама допущена до гонки
13. Пилот Георгий Чевчян не принадлежит к элитной команде
14. Пилот Аркадий Цареградцев не принадлежит к элитной команде

15. Пилот Леонид Шнайдер принадлежит к элитной команде
16. Пилот Валерия Кама принадлежит к элитной команде
17. Леонид Шнайдер — водитель Nissan Skyline
18. Валерия Кама — водитель Nissan Silvia
19. Георгий Чевчян — водитель Dodge Viper
20. Аркадий Цареградцев — водитель Dodge Challenger

**Заключение:**

Существует ли такой пилот, который занял призовое место и чей автомобиль (у любого пилота есть автомобиль) мощный?

**Предикаты:**

$T(x)$  — «пилот  $x$  принадлежит к элитной команде»

$O(x)$  — «пилот  $x$  — новичок»

$N(x)$  — «пилот  $x$  хорошо подготовлен»

$P(y)$  — « $y$  — мощный автомобиль»

$J(y)$  — «автомобиль  $y$  — японского производства»

$D(x, y)$  — « $x$  — водитель  $y$ »

$S(x)$  — «пилот  $x$  прошел медосмотр»

$Q(y)$  — «автомобиль  $y$  прошел техосмотр»

$L(x)$  — «пилот  $x$  допущен до гонки»

$M(x)$  — «пилот  $x$  занял призовое место»

**Области определения предикатов:**

$Cars = \{nissan\_skyline, nissan\_silvia, dodge\_viper, dodge\_challenger\}$

$Pilots = \{георгий\_чевчян, аркадий\_цареградцев, леонид\_шнайдер, валерия\_кама\}$

$x \in Cars$

$y \in Pilots$

**Формализация типовых фраз:**

«Для любого  $x$  верно ...» —  $\forall x(\dots)$

«Существует (хотя бы один)  $x$ , такой, что...» —  $\exists x(\dots)$

«Если  $A$ , то  $B$ » —  $(A \rightarrow B)$

« $A(x)$  верно для пилота  $x$  автомобиля  $y$ » = « $A(x)$  И ( $x$  — пилот  $y$ )» —  $[A(x) \wedge D(x, y)]$

### Формализация утверждений:

1.  $\forall x < [T(x) \vee \neg O(x)] \rightarrow N(x) >$
2.  $\forall y < [J(y) \vee \exists x \{D(x, y) \wedge T(x)\}] \rightarrow P(y) >$
3.  $\exists x < [\neg T(x) \vee O(x)] \rightarrow \neg L(x) >$
4.  $\exists y \forall x < J(y) \wedge D(x, y) \wedge L(x) >$
5.  $\forall x < [L(x) \wedge \{N(x) \vee \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \rightarrow M(x) >$

### Формализация фактов:

1.  $J(\text{nissan\_skyline})$
2.  $J(\text{nissan\_silvia})$
3.  $\neg J(\text{dodge\_viper})$
4.  $\neg J(\text{dodge\_challenger})$
5.  $\neg O(\text{георгий\_чевчян})$
6.  $\neg O(\text{аркадий\_цареградцев})$
7.  $O(\text{леонид\_шнайдер})$
8.  $O(\text{валерия\_кама})$
9.  $L(\text{георгий\_чевчян})$
10.  $L(\text{аркадий\_цареградцев})$
11.  $L(\text{леонид\_шнайдер})$
12.  $L(\text{валерия\_кама})$
13.  $\neg T(\text{георгий\_чевчян})$
14.  $\neg T(\text{аркадий\_цареградцев})$
15.  $T(\text{леонид\_шнайдер})$

16.  $T(\text{валерия\_кама})$
17.  $D(\text{леонид\_шнайдер}, \text{nissan\_skyline})$
18.  $D(\text{валерия\_кама}, \text{nissan\_silvia})$
19.  $D(\text{георгий\_чевчян}, \text{dodge\_viper})$
20.  $D(\text{аркадий\_цареградцев}, \text{dodge\_challenger})$

### Формализация заключения:

$$G = \exists x \exists y < M(x) \wedge J(y) \wedge D(x, y) >$$

$$\neg G = \neg \exists x \exists y < M(x) \wedge J(y) \wedge D(x, y) >$$

### Преобразуем формулу (1):

#### 1 Приведение к ПНФ

##### 1.1 Исклучение импликаций

$$\forall x < [T(x) \vee \neg O(x)] \rightarrow N(x) >$$

$$\forall x < \neg[T(x) \vee \neg O(x)] \vee N(x) >$$

##### 1.2 Переименование связанных переменных — не требуется

##### 1.3 Разделение связанных переменных — не требуется

##### 1.4 Удаление кванторов, связывающих несуществующие переменные — не требуется

##### 1.5 Протаскивание отрицаний

$$\forall x < \neg[T(x) \vee \neg O(x)] \vee N(x) >$$

$$\forall x < [\neg T(x) \wedge O(x)] \vee N(x) > \text{ — прикладная ПНФ и СНФ}$$

##### 1.6 Смещение кванторов влево — не требуется

#### 2 Сколемизация — не требуется (в формуле нет кванторов существования)

#### 3 Приведение к клаузуальной форме

$$\forall x < [\neg T(x) \wedge O(x)] \vee N(x) >$$

$$\forall x < [\neg T(x) \vee N(x)] \wedge [O(x) \vee N(x)] > \text{ — клаузуальная форма}$$

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$$\neg T(x) \vee N(x)$$

$$O(x) \vee N(x)$$

## Преобразуем формулу (2):

### 1 Приведение к ПНФ

#### 1.1 Исклучение импликаций

$$\forall y < [J(y) \vee \exists x\{D(x, y) \wedge T(x)\}] \rightarrow P(y) >$$

$$\forall y < \neg [J(y) \vee \exists x\{D(x, y) \wedge T(x)\}] \vee P(y) >$$

#### 1.2 Переименование связанных переменных — не требуется

#### 1.3 Разделение связанных переменных — не требуется

#### 1.4 Удаление кванторов, связывающих несуществующие переменные — не требуется

#### 1.5 Протаскивание отрицаний

$$\forall y < \neg [J(y) \vee \exists x\{D(x, y) \wedge T(x)\}] \vee P(y) >$$

$$\forall y < [\neg J(y) \wedge \neg \exists x\{D(x, y) \wedge T(x)\}] \vee P(y) >$$

$$\forall y < [\neg J(y) \wedge \forall x \neg \{D(x, y) \wedge T(x)\}] \vee P(y) >$$

$$\forall y < [\neg J(y) \wedge \forall x \{ \neg D(x, y) \vee \neg T(x) \}] \vee P(y) >$$

#### 1.6 Смещение кванторов влево — так как левее квантора $\forall x$ нет вхождений $x$ , протаскиваем этот квантор влево

$$\forall y \forall x < [\neg J(y) \wedge \{ \neg D(x, y) \vee \neg T(x) \}] \vee P(y) > \text{ — прикладная ПНФ и}$$

СНФ

### 2 Сколемизация — не требуется (в формуле нет кванторов существования)

### 3 Приведение к клаузуальной форме

$$\forall y \forall x < [\neg J(y) \wedge \{ \neg D(x, y) \vee \neg T(x) \}] \vee P(y) >$$

$$\forall y \forall x < [\neg J(y) \vee P(y)] \wedge [\neg D(x, y) \vee \neg T(x) \vee P(y)] > \text{ — клаузуальная}$$

форма

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$$\neg J(y) \vee P(y)$$

$$\neg D(x, y) \vee \neg T(x) \vee P(y)$$

### Преобразуем формулу (3):

#### 1 Приведение к ПНФ

##### 1.1 Исключение импликаций

$$\exists x < [O(x) \vee \neg T(x)] \rightarrow \neg L(x) >$$

$$\exists x < \neg [O(x) \vee \neg T(x)] \vee \neg L(x) >$$

##### 1.2 Переименование связанных переменных — не требуется

##### 1.3 Разделение связанных переменных — не требуется

##### 1.4 Удаление кванторов, связывающих несуществующие переменные — не требуется

##### 1.5 Протаскивание отрицаний

$$\exists x < \neg [O(x) \vee \neg T(x)] \vee \neg L(x) >$$

$$\exists x < [\neg O(x) \wedge T(x)] \vee \neg L(x) > \text{ — прикладная ПНФ}$$

##### 1.6 Смещение кванторов влево — не требуется

#### 2 Сколемизация (по первому правилу Сколема $\{a // x\}$ )

$$\exists x < [\neg O(x) \wedge T(x)] \vee \neg L(x) >$$

$$< [\neg O(a) \wedge T(a)] \vee \neg L(a) > \text{ — СНФ}$$

#### 3 Приведение к клаузуальной форме

$$< [\neg O(a) \wedge T(a)] \vee \neg L(a) >$$

$$< [\neg O(a) \vee \neg L(a)] \wedge [T(a) \vee \neg L(a)] > \text{ — клаузуальная форма}$$

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$$\neg O(a) \vee \neg L(a)$$

$$T(a) \vee \neg L(a)$$

### Преобразуем формулу (4):

1 Приведение к ПНФ — не требуется (нет импликаций, кванторы вынесены)

2 Сколемизация (по первому правилу Сколема  $\{b // y\}$ )

$\exists y \forall x < J(y) \wedge D(x, y) \wedge L(x) > —$  прикладная ПНФ

$\forall x < J(b) \wedge D(x, b) \wedge L(x) > —$  СНФ и клаузная форма

3 Приведение к клаузной форме — не требуется (матрица формулы в КНФ)

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$J(b)$

$D(x, b)$

$L(x)$

**Преобразуем формулу (5):**

1 Приведение к ПНФ

1.1 Исключение импликаций

$\forall x < [L(x) \wedge \{N(x) \vee \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \rightarrow M(x) >$

$\forall x < \neg [L(x) \wedge \{N(x) \vee \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \vee M(x) >$

1.2 Переименование связанных переменных — не требуется

1.3 Разделение связанных переменных — не требуется

1.4 Удаление кванторов, связывающих несуществующие переменные — не требуется

1.5 Протаскивание отрицаний

$\forall x < \neg [L(x) \wedge \{N(x) \vee \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \vee M(x) >$

$\forall x < [\neg L(x) \vee \neg \{N(x) \vee \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \vee M(x) >$

$\forall x < [\neg L(x) \vee \{\neg N(x) \wedge \neg \exists y (P(y) \wedge D(x, y))\}] \vee M(x) >$

$\forall x < [\neg L(x) \vee \{\neg N(x) \wedge \forall y \neg (P(y) \wedge D(x, y))\}] \vee M(x) >$

$\forall x < [\neg L(x) \vee \{\neg N(x) \wedge \forall y (\neg P(y) \vee \neg D(x, y))\}] \vee M(x) >$

1.6 Смещение кванторов влево — так как левее квантора  $\forall y$  нет вхождений  $y$ , протаскиваем этот квантор влево



$$\forall x \forall y < [\neg L(x) \vee \{\neg N(x) \wedge (\neg P(y) \vee \neg D(x, y))\}] \vee M(x) > —$$

прикладная ПНФ и СНФ

2 Сколемизация — не требуется (в формуле нет кванторов существования)

3 Приведение к клаузуальной форме

$$\forall x \forall y < [\neg L(x) \vee \{\neg N(x) \wedge (\neg P(y) \vee \neg D(x, y))\}] \vee M(x) >$$

$$\forall x \forall y < [M(x) \vee \neg N(x) \vee \neg L(x)] \wedge$$

$$\wedge [M(x) \vee \neg P(y) \vee \neg D(x, y) \vee \neg L(x)] > — \text{клауз. форма}$$

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$$M(x) \vee \neg N(x) \vee \neg L(x)$$

$$M(x) \vee \neg P(y) \vee \neg D(x, y) \vee \neg L(x)$$

**Преобразуем заключение (в виде  $\neg G$ ):**

1 Приведение к ПНФ

1.1 Исключение импликаций — не требуется

1.2 Переименование связанных переменных — не требуется

1.3 Разделение связанных переменных — не требуется

1.4 Удаление кванторов, связывающих несуществующие переменные — не требуется

1.5 Протаскивание отрицаний

$$\neg \exists x \exists y < M(x) \wedge J(y) \wedge D(x, y) >$$

$$\forall x \forall y < \neg M(x) \vee \neg J(y) \vee \neg D(x, y) > — \text{прикладная ПНФ, СНФ и клаузуальная форма}$$

1.6 Смещение кванторов влево — не требуется

2 Сколемизация — не требуется

3 Приведение к клаузуальной форме — не требуется (матрица формулы в КНФ)

После элиминации кванторов всеобщности и конъюнкций получим дизъюнкты:

$$\neg M(x) \vee \neg J(y) \vee \neg D(x, y)$$

**Применение метода резолюций:**

1.  $\neg T(x) \vee N(x)$
2.  $O(x) \vee N(x)$
3.  $\neg J(y) \vee P(y)$
4.  $\neg D(x, y) \vee \neg T(x) \vee P(y)$
5.  $\neg O(a) \vee \neg L(a)$
6.  $T(a) \vee \neg L(a)$
7.  $J(b)$
8.  $D(x, b)$
9.  $L(x)$
10.  $M(x) \vee \neg N(x) \vee \neg L(x)$
11.  $M(x) \vee \neg P(y) \vee \neg D(x, y) \vee \neg L(x)$
- 12.  $\neg M(x) \vee \neg J(y) \vee \neg D(x, y)$**
13.  $J(\text{nissan\_skyline})$
14.  $J(\text{nissan\_silvia})$
15.  $\neg J(\text{dodge\_viper})$
16.  $\neg J(\text{dodge\_challenger})$
17.  $\neg O(\text{георгий\_чевчян})$
18.  $\neg O(\text{аркадий\_цареградцев})$
19.  $O(\text{леонид\_шнайдер})$
20.  $O(\text{валерия\_кама})$
21.  $L(\text{георгий\_чевчян})$
22.  $L(\text{аркадий\_цареградцев})$
23.  $L(\text{леонид\_шнайдер})$
24.  $L(\text{валерия\_кама})$
25.  $\neg T(\text{георгий\_чевчян})$

26.  $\neg T(\text{аркадий\_цареградцев})$
  27.  $T(\text{леонид\_шнайдер})$
  28.  $T(\text{валерия\_кама})$
  29.  $D(\text{леонид\_шнайдер}, \text{nissan\_skyline})$
  30.  $D(\text{валерия\_кама}, \text{nissan\_silvia})$
  31.  $D(\text{георгий\_чевчян}, \text{dodge\_viper})$
  32.  $D(\text{аркадий\_цареградцев}, \text{dodge\_challenger})$
- 
33.  $\neg J(y) \vee \neg P(y) \vee \neg D(x, y) \vee \neg L(x) \quad (11, 12)$
  34.  $\neg T(x) \vee \neg J(y) \vee \neg D(x, y) \vee \neg L(x) \quad (4, 33)$
  35.  $\lambda 1 = \{a // x\}$   
 $(34)\lambda 1 = \neg T(a) \vee \neg J(y) \vee \neg D(a, y) \vee \neg L(a)$   
 $\neg J(y) \vee \neg D(a, y) \vee \neg L(a) \quad (6, 34)\lambda 1$
  36.  $\lambda 2 = \{b // y\}$   
 $(35)\lambda 2 = \neg J(b) \vee \neg D(a, b) \vee \neg L(a)$   
 $\neg D(a, b) \vee \neg L(a) \quad (7, 35)\lambda 2$
  37.  $(9)\lambda 1 = L(a)$   
 $\neg D(a, b) \quad (9, 36)\lambda 1$
  38.  $(8)\lambda 1 = D(a, b)$   
 $\square (8, 37)\lambda 1$

Достигнут пустой дизъюнкт, следовательно, теорема доказана — заключение следует из исходных утверждений и фактов. То есть, существует такой пилот, который занял призовое место и чей автомобиль — мощный.

Унификатор  $\lambda 1 = \{a // x\}$  вводится в формулы 8, 9, 34. Значит  $L(a)$  и  $T(a)$  должны быть истинны. Это условие выполняется, если  $a \in \{\text{леонид\_шнайдер}, \text{валерия\_кама}\}$ .

Унификатор  $\lambda 2 = \{b // y\}$  вводится в формулу 35. Значит  $J(b)$  должно быть истинно. Это условие выполняется, если  $b \in \{\text{nissan\_skyline}, \text{nissan\_silvia}\}$ .

Из семантики очевидно, что истинно должно быть  $D(a, b)$ . Тогда, призовые места заняли Леонид Шнайдер на Nissan Skyline и Валерия Кама на Nissan Silvia.

**Ответ:** призовые места заняли Леонид Шнайдер на Nissan Skyline и Валерия Кама на Nissan Silvia.