

MOLLUSCAE CONTAGIOASE este adesea o boală benignă a pielii sau mucoaselor. Micile umflături sunt de obicei rotunde cu o vagă adâncitură în centru. Este o boală comună atât la copii cât și la adulți. Contactul sexual nu este singura modalitate de răspândire. Apare de obicei în zona stomacului, zona genitală, axile și alte zone de contact. Umflăturile pot apărea individual sau grupate.

INFECȚIILE FUNGICE :

CANDIDOZELE GENITALE, afectează cu precădere vulva, vaginul și vârful penisului. În 2/3 din cazuri acestea sunt de natură internă, iar problema este de fapt o floră vaginală în suferință.

În 1/3 dintre cazuri infecția este cauzată de contactul sexual sau de contactul cu obiecte contaminate. Simptomele includ pruritul vaginal sau inflamația, durerile sau disconfortul la urinare, menstrule anormale de abundente, roșeață și fisuri la nivelul mucoasei vaginale. Pielea este acoperită de straturi albicioase sau/și se decojește.

La bărbați infecția este rară și are forme ușoare. Ea se manifestă prin prurit în zona vârfului penisului și a testiculelor, care sunt acoperite de pustule mici roșiatice.

Se tratează cu antibiotice vaginale și orale administrate ambilor parteneri.

Factori suplimentari de risc igiena necorespunzătoare, abuzul de produse de curățare acide, contactele sexual frecvente, diabetul.

DACĂ NU SUNT TRATATE, BOLILE TRANSMISE PE CALE SEXUALĂ POT DUCE LA COMPLICAȚII SEVERE:

- infertilitate
- transferul bolii de la mamă la copil
- risc crescut de cancer cervical

PREZERVATIVUL

NU EXISTĂ GRUPE DE RISC !

EXISTĂ DOAR COMPORTAMENTE RISCANTE!

CUM SĂ TE PROTEJEZI?

*Singura protecție 100 % sigură este abținerea!
Este important să-ți cunoști bine partenerul înainte
de orice contact sexual!
Folosește întotdeauna prezervativul!*

MĂSURI SPECIALE DE PROTECȚIE :

*Evită orice comportament riscant!
Folosește prezervativul!
Folosește numai articolele tale de igienă!
Testează sângele, derivații de sânge, lichidul seminal,
organele sau țesuturile provenite din donații!*

**PROTECȚIA ÎMPOTRIVA
COMPORTAMENTELOR RISCANTE ȘI
ADOPTAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ
SĂNĂTOS A SIGURĂ UN
VIITOR LUMINOS!**

Lider de proiect:



Parteneri:



Cod e-MS: RORS-314

Editor: Colegiul Național Mircea Eliade – Reșița

Data publicării: Ianuarie 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

Pentru eventuale sesizări contactați:

www.romania-serbia@mdrap.ro

Interreg - IPA CBC
România - Serbia



PROIECT
"SUSȚINEREA NEVOILOR DE DEZVOLTARE
COMPORTAMENTALĂ ȘI PREVENTIVĂ A
TINERILOR
"CREATIVITATE FĂRĂ FRONTIERE"

BOLICU TRANSMITERE
PE CALE SEXUALĂ
(BTS)



Cooperare dincolo de frontiere!

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) și cofinanțat de statele partenere în program.

www.romania-serbia.net

INFECȚIILE CAUZATE DE BACTERII ȘI PARAZIȚI:

SIFILISUL poate fi foarte periculos dacă nu e tratat în fazele incipiente. Cauza este o bacterie numită Treponema pallidum. Este foarte contagioasă și se transmite (95%) prin contact sexual, sânge sau răni deschise.

Primele simptome apar după 3 săptămâni de la contactul sexual neprotejat sub forma unor ulceratii nedureroase la nivelul organelor genital sau uneori în cavitatea bucală.

Boala se dezvoltă în 2-3 luni de la expunere, poate dura 2-3 ani sau mai mult și se manifestă prin erupții roșiatice sau ulceratii cutanate care apar și dispar periodic.

Inflamația pe termen lung poate duce la afectarea permanentă a sistemului nervos central, a creierului, inimii sau altor organe vitale.

Este vital ca boala să fie tratată cât de repede posibil.

Tratamentul se realizează cu antibiotice.

GONOREEA (blenoragia) este cea mai comună dintre bolile cu transmitere sexuală. Cauza este bacteria numită Neisseria gonorrhoeae. Se transmite prin: contact sexual neprotejat, obiecte de toaletă utilizate la comun, precum veceuri, prosoape, lenjerie intimă...

Simptome: la bărbați acestea include inflamații ale uretrei, usturime la urinare, secreții uretrale purulente de culoare albă sau gălbui-verzuie. Femeile au simptome mai ușoare (usturime la urinat, secreții vaginale galben-verzui și dureri la contactul sexual).

Ambii parteneri se vor trata cu antibiotice.

INFECȚII CAUZATE DE CHLAMIDIA ȘI MYCOPLASMA

Apar ca secreții vaginale cauzate de uterul infectat. Nu există alte simptome caracteristice, fapt deosebit de periculos, deoarece, netratate, aceste infecții pot cauza infertilitatea la femei. Au fost semnalate cazuri de sângerări neobișnuite, fie între menstruu sau după contactul sexual, sau usturime la urinare.

Simptomele la bărbați include secreții muco-purulente, usturime sau durere la urinare. Fătul poate fi infectat la naștere.

Nou-născuții pot manifesta inflamare conjunctivală și pneumonie, ambele cu efecte fatale.

Este foarte important să fie tratați ambii parteneri în timp util pentru a evita alte consecințe grave sau chiar sterilitatea.

Se tratează cu antibiotice.

INFECȚIA CU TRICOMONAS, este cauzată de un parazit, trichomona vaginalis și este foarte comună la femei.

Se transmite prin contact sexual neprotejat, prosoape sau costume de baie folosite în comun, capace de WC sau altele asemenea

Simptome: mâncărime sau usturime în zona genitală, secreții cu aspect de spumă galben-verzuie cu miros neplăcut, dureri sau usturime la urinare și contact sexual.

Tratamentul se aplică ambilor parteneri care nu vor avea raporturi sexuale pe durata acestuia.

PEDICULOZA este cauzată de păduchele pubian, cu cap de crab. Acesta este o insectă, de cca. 2 mm, care se prinde la baza părului pubian și se hrănește cu sânge, înmulțindu-se rapid în cele 3-4 săptămâni de viață.

Se transmite prin contact sexual sau fizic, și folosirea la comun a prosoapelor sau hainelor.

Simptomele includ mâncărime intensă în zona genitală și uneori pete de sânge pe lenjeria intimă.

Se tratează cu creme, loțiuni și șampoane insecticide, iar hainele și lenjeria de pat sau prosoapele vor trebui dezinfectate.

INFECȚII CAUZATE DE VIRUSURI:

HIV/ SIDA – virusul imunodeficienței umane

HEPATITA B ȘI C – sunt boli care cauzează inflamații degenerative la nivelul ficatului, indiferent de cauză. Alcoolul și narcoticele sunt cauze toxicologice care favorizează hepatita.

Sursele principale de infectare sunt saliva precum și utilizarea acelor și ace pentru droguri intravenoase cu persoane infectate cu virusul de tip B.

Infecția poate fi transmisă și prin contact sexual (heterosexual sau homosexual). Persoana care este sursa virusului nu trebuie să fie neapărat infectată, ci doar purtător cronic. Azi infecția se transmite mai rar prin transfuzii de sânge sau derivați ai sângelui, sau prin dializă, prin înțepare accidentală în timpul unei intervenții chirurgicale sau prin transfer direct de la mamă la făt pe perioada gravidității. Comportamentele riscante contribuie însă la răspândirea bolii.

Simptome: oboseală, vomă, pierdere în greutate, dureri de cap, piele de culoare galbenă, colorarea în galben a albului ochilor.

NU există tratament pentru aceste tipuri de hepatită. Simptomele pot fi tratate doar. Există un vaccin contra Hepatitei B care se recomandă persoanelor din grupele de risc.

Dacă nu este tratată boala evoluează spre ciroză hepatică sau carcinom hepatocelular.

NEGII GENITALI - PAPILOMA, virusul uman Papilloma produce negi, adică infecții benigne ale pielii, mucoaselor genitale sau zonei anale. Negii sunt excrescențe ale pielii, nedureroase, roșiatice sau de culoarea pielii.

Acestea pot apărea individual sau generalizat. Pruritul este prezent, de asemenea. Uneori prezența lor poate deveni un obstacol în uretră sau anus, astfel cauzând suferințe maligne.

Tratamentul este complicat. Acestea pot fi îndepărtate prin intervenție chirurgicală sau medicație, dar nu vor fi tratate definitiv. Virusul rămâne în corp și poate să re-apară.

HERPESUL GENITAL – este cauzat de virusul Herpes simplex.

Se transmite prin contact sexual neprotejat, de la mamă la făt, sau prin contact cu zone infectate.

Pot apărea bășici în gură, pe buze, pe față sau oriunde altundeva, în zone care au fost în contact cu infecția. Zona infectată de obicei mănâncă sau furnică înainte de apariția efectivă a bășicilor. Bășicile apoi devin ulcerate și lasă lichid, urmate de cruste care nu lasă cicatrici. Febra și oboseala cronică se pot instala.

Odată infectată, orice persoană va rămâne cu virusul în corp pentru totdeauna.

Herpesul genital nu se vindecă, dar medicația poate ajuta la controlarea frecvenței manifestărilor viitoare ale virusului.

Evită orice comportament riscant !

Folosește

PREZERVATIVUL