

OBERÖSTERREICHISCHER BRÜNNERLING

WINTERAPFEL



ARCHE NOAH



Stielgrube eng



meist breiter als hoch



Fruchtfleisch: cremeweiß,
breite Kelchröhre,
die nicht ins Kernhaus reicht



färbt am Lager gelb mit einem Stich ins Orange



Die Früchte sind in Originalgröße abgebildet.

OBERÖSTERREICHISCHER BRÜNNERLING

HERKUNFT UND VERBREITUNG

Die abgebildeten Früchte stammen aus der Sortensammlung in Bavendorf/D und von einem alten Baum aus dem Obstgarten von Herrn Josef Dieplinger in Oberberg am Inn. Der lokale Name *Seidenbrünnerling* bezieht sich auf den feineren Geschmack im Vergleich zum *Böhmischen Brünnerling*, der in unmittelbarer Nähe wächst.

Der *Oberösterreichische Brünnerling* wird in der historischen Literatur als eine der Hauptsorten in Oberösterreich und Niederösterreich erwähnt, ist aber heute im Vergleich zum *Böhmischen Brünnerling* sehr selten (siehe Sortenblatt *Böhmischer B.*). Die Gründe dafür sind unklar. Mögliche Ursachen sind eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit und eine damit verbundene geringere Vitalität. Eine andere sind Verwechslungen in Reisergärten und Baumschulen.

FRUCHT- UND BAUMBESCHREIBUNG

GRÖSSE UND FORM

Mittel bis groß; **meist breiter als hoch**; meist kugelig, selten flachkugelig; verjüngt sich etwas zum Kelch hin; ungleichhälftig; breite Kanten von Kelch- bis Stielbucht; in Größe und Form variabel, aber einheitlicher als *Böhmischer Brünnerling*

SCHALE

Glatt, sehr dick und zäh; matt glänzend; Grundfarbe grüngelb, wird **am Lager gelb mit einem Stich ins Orange**; die Deckfarbe mattrot, braunrot, orange, verwaschen bis flächig, keine Streifen; mit zunehmender Lagerung leuchtend rot; scharf begrenzte Blattschatten; Deckungsgrad bis zu 60 %; Schattenfrüchte ohne Deckfarbe; zur Pflückreife typisch leicht weiß bereift, Lentizellen von einem grau-grünem – in der Deckfarbe gelben – Hof umgeben, Schale wird am Lager geschmeidig; Rost an Seitenflächen selten

KELCH

Groß, geschlossen bis halboffen, Kelchblätter mittellang, spitz, an Basis grün und flaumig, in sich verdreht; Kelchbucht flach und mittelweit, faltig, fein berostet; Kelchbuchtrand feinripig, nie ebenmäßig

STIEL

Kurz bis mittellang; überragt selten die Stielgrube; **Stielgrube eng** und mitteltief, bleibt lange grün, ohne Rost bis gering strahlig und schuppig berostet; Rand der Stielbucht uneben

FRUCHTFLEISCH

Grünlichweiß später **cremeweiß**, feinzellig, saftig, säuerlich süß, schwach aromatisch; wird im Dezember weich und mürbe, nicht mehlig, aufgrund der festen Schale nicht druckempfindlich

KERNHAUS

Mittelgroß, mittelständig, zwiebförmig; Achse etwas geöffnet; Kernhauswände schwach gerissen, bogenförmig; Kelchhöhle trichterförmig, **geht in eine breite Kelchröhre über, die nicht ins Kernhaus reicht**; Kelchröhre ist nicht bei allen Früchten typisch ausgeprägt; Samen (hell)braun, mittellang, 8,5 × 4,5 mm, schlecht ausgebildet

PFLÜCKREIFE

Mitte Oktober

GENUSSREIFE UND HALTBARKEIT

ab Dezember bis Februar, März

BLÜTE, POLLENSPENDER, BEFRUCHTERSORTEN

Blüht **mittel (später als der Böhmische Brünnerling)**, triploid und daher schlechter Pollenspender, Befruchtersorten nicht untersucht

WUCHSEIGENSCHAFTEN

Starker Wuchs, aufrecht bis breitwüchsig

GEEIGNETE BAUMFORM

Halb- oder Hochstamm

KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT

Baum und Laub gesund und vital; etwas schorfanfällig, gering gegen Mehltau; anfällig für Triebkrebs

BODEN- UND KLIMAANSPRÜCHE

Traditionell verbreitete Sorte in den Streuobstregionen nördlich der Alpen (im Grünlandgebieten mit ausreichend Niederschlag und gut wasserversorgten, schweren Böden). Staunasse Böden aufgrund der Krebsanfälligkeit sowie ausgesprochene Frostlagen meiden, ansonsten keine hohen Ansprüche

ERTRAG UND EIGNUNG

Wirtschaftsapfel (Küche, Pressen, Dörren); aufgrund der guten Lagereigenschaften ein brauchbarer Tafelapfel für die Selbstversorgung.

ÄHNLICHE FRÜCHTE

Der *Kleine Brünnerling* ist der einzige diploide Brünnerling und hat daher gut ausgebildete Samen. Die Früchte sind immer kugelig, klein bis mittelgroß, nie groß. *Welschbrunner*, *Böhmischer* und *Oberösterreichischer Brünnerling* sind triploid und haben schlecht entwickelte Samen und meist große Früchte.

Welschbrunner ist flachkugelig, hat eine geschlossene Achse und dunkelbraune Samen. *Böhmischer* und *Oberösterreichischer Brünnerling* sind meist kugelig, haben eine schwach bis weit geöffnete Achse, meist hellere (braune) Samen.

OBERÖSTERREICHISCHER BRÜNNERLING

Der *Oberösterreichische Brünnerling* hat oft eine lange, breite Kelchröhre, meist ein schmal offenes Kernhaus und gerissene Kernfächer. Die Grundfarbe ändert sich im Lager von gelbgrün nach gelborange, das Fruchtfleisch wird cremeweiß. Der *Böhmische* hat keine oder eine kurze Kelchröhre, ein offenes Kernhaus mit stark gerissenen Kernfächern, die Grundfarbe ändert sich im Lager von gelbgrün nach hellgelb, das Fleisch bleibt grünweiß.

Der *Böhmische Brünnerling* blüht einige Tage früher als die vorgenannten Sorten.

Der *Salzburger Rosmarin* (*Malerapfel*²) hat gut ausgebildete Samen; die Kelchgrube ist tiefer und Seitenflächen kantiger als beim *Kleinen Brünnerling*, Haltbarkeit kürzer (bis Feb.).

Bei *Brettacher*^{4,10} ist Kelchgrube tiefer, Stielgrube weiter; die Grundfarbe leuchtend gelb; das Kernhaus unten bündig mit Gefäßbündellinie und Stielansatz; das Aroma sortentypisch.

*Winterzitronenapfel*⁶ hat sehr lange Samen; stark zerrissene Kernhausfächer und auffallende Lentizellen, die von einem grünen oder roten Hof umgeben sind bzw. als Roststerne ins Auge stechen.

Bei *Kronprinz Rudolf*⁸ ist Fruchtfleisch saftiger, süßer und aromatischer.

Die Deckfarbe des *Grünen Fürstenapfels*^{5,7} fehlt oder ist schwach matt orangebraun, verwaschen bis gestreift. Brünnerlinge sind nie gestreift.

Der *Grüne Stettiner*¹ bleibt länger grün, hat weniger Deckfarbe als ein Brünnerling und eine dünne Kelchröhre bis ins Kernhaus.

Der *Amstettner Lagerapfel* (*Weberapfel*⁹) hat eine ausgeprägte, strahlenförmige, dunkelbraune Stielgrubenberostung, keine Kelchröhre, das Fruchtfleisch süß bis ausgewogen und mittelstark gewürzt, der Wuchs schwach.

GENGRUPPEN

GenGroup AUT 24 / GenGroup DE MD_0636 / MUNQ 5489³

Literatur

An dieser Stelle werden Referenzen zu den ähnlichen Sorten angeführt. Weitere Literaturangaben siehe Sortenblatt *Böhmischer Brünnerling*, *Kleiner Brünnerling* und *Welschbrunner*.

1. Bernkopf, S. (2011). Grüner Stettiner. In Von Rosen-äpfeln und Landbirnen ein Streifzug durch Oberösterreichs Apfel- und Birnensorten. Trauner. Seite 53.
2. Bernkopf, S. (2021). Salzburger Rosmarien. In 300 Obstsorten. Ein Streifzug durch die oberösterreichische Obstbaumvielfalt (1. Auflage 2021). Trauner Verlag. Seite 137.
3. Broschewitz, L., Bannier, H.-J., Reim, S., Flachowsky, H., & Höfer, M. (2023). Microsatellite/SSR dataset: Pomological and molecular characterization of apple cultivars (*Malus × domestica* Borkh.) of the German Fruit Genebank [Dataset]. OpenAgrar Repository. <https://doi.org/10.5073/20231220-114634-0>
4. Hartmann, W. (2015). Brettacher. In Farbatlas Alte Obstsorten (5. Aufl.). Verlag Eugen Ulmer.
5. Julius Kühn Institut. (o.A.). Grüner Fürstenapfel. Deutsche-Genbank-Obst. Abgerufen am 26.03.2025 unter www.deutsche-genbank-obst.de
6. Kessler, H. (1945). Winterzitronenapfel. In Apfelsorten der Schweiz (Schweizerischer Obstverband, Hrsg.). Verbandsdruckerei AG.
7. o.A. Grüner Fürstenapfel. In Arche Noah (Hrsg.), ARCHE NOAH Obstsortenblätter. Eigenverlag. Abgerufen am 26.03.2025 unter: www.arche-noah.at/sortenbeschreibungen
8. o.A. Kronprinz Rudolf. In Arche Noah (Hrsg.), ARCHE NOAH Obstsortenblätter. Eigenverlag. Abgerufen am 26.03.2025 unter: www.arche-noah.at/sortenbeschreibungen
9. o.A. (1935-1956). Weber-Apfel. In Nach der Arbeit: Illustrierte Wochenzeitung für Garten, Siedlung und Kleintierhaltung. Obsttafel Nr. 330. Steyrermühl-Verl., Molden.
10. Pfeffer, C. (2025). Brettacher. In Pomologen-Verein e.V. (Hrsg.), Sortenportraits Erhalternetzwerk Pomologen-Verein. Abgerufen am 26.03.2025 unter <https://obstsortenerhalt.de/sortenportraits>

Zitiervorschlag:

Kajtna, B., Wegenschimmel, C. & Schmidthaler M. (2025). Oberösterreichischer Brünnerling. In Arche Noah (Hrsg.), ARCHE NOAH Obstsortenblätter. Eigenverlag. Abgerufen am DD.MM.JJJJ unter: www.arche-noah.at/sortenbeschreibungen

Impressum:

Herausgeber: ARCHE NOAH, Obere Straße 40, 3553 Schiltern
Die Sorte wurde beschrieben von Bernd Kajtna, Cornelia Wegenschimmel, Martina Schmidthaler und den Mitgliedern der AG Pomologie.
Fotos: ARCHE NOAH. Satz: Doris Steinböck.