

ПРОИЗВОДНАЯ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ. ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

ПРИМЕР. Вычислить частные производные первого порядка функции $z = x^2 y \sin^2 y \cos x + x y^2 \sin y \cos^2 x$.

Решение этой задачи в том виде, как она сформулирована, приведет, очевидно, к громоздким вычислениям: в каждом слагаемом придется находить производную произведения. Однако можно, заметив определенную симметрию в заданном выражении и обозначив $u = x \sin y$, $v = y \cos x$, значительно упростить вид функции z : $z = u^2 v + u v^2$. Вычислить частные производные функции $z = z(u, v)$ значительно проще, чем функции $z = z(x, y)$. Но для этого необходимо выяснить, как связаны между собой производные функций $z = z(x, y)$ и $z = z(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$.

Функция $z = z(u, v)$, где $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ называется *сложной функцией двух переменных*: она формально зависит от переменных u и v , а фактически – от x и y .

Будем считать, что функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x, y) , а функция $z(u, v)$ – в соответствующей точке (u, v) . Вычислим производную z'_x .

Зададим приращение $\Delta x \neq 0$, тогда функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ получат частные приращения $\Delta_x u$ и $\Delta_x v$. Так как $z(u, v)$ дифференцируема в точке (u, v) , то по определению ее полное приращение имеет вид:

$$\Delta z = z'_u(u, v) \Delta_x u + z'_v(u, v) \Delta_x v + \alpha(\Delta_x u, \Delta_x v) \Delta_x u + \beta(\Delta_x u, \Delta_x v) \Delta_x v,$$

причем
$$\lim_{\Delta_x u, \Delta_x v \rightarrow 0} \alpha(\Delta_x u, \Delta_x v) = \lim_{\Delta_x u, \Delta_x v \rightarrow 0} \beta(\Delta_x u, \Delta_x v) = 0. \quad (6.4)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} &= z'_u(u, v) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + z'_v(u, v) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} + \\ &+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\alpha(\Delta_x u, \Delta_x v) \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \beta(\Delta_x u, \Delta_x v) \frac{\Delta_x v}{\Delta x} \right). \end{aligned}$$

Функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x, y) , поэтому непрерывны. Значит, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta_x u = 0$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta_x v = 0$.

Кроме того, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = u'_x$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} = v'_x$.

Отсюда с учетом (6.4) имеем

$$\begin{aligned} z'_x &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = z'_u u'_x + z'_v v'_x + u'_x \cdot \lim_{\Delta_x u, \Delta_x v \rightarrow 0} \alpha(\Delta_x u, \Delta_x v) + v'_x \cdot \lim_{\Delta_x u, \Delta_x v \rightarrow 0} \beta(\Delta_x u, \Delta_x v) = \\ &= z'_u u'_x + z'_v v'_x. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Аналогично, задавая $\Delta y \neq 0$, получим:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Способ написания этих формул станет наглядным, если составить схему зависимости сложной функции от ее формальных (промежуточных) и фактических переменных (рис. 8):




Рис. 8

Вернемся к примеру в начале этого параграфа.

ПРИМЕР. Найти частные производные первого порядка сложной функции $z = u^2 v + u v^2$, $u = x \sin y$, $v = y \cos x$.

$$z'_u = 2uv + v^2, \quad z'_v = u^2 + 2uv,$$

$$u'_x = \sin y, \quad u'_y = x \cos y, \quad v'_x = -y \sin x, \quad v'_y = \cos x.$$

Отсюда

$$z'_x = (2uv + v^2) \sin y + (u^2 + 2uv)(-y \sin x),$$

$$z'_y = (2uv + v^2) x \cos y + (u^2 + 2uv) \cos x,$$

где $u = x \sin y$, $v = y \cos x$.

Эта идея применима для составления формул вычисления производных сложных функций, зависящих от любого числа как фактических, так формальных переменных.

ПРИМЕР. Составить формулы вычисления производных первого порядка функции $z = z(u, v, w)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y, t)$, $w = w(y, t)$.




Рис. 9

Согласно схеме зависимости (рис. 9) эта функция зависит фактически от трех переменных x, y, t , и формулы вычисления производных имеют вид:

$$z'_x = z'_u u'_x + z'_v v'_x, \quad z'_y = z'_u u'_y + z'_v v'_y + z'_w w'_y, \quad z'_t = z'_v v'_t + z'_w w'_t.$$

Рассмотрим сложную функцию $z = z(x, u, v)$, $u = u(x)$, $v = v(x)$.




Рис. 10

Формально эта функция зависит от трех переменных, а фактически $z = z(x)$ – функция только одной переменной x . Поэтому производная от нее по x – не частная, а обыкновенная производная, которая в таком случае называется *полной производной данной сложной функции*. Вычисляется она по формуле $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx}$ (рис. 10). В этой формуле $\frac{\partial z}{\partial x}$ – частная производная функции, зависящей от трех переменных x, u, v , а $\frac{dz}{dx}$ – полная производная.

Используя формулу вычисления полной производной, можно дифференцировать показательно-степенные функции.

ПРИМЕР. Найти первую производную функции $y = (tg\ 2x)^{\cos 3x}$.

Обозначим $u = tg\ 2x$, $v = \cos 3x$, тогда получим $y = u^v$ – сложная функция двух переменных и $\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dx}$ (рис. 11).




Рис. 11

Поэтому $y' = v u^{v-1} \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} + u^v \ln u \cdot (-3 \sin 3x) = u^v \left(\frac{2v}{u \cos^2 2x} - 3 \sin 3x \cdot \ln u \right),$

где $u = tg\ 2x$, $v = \cos 3x$.

Заметим, что найти производную показательно-степенной функции можно и по-другому – с помощью процедуры логарифмического дифференцирования.

ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ, ЗАДАННОЙ НЕЯВНО

Рассмотрим уравнение $4x^3 + 3xy + y^3 = 0$. Очевидно, есть пары значений x и y , обращающих его в верное числовое равенство, например: $(0, 0)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ и т.д. Однако не всякая пара (x, y) удовлетворяет этому уравнению. Значит, можно утверждать, что этим уравнением задана некоторая функция $y = y(x)$ (или $x = x(y)$), хотя явно вид этой зависимости в данном случае получить довольно сложно.

Функция, определенная из неразрешенного уравнения, связывающего независимые и зависимую переменные, называется *неявной функцией*.

В приведенном примере равенство $4x^3 + 3xy + y^3 = 0$ задает неявную функцию одной переменной. Уравнением $x - 2y + 5 = 0$ также задается неявная