

Teikningar með hringfara einum saman og með reglustiku og einum hring.

Matthías Páll Gissurarson

3. febrúar 2015

Efnisyfirlit

- 1 Inngangur og Táknmál
- 2 Mohr-Mascheroni setningin
- 3 Poncelet-Steiner setningin
- 4 Þrískipting horns og annað ómögulegt
- 5 Heimildir

Teiknanlegir punktar

Skilgreining (Teiknanlegir punktar [18].).

G.r.f. að við höfum gefna punkta A_1, \dots, A_n , $n \geq 2$. Við getum útfrá þeim teiknað fleiri punkta með hringfara og reglustiku; við köllum þá *punkta teiknanlega útfrá punktunum A_1, \dots, A_n* eða til einföldunar *teiknanlega punkta*. Við segjum að mengi teiknanlegra punkta sé *mynd* (e. geometric construction).

Teiknanlegir punktar

Skilgreining (Teiknanlegir punktar, aðgerðir og nafngiftir [18]).

- (I) Að kalla punktana A_1, \dots, A_n *teiknanlega*.
- (II) Að teikna línu gegnum tvo ólíka teiknanlega punkta og köllum hana teiknanlega línu.
- (III) Að teikna hring með miðju í teiknanlegum punkti sem fer í gegnum annan
- (IV) Að bæta við teiknanlegu punktanna skurðpunkti tveggja teiknanlegra lína sem eru ekki samsíða.
- (V) Að bæta við teiknanlegu punktana skurðpunktum teiknanlegrar línu við teiknanlegan hring (ef til eru).
- (VI) Að bæta við teiknanlegu punktana skurðpunktum tveggja teiknanlegra ósammiðja hringja (ef til eru).

Aðgerðir

Athugasemd.

Það sem við köllum “myndina” er í raun mengi punkta. Því er reglulegur þríhyrningur teikning í þeim skilningi að það eru 3 punktar sem allir eru jafn langt frá hvorir öðrum.

Einnig sjáum við að aðeins aðgerðir (IV)-(VI) bæta punktum við myndina, og því má teikna allar teiknanlegar myndir ef hægt er að framkvæma aðgerðir (IV)-(VI).

Við leyfum okkur aðeins endanlega margar aðgerðir, og tökum ekki í mál að “nálgast” punktinn, heldur verður hann að passa alveg.

Teiknanlegur punktur er því punktur sem hægt er að fá út frá teiknanlegum punktum með endanlegum fjölda aðgerða.

Skilgreining (Táknmál).

- Táknnum hring með miðju í teiknanlegum punkti A sem fer í gegnum teiknanlegan punkt B með $\odot(A, B)$
- Táknnum hring með miðju í teiknanlegum punkti A með geisla r með $A|r$.
- Táknnum línu sem liggur í gegnum tvo ólíka teiknanlega punkta A og B með \overline{AB}
- Táknnum strikið milli tveggja ólíkra teiknanlegra punkta A og B með \overline{AB} . Við segjum að $AB = CD$ ef lengd strikana AB og CD er sú sama.

Skilgreining (Táknmál, framhald).

- Látum A og B vera ósamsíða ólíkar línur. Táknnum með $A + B$ skurðpunkt línanna.
- Látum \textcircled{AB} vera hring og $C-D$ vera línu. Táknnum með $\textcircled{AB} + C-D = C-D + \textcircled{AB}$ fyrri skurðpunktinn sem maður rekst á ef maður teiknar hringinn rangsælis með því að byrja í B , en með $\textcircled{AB} * C-D = C-D * \textcircled{AB}$ fyrri skurðpunktinn sem maður rekst á ef maður teiknar hringinn réttsælis með því að byrja í B (ef til eru). Athugum að þegar við byrjum í B , þá teljum við B ekki með fyrr en komið er heilan hring (ef ske skyldi að hann sé einn skurðpunktanna.)

Skilgreining (Táknmál,framhald).

- Látum (AB) , (CD) vera ósammiðja hringi. Táknum með $(AB) + (CD)$ fyrri skurðpunktinn sem maður rekst á ef maður teiknar (AB) rangsælis með því að byrja í B, en með $(AB) * (CD)$ fyrri skurðpunktinn sem maður rekst á ef maður teiknar (AB) réttsælis með því að byrja í B.

Athugasemd.

$(AB) + (CD) = (CD) * (AB)$ og $(CD) + (AB) = (AB) * (CD)$ fyrir alla ósammiðja hringi (AB) , (CD)

Efnisyfirlit

- 1 Inngangur og Táknmál
- 2 Mohr-Mascheroni setningin
- 3 Poncelet-Steiner setningin
- 4 Prískipting horns og annað ómögulegt
- 5 Heimildir

Mohr-Mascheroni setningin

Setning (Mohr-Mascheroni setningin [3]).

Sérhverja mynd sem teikna má með hringfara og reglustiku má teikna með hringfara einum saman. Það er, mengi allra punkta sem eru teiknanlegir með reglustiku og hringfara er það sama og mengi þeirra punkta sem teiknanlegir eru með hringferli einum saman.

Mohr-Mascheroni setningin

Athugum að við getum gert (VI) (fundið skurðpunkta tveggja hringja) beint með hringfara, en við látum línu vera gefna með tveimur punktum. Við þurfum því að sýna að gera megi (IV) (finna skurðpunkt tveggja lína) og (V) (finna skurðpunkta hrings og línu) með hringfara einum saman. Til þessum þurfum við að smíða frá grunni smíðir sem við getum svo notað til að búa til flóknari smíðir, sem við vonumst svo til þess að geta notað til að gera (IV) og (V). Sönnun þessi er fengin frá Norbert Hungerbuhler [15].

Skurðpunktur línu og hrings

Við skulum byrja á því að sanna hvernig finna má skurðpunkt línu og hrings með hringfara einum saman. Við skiptum þessu upp í tvö tilfelli:

- (i) Línan liggur ekki í gegnum miðju hringsins.
- (ii) Línan liggur í gegnum miðju hringsins

Við byrjum á að sanna (i).

Til þess að geta sýnt (i), þurfum við að byrja á að búa til eftirfarandi smíð:

Hringfarasmíð 1 (Speglun punkts um línu [15]).

Látum M vera punkt sem er ekki á línunni og P_1 - P_2 vera línu. Þá getum við speglað M um línuna með því að finna $X = \textcircled{P_1 M} + \textcircled{P_2 M}$ og

$Y = \textcircled{P_1 M} * \textcircled{P_2 M}$ og velja M' þ.a. M' sé sá af punktunum X, Y sem er ekki M . Þá er M' speglun M , þar sem $P_1 M P_2$ og $P_1 M' P_2$ eru jafnarma þríhyrningar.


Ath: Ef $X = Y = M$, þá er M á línunni.

Hringfarasmíð 2 (Jafnarma þríhyrningur [16]).

G.r.f að við höfum gefna tvo punkta A og B . Þá má finna punkt C þ.a. $\{A, B, C\}$ sé jafnarma þríhyrningur (þ.e. $AB = BC = CD$) Látum $C = \textcircled{AB} + \textcircled{BA}$ (eða $C = \textcircled{AB} * \textcircled{BA}$). Þá er A, B og C jafnarma þríhyrningur.

Hringfarasmíð 3 (Færsla lengdar [2]).


Látum punkt A punkt og strik BC vera gefið. Þá getum við fundið $D = \textcircled{AB} + \textcircled{BA}$ og $D' = \textcircled{AB} * \textcircled{BA}$. Við speglum svo punktinum C um línuna $D-D'$ með smíð 1 og köllum E . Athugum að A er speglun B um $D-D'$, en þar sem speglun varðveitir fjarlægðir, þá er $AE = BC$, og því getum teiknað hring með geisla BC með miðju í A með því að teikna hringinn AE . (sjá mynd 1)



Mynd 1 : Færsla lengdar.

Hringfarasmíð 4 (Skurðpunktar hringa við línu ef línan fer ekki í gegnum miðju hringins [15]).

Látum hring (MA) og línu P_1-P_2 vera gefna þ.a. M liggi ekki á línunni. Látum nú M' vera speglun á M um línuna P_1-P_2 . Við teiknum svo hring $M'A'$ sem hring með miðju í M' og geisla MA . Þá er $X = (MA) + (M'A')$ og $Y = (MA) * (M'A')$ skurðpunktar hringins (MA) við línuna. (Sjá mynd 2)




Mynd 2 : Skurðpunktur línu og hring (i)

En við höfum þá fundið skurðpunkt hring og línu ef miða hringins liggur

Hringfarasmíð 5 (Miðpunktur striks [15]).

Látum $K_1 = (AB)$ og $K_2 = (BA)$. Finnum nú $D = (AB) + (BA)$ og $C = (AB) * (BA)$. Látum nú $K_3 = (CD)$. Finnum svo $E = (CD) * (BA)$. Þá er B miðpunktur AE . Látum nú $F = (EA) + (AB)$ og $G = (EA) * (AB)$. Þá er $M = (FA) + (GA)$ miðpunktur striksins AB , þar sem $\triangle FAM \sim \triangle EFA$ eru einslaga þríhyrningar með hlutföll $1 : 2$. (sjá mynd 3)



Mynd 3 : Miðpunktur striks

Hringfarasmíð 6 (Tvöföldun lengdar [16]).


Gefum okkur tvo punkta, A og B. Látum

$$C = \textcircled{AB} * \textcircled{BA}, D = \textcircled{AB} + \textcircled{CB}, E = \textcircled{AB} + \textcircled{DB},$$

$$F = \textcircled{AB} + \textcircled{EB}, G = \textcircled{AB} + \textcircled{FB}$$

Þá mynda punktarnir $\{A, C, D, E, F, G\}$ jafnarma sexhyrning, en sér í lagi er lengd striksins AE tvöföld lengd striksins AB. (sjá mynd 4).

Athugm að með því að tvöfalda lengdina BE, þá getum við fundið punkt H þ.a. AH sé þreföld lengd AB o.s.frv.



Mynd 4 : Jafnarma sexhyrningur

Hringfarasmíð 7 (Skurðpunktar hringa og línu í gegnum miðju hringa [15]).


Látum línu $M-P$ vera gefna Látum $(K) = (MA)$ vera hring með miðju M og punkt A vera á hringnum. Við megum g.r.f að A sé ekki á línunni (annars finnum við annan punkt á hringnum, t.d. með smíð 2). Finnum nú $P = (MA) + P-A$ með smíð 4 (vitum að þar sem A er ekki á línunni, þá er $P-A$ ekki lína í gegnum miðju hringa). Látum nú M_1 vera miðju hringa sem fer í gegnum A og B með geisla sem er meiri en $R = MA$ (getum t.d. þrefaldað lengdina MA með smíð 6, teiknað svo hring með miðju í A og B og fundið skurðpunkt þeirra.) Veljum svo punkt $C = (BM_1) * (M_1A)$ á hringnum (M_1A) , og finnum svo D sem skurðpunkt hringa (M_1A) og hringa með miðju í C og geisla $2R$ (sem við getum fundið með tvöföldun lengdar og svo fært í C).

Hringfarasmíð 7 (Skurðpunktar hringa og línu í gegnum miðju hringins [15]).

Finnum nú $P' = (M_1P) + C-D$ með smíð 4. Látum nú M_3 vera miðpunkt striksins CD sem við finnum með smíð 5. Látum nú E vera punkt á K_3 þ.a. $P'E = PB$ þar sem (K_5) er hringur með miðju í P' og geisla PB . Látum nú (K_6) vera hring með miðju í B og geisla EC og (K_7) vera hring með miðju í B og geisla ED . Látum nú X vera þann skurðpunkt (K_6) og $M-P$ sem liggur á (K) og Y vera þann skurðpunkt (K_7) og $M-P$ sem liggur á (K) Þá eru X og Y skurðpunktar $M-P$ við (K) . (sjá mynd 5)

Þetta fæst út frá því að $PX \cdot PY = PA \cdot PA = P'C \cdot P'D$ skv. reglu Eulers um sniðla sem skerast, en hún segir að ef tveir sniðlar hring skerast fyrir utan hringinn, þá er margfeldi hluta þeirra jöfn, en maður beiti því fyrst á (MA) og svo á (M_3C) .

Því eru punktarnir P, Y, M, X og B og P', D, M_3, C og E einslaga skv. smíð. Því eru X og Y fundir eins og sýnt var.




Mynd 5 : Skurðpunktar hringa og línu í gegnum miðju hans


En þar með höfum við sannað (i) og (ii) og getum því fundið skurðpunkta hrings og línu. Við þurfum því næst að sanna að við getum fundið skurðpunkt tveggja lína.

Hringfarasmíð 8 (Skurðpunktur línu og þverils hennar gegnum gefinn punkt [15]).

Látum P_1-P_2 vera línu Q punkt. Við finnum þá punkt Q' með því að spegla Q um P_1-P_2 með smíð 1. $Q - Q'$ er þá þverill $P_1 - P_2$. Við finnum svo L , miðpunkt striksins $Q-Q'$ með smíð 5, en hann liggur á bæði $Q-Q'$ og P_1-P_2 og er því skurðpunktur þverilsins $Q-Q'$ og P_1-P_2 (sjá mynd 6)



Mynd 6 : Skurðpunktur línu og þverils hennar gegnum gefinn punkt.



Mynd 7 : Skurðpunktur línu og þverils hennar gegnum gefinn punkt á línunni.

Athugum nú hvað gerist þegar við erum með línur sem eru ekki hornréttar hvor á aðra (sjá mynd 8). Það gerum við með því að finna lengdina l frá Q_1 til S , þ.e. lengdina frá einum punkti á strikinu til skurðpunktsins, en það gerum við í smíð 10.


Hringfarasmíð 9 (Skurðpunktur tveggja lína [15]).

Nú getum við búið til hring H með miðju í Q_1 og geisla ℓ þar sem ℓ er fundin með smíð 10, en við færum lengdina frá punktunum L, E yfir í Q_1 með smíð 3, en þá er S skurðpunktur H og Q_1-Q_2 (sem við fáum úr smíð 7). Þá er S skp. Q_1-Q_2 og P_1-P_2 .


Finnur nú lengdina ℓ :

Hringfarasmíð 10 (Lengd frá punkti á striki til skurðpunkts þess við annað strik [15]).

Sjá mynd 8. Við byrjum á að tvöfalda lengdina Q_1L þ.a. $Q_1C = 2Q_1L$ með smíð 6. Látum nú K vera hring sem er nógu stór (getum tvöfaldað gefnu lengdina þangað til að það dugir) sem fer í gegnum Q_1 og C (með því að finna skurðpunkt hringja með geisla sem er nógu stórt lengdin og með miðjur í Q_1 og C) og látum D vera punkt á (K) þ.a. $LD = Q_1N$ (finnum skurðpunkt hringsins með miðju í L og geisla Q_1N). Látum nú E vera skurðpunkt LD og (K) . Þá er lengd LE ℓ . Lengd LE er ℓ , þar sem $(Q_2L)^2 = Q_1L \cdot LC = LD \cdot LE = Q_1N \cdot LE$ skv. reglu Eulers um strengi í hring sem skerast, en hún segir að ef strengir í hring skerast, þá er margfeldi hluta þeirra jöfn. (Sjá mynd 9).



Mynd 8 : Skurðpunktur tveggja lína



Mynd 9 : Regla Eulers um strengi hring sem skerast segir að $A \cdot B = C \cdot D$ [10]

Sönnun á Mohr-Mascheroni setningunni.

Með því að nota smíðir 7, 4, 8 og 9, getum við fundið bæði skurðpunkta hringa og línu og skurðpunkta tveggja lína með hringfara einum saman. Við vitum að við getum fundið skurðpunkta tveggja hringja með hringfara einum saman, og það eru einu aðgerðirnar sem bæta við teiknanlegum punktum. Því er sérhver mynd sem er teiknanleg með hringfara og reglustiku teiknanleg með hringfara einum saman. **Q.E.D**

Efnisyfirlit

- 1 Inngangur og Táknmál
- 2 Mohr-Mascheroni setningin
- 3 Poncelet-Steiner setningin**
- 4 Prískipting horns og annað ómögulegt
- 5 Heimildir

Poncelet-Steiner setningin


Setning (Poncelet-Steiner setningin).

Sérhverja rúmfræðilega mynd sem teikna má með hringfara og reglustiku má teikna með reglustiku einni saman, að því gefnu að einn hringur og miðja hans sé gefin.

Athugið að við þurfum að hafa gefna miðju hringsins. Síðar var sannað að við þurfum ekki hring, heldur dugur okkur bogi með gefinni miðju. Í teikningum með reglustiku telst hringur gefinn ef við vitum miðju hans og geisla.

Svo virðist sem Steiner hafi gefið sér að hann mætti velja punkt af handahófi á þeim línunum sem hann hefur nú þegar teiknað og hringnum.

Athugum að ef allir punktarnir sem við fáum gefnir liggja á línunni, þá getum við ekki bætt við neinum punktum sem liggja ekki á línunni með reglustiku einni saman. Því verðum við annaðhvort að hafa að punktarnir liggi ekki allir á sömu línunni, eða að við megum velja okkur punkt af handahófi (og þá punkt sem er ekki á línunni á hringnum) á þeim hlutum sem við höfum þegar teiknað. Við komum okkur því saman um að það megi.



Mynd 10 : Ekki er hægt að teikna þveril línunnar $A - B$ gegnum A

Reglustiku og fast hringssmíð 1 (Lína samsíða gefinni stefndri línu gegnum gefin punkt P).

Tveir punktar A og B og miðpunktur þeirra M á gefnu línunni sé þekktir. Köllum þetta stefnda beina línu. Teiknum $A - P$ og látum S vera punkt á $A - P$ hinumegin við $B - P$.


Teiknum nú $S - M$ og $B - S$. Látum $C = B - P + S - M$. Ef við teiknum svo línu $A - C$, þá sker hún $B - S$ í $D = B - S + A - O$, en þá er línan $P - D$ samsíða $A - B$.

Reglustiku og fast hringssmíð 1 (Lína samsíða gefinni stefndri línu gegnum gefin punkt P).

P – D og A – B eru samsíða, þar sem setning Ceva [4] um þríhyrninga segir að þar eð hornalínurnar liggja allar gegnum sameiginlegan punkt C, þá er

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BD}{DS} \cdot \frac{SP}{PA} = 1,$$


og þar sem $\frac{AM}{BM} = 1$, þá er $\frac{BD}{DS} = \frac{PA}{SP}$ svo $\frac{BS}{DS} = \frac{AS}{PS}$. Því er $\triangle ABS \equiv \triangle PDS$ og $P – Q$ því samsíða A – B (því $\angle ABS = \angle PDS$).



Mynd 11 : Lína samsíða gefinni línu með gefnum miðpunkt gegnum gefinn punkt.

Reglustiku og fast hringssmíð 2 (Lína samsíða gefinni línu gegnum gefinn punkt).


Látum $M - M'$ vera línuna og $K = O|r$ vera fasta hringinn og P vera gefna punktinn ekki á $M - M'$. Teiknum nú $M - O$ og látum Notum svo smíð 1 til þess að finna línu samsíða $M - O$ Í gegnum punkt á hringnum Y (sem við getum fundið m.þ.a. nota M' eða P) Táknum skurðpunkt $X - Y$ og $M - M'$ með A . Finnum nú X' og Y' sem skurðpunkta $X - O$ við hringinn og $Y - O$. Teiknum nú línu X' og Y' og látum B vera skurðpunkt $X' - Y'$ við l . Þá er $AM = BM$ og því eru A og B punktar á línunni $M - M'$ með miðpunkt M , en þá getum við notað smíð 1 til að teikna línu samsíða henni gegnum P . Athugum að ef O er á línunni $M - M'$, þá getum við notað O og skurðpunkta K við $M - M'$ í stað A, B og M og fengið sömu niðurstöðu.



Mynd 12 : Lína samsíða gefinni línu gegnum gefinn punkt

Fylgismíð (Færsla gefinnar lengdar í gefinn punkt).

Látum AB vera gefna lengd og P vera gefinn punkt. Við getum notað smíð 2 til að teikna línu m samsíða $A - B$ í gegnum P . Við getum einnig notað smíð 2 til að teikna línu n samsíða $A - P$ í gegnum B . Látum Q vera skurðpunkt l og n . Þá er $PQ = AM$. Sjá mynd 13




Mynd 13 : Færsla lengdar

Reglustiku og fast hringssmíð 3 (Þverill línu gegnum gefinn punkt).

Viljum teikna þveril línu l gegnum punkt P . Teiknum l' með smíð 2 þ.a. hún skeri fasta hringinn K í U og V . Teiknum svo strenginn $U - O$ og látum U' vera skurðpunkt hans og hringsins K .

Þá er línan $V - U'$ þverill á l , en við getum svo notað smíð 2 til teikna línu samsíða $V - U'$ í gegnum P . Hann er þá þverill á l gegnum punkt P skv. reglu Palesar [5].




Mynd 14 : Þverill gefinnar línu gegnum gefinn punkt.

Reglustiku og fast hringssmíð 4 (Strik af gefinni lengd í gefna átt frá gefnum punkti).

Látum PQ vera gefna lengdin, A vera gefna punktinn og $C - D$ vera gefna áttin.

Byrjum á að gera línu samsíða $C - D$ í gegnum A , og köllum þá línu $A - H$. Beitum svo fylgismíðinni og skrifum strik af lengd PQ út frá A , og köllum hinn endapunkturinn (ekki A K).


Teiknum svo línu samsíða $C - D$ í gegnum fasta hringinn, og látum skurðpunkt hringsins við línuna vera U . Gerum slíkt hið sama við $P - Q$ og táknnum skurðpunkt hringsins við hringinn með V . Teiknum svo línuna $U - V$. Teiknum svo línu samsíða $U - V$ í gegnum K og finnum skurðpunkt hennar við $A - H$ með S . Þá er $A - S$ samsíða $C - D$ af lengd PQ .



Mynd 15 : Færsla gefinnar lengdar í gefna átt

Reglustiku og fast hringssmíð 5 (Finnur hlutfallið milli gefinna lengda n, m og s , $x = \frac{n}{m}s$).

Teiknum tvo geisla út frá A og notum smíð 4 til þess að merkja lengdir $AM = m$, $AN = n$ á AB og $AS = s$ á AC (sjá mynd 16). Teiknum svo $M - S$, og teiknum svo línu samsíða $M - S$ í gegnum N . Látum X tákna skurðpunkt hennar við $A - C$. Þá er $AX = x = \frac{n}{m}s$ skv. reglu um einslaga þríhyrninga.



Mynd 16 : Hlutfall milli gefinna lengda

Reglustiku og fast hringssmíð 6 (Gefnar lengdir a og b , smíða á \sqrt{ab}).


Látum $x = \sqrt{ab}$, d vera þvermál fasta hringsins c og $t = a + b$. Finna má t með því að beita smíð 4. Látum $h = \frac{d}{t}a$, $k = \frac{d}{t}b$ og $s = \sqrt{hk}$. Þá er $x = \sqrt{ab} = \sqrt{\frac{th}{d} \cdot \frac{tk}{d}} = \frac{t}{d}s$. Athugum að $h + k = d$, svo við getum búið til strik af lengd $HA = h$ á miðlínu HK í hring c , en þá er $AK = k$. Notum smíð 3 til að búatil þverill á HK í gegnum A og köllum skurðpunkt þverilsins við hringinn S .

Reglustiku og fast hringssmíð 6 (Gefnar lengdir a og b , smíða á \sqrt{ab}).

Þá er $AS = \sqrt{hk}$, en það fæst með reglu Pýþagórasar úr fyrirlestri Benedikts:

$$\begin{aligned}
 AS^2 + OA^2 &= OS^2 \\
 \Leftrightarrow AS^2 + \left(\frac{d}{2} - k\right)^2 &= \left(\frac{d}{2}\right)^2 \\
 \Leftrightarrow AS^2 &= \left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2 + dk - k^2 \\
 \Leftrightarrow AS^2 &= hk + k^2 - k^2 = hk \Leftrightarrow AS = \sqrt{hk}
 \end{aligned}$$

En þá höfum við fundið lengdirnar t , d og s , en þá má beita smíð 5 til að finna $x = \frac{t}{d}s$.



Mynd 17 : Finnum \sqrt{hk} .


Reglustiku og fast hringssmíð 7 (Skurðpunktar línu og hrings).

Látum ℓ vera gefnu línuna og $c = O|r$ vera gefna hringinn. Við þurfum að finna X og Y , skurðpunkta ℓ og $O|r$.

Látum $2s$ vera lengd XY , M vera miðju XY og t vera fjarlægðina OM .

Myndum réttan þríhyrning $\triangle OMX$, en þá gefur Pýþagóras að $s^2 = r^2 - t^2$, þ.e. $s = \sqrt{(r+t)(r-t)}$.

Þá getum við fundið t m.þ.a teikna þverill á ℓ í gegnum O með smíð 3. Við höfum r gefið, og með smíð 4 getum við fundið $r+t$ og $r-t$. Þá getum við beitt smíð 6 til þess að finna s , en þá getum við notað smíð 4 til að finna X og Y .



Mynd 18 : Skurðpunktar hringis og línu

Reglustiku og fast hringssmíð 8 (Skurðpunktar tveggja hringja).

Látum $c_1 = O_1|r_1$ og $c_2 = O_2|r_2$ vera gefnu hringina, og látum X og Y vera skurðpunkta þeirra (sem við eigum að smíða). Látum A vera skurðpunkt $X - Y$ við $O_1 - O_2$. Látum $t = O_1 O_2$, $q = O_1 A$ og $x = XA$. Við þurfum að sýna að við getum smíðað lengdirnar q og x , en þá getum við notað 4 til að finna A , svo getum við notað 3 til að finna línuna $X - Y$, og svo 4 aftur til að búa til strik af lengd x í átt $X - Y$ til að finna X (og Y).


- (i) Finnum q : Með því að nota kósínus regluna [6] á $\triangle O_1 O_2 X$ fáum við að

$$\begin{aligned} r_2^2 &= r_1^2 + t^2 - 2r_1 t \cos(\angle XO_1 O_2) \\ &= r_1^2 + t^2 - 2t(r_1 \cos(\angle XO_1 O_2)) \quad (*) \\ &= r_1^2 + t^2 - 2tq \end{aligned}$$


((*) sjá mynd 20 frá Wikipediu [6]). Látum $d = \sqrt{r_1^2 + t^2}$, en þá er $q = \frac{(d+r_2)(d-r_2)}{2t}$. d er langhlið rétthyrnds þríhyrnings með skammhliðar r_1 og r_2 er hægt að búa til með 3 og 4, og ef við látum svo $n = d + r_2$, $m = 2t$ og $s = d - r_2$, þá eru þær lengdir allar smíðanlegar með 4 og $q = \frac{n}{m}s$ er smíðanleg með 5.

- (ii) Finnum x : Athugum að $\triangle AO_1X$ mynda rétthyrndan þríhyrning, svo $x^2 = r^2 - q^2$, svo $x = \sqrt{r_1^2 + qr_1} - q$. Með smíð 4 getum við búið til $h = r_1 + q$ og $k = r_1 - q$, en þá getum við notað smíð 6 til að finna \sqrt{hk} .

En með (i) og (ii) höfum við þá fundið q og x og getum þar með fundið X og Y .



Mynd 19 : Skurðpunktar tveggja hringja.



Mynd 20 : Útskýring á að $r_1 \cos(\angle XO_1O_2) = q$

Poncelet-Steiner setningin

Sönnun á Poncelet-Steiner setningunni.

Með því að nota smíðir 7 og 8 getum við fundið skurðpunkta hringa og línu og skurðpunkta tveggja hringja með einum hring og reglustiku. Þar sem við getum þegar fundið skurðpunkt tveggja lína með reglustiku, þá getum við beitt öllum aðgerðunum sem bæta við teiknanlegum punktum. Því er sérhver mynd sem er teiknanleg með hringfara og reglustiku teiknanleg með reglustiku og einum hring.

Q.E.D

Efnisyfirlit

- 1 Inngangur og Táknmál
- 2 Mohr-Mascheroni setningin
- 3 Poncelet-Steiner setningin
- 4 **Prískipting horns og annað ómögulegt**
- 5 Heimildir

Dæmi eru til um sléttumyndir sem ekki er hægt að mynda með einungis hringfara og reglustiku

- Þrískipting horns. Verkefnið felst í að mynda línur sem skipta gefnu horni í þrjú jafn stór horn. Sannað að það væri ekki hægt af Pierre Wantzel árið 1837 (með hjálp Galois fræði).
- Ferningun hring. Verkefni felst í að búa til ferning sem hefur sama flatarmál og gefinn hringur. Ekki hægt, þar sem það krefst torræðar tölu ($\sqrt{\pi}$). (sjá sönnun hjá Jóni Áskeli síðar í samæfingum.)
- Tvöföldun tenings. Verkefnið felst í að búa til hlið fernings sem hefur tvöfalt rúmmál á við gefin tening. En það er ekki hægt, því ekki er hægt að mynda $\sqrt{32}$ úr heilumtölum með samlagningu, frádrætti, margföldun, deilingu og kvaðratrótum.

Þó er hægt að þrískipta horni, ef við leyfum okkur reglustiku sem er merkt á tveimur stöðum. Til þess þurfum við þó fleiri smíðir.

Smíð 1 (Tvískipting horns [12]).

Látum horn $\angle PQR$ vera gefið. Finnum miðpunkt PQ með smíð 5 og köllum M . Teiknum hringinn (QM) og finnum skurðpunktinn

$P_1 = Q - P + (QM)$ og skurðpunktinn $P_2 = Q - R + (QM)$. Finnum einnig skurðpunktinn $S_1 = Q - P + (QP)$ og skurðpunktinn $S_2 = Q - R + (QP)$ þá er lengd striksins S_1P_1 sú sama og lengd striksins S_2P_2 . Teiknum nú skurðpunkt hringjana $C = (S_1P_1) + (S_2P_2)$. Þá helmingar línan $Q-C$ hornið $\angle PQR$.

Við sjáum að með því að beita smíð 1, þá getum við breytt hvaða horni í summu hvassra horna. Við getum svo þrískipt hverju horni fyrir sig, og notað svo þær þrískiptingar til að mynda þrískiptingu upprunalega hornsins.

Smíð 2 (Þrískipting horns með tvímerktri reglustiku [13]).


Látum hvasst horn α með oddpunkt O vera gefið. Látum nú annað merki reglustikunnar í O og merkjum punkt D við hina merkinguna. Strikið $O-D$ hefur þá lengdina d . Teiknum nú hring (OD) . Finnum nú nú skp. arma hornsins við hringinn (OD) og köllum þá A og B . Þá er $\alpha = \angle AOB$. Teiknum nú línuna OA .

Smíð 2 (Þrískipting horns með tvímerktri reglustiku [13]).

Látum nú reglustikuna þannig að önnur merkingin er á hringnum hinumegin við línuna $O-B$ við A , og hin sömu megin á línunni $O-A$, og reglustikan fer í gegnum punkt B . Köllum þá R og Q . Látum nú $\beta = \angle RQO$. Þá er þríhyrningurinn $\triangle RQO$ jafnarma, þar sem $|RQ| = |RO|$. Því er $\angle ROQ = \beta$ og því er $\angle BRO = 2\beta$. Þar sem þríhyrningurinn $\triangle BRO$ er líka jafnarma, $\angle RBO = \angle BRO = 2\beta$. En þá er $\angle ROB = \pi - 4\beta$ (hornasumma þríhyrnings í radiönnum er π). Með því að summera upp hornin í O fæst því að


$$\beta + (\pi - 4\beta) + \alpha = \pi,$$

en það þýðir að $\alpha = 3\beta$




Mynd 21 : Þrískipting horns með tvímerktri reglustiku

Vert er að nefna að með því að nota japönsk pappírsbrotslistina Origami [8], þá má tvöfalda teninginn og þrískipta horninu. Þar eru aðgerðirnar gefnar með Huzita-Hatori forsendunum [9].



(a) $PB/PA = \sqrt[3]{2}$



(b) Þrískipting hornsins CAB

Mynd 22 : Tvöföldun tengingsins og þrískipting hornsins með Origami

Efnisyfirlit

- 1 Inngangur og Táknmál
- 2 Mohr-Mascheroni setningin
- 3 Poncelet-Steiner setningin
- 4 Prískipting horns og annað ómögulegt
- 5 Heimildir

Heimildir I



Wikipedia

Compass-and-straightedge construction.

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-and-straightedge_construction&oldid=642473603
Online; accessed 18-January-2015.



Wikipedia

Compass-equivalence theorem.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass-equivalence_theorem&oldid=637959570
Online; accessed 29-January-2015.



Wikipedia

Mohr-Mascheroni theorem.

<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohr>
Online; accessed 20-January-2015.

Heimildir II



Wikipedia

Ceva's theorem.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceva>

Online; accessed 30-January-2015.



Wikipedia

Thales's theorem.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thales>

Online; accessed 30-January-2015.



Wikipedia

Law of cosines.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Law_of_cosines&oldid=645015128

Online; accessed 1-February-2015.

Heimildir III



Wikipedia

Poncelet-Steiner theorem.

<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poncelet>.

Online; accessed 20-January-2015.



Wikipedia

Mathematics of paper folding.

[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematics_of_paper_folding&oldid=630113885)

[Mathematics_of_paper_folding&oldid=630113885](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathematics_of_paper_folding&oldid=630113885).

Online; accessed 1-February-2015.



Wikipedia

Huzita-Hatori axioms.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Huzita>.

Online; accessed 1-February-2015.

Heimildir IV



Math Open Reference.

Intersecting Chord Theorem.

<http://www.mathopenref.com/chordsintersecting.html>.

Online; accessed 28-January-2015.



Math Open Reference.

Intersecting Secants Theorem.

<http://www.mathopenref.com/secantsintersecting.html>.

Online; accessed 29-January-2015.



Math Open Reference.

Bisecting an Angle.

<http://www.mathopenref.com/constbisectangle.html>.

Online; accessed 28-January-2015.

Heimildir V



Arthur Baragar.

Constructions Using a Compass and Twice-Notched Straightedge.

The American Mathematical Monthly, Vol. 109, No. 2 (Feb., 2002), pp. 151-164.

<http://www.jstor.org/stable/2695327>.



Michael Woltermann.

Steiner's Straight-edge Problem.

[http:](http://www2.washjeff.edu/users/mwoltermann/Dorrie/34.pdf)

[//www2.washjeff.edu/users/mwoltermann/Dorrie/34.pdf](http://www2.washjeff.edu/users/mwoltermann/Dorrie/34.pdf).



Norbert Hungerbuhler.

A Short Elementary Proof of the Mohr-Mascheroni Theorem.

The American Mathematical Monthly, Vol. 101, No. 8 (Oct., 1994), pp. 784-787.

<http://www.jstor.org/stable/2974536>.

Heimildir VI



Jørgen Mohr.

Euclides Danicus.

Amsterdam: Van Velsen, 1672 (København: 1928).



Evklíð.

John Casey.

The First Six Books of the Elements of Euclid

www.gutenberg.org/ebooks/21076



Reynir Axelsson.

Kafla um teiknanlega punkta úr bók um evklíðska rúmfræði.

Óútgefið.