

задача 1

$$A = \langle N, P^* \rangle$$

$$a, b \in N: \langle a, b \rangle \in P^* \Leftrightarrow m - n > 2$$

* $\{=\}$

$$e_=(x, y) \leq \forall t (p(t, x) \Leftrightarrow p(t, y))$$

като $x=y \Rightarrow$ за всички t има t цела да имат еднаква истинност на ф-тата

* $\{0, 1, 2\}$

Нак: като не можем да дефинираме даден символ пробвай да дефинираме н-во от символите

$$e_{0,1,2}(x) \leq \forall t \exists p(t, x)$$

ф-тата е вярна, защото за което е $t \in N$, ако

$x \in \{0, 1, 2\}$ никоя няма да е вярна

* $\{<0, 3, 7\}$

$$e_{<0,3,7}(x, y) \leq e_{0,1,2}(x) \& p(x, y) \& \forall t (p(t, x) \Rightarrow p(t, y))$$

Нужно ни е $x \in \{0, 1, 2\}$, за да покрива работата само в двата, но минималната също е вярна. Минималната хваща случаите, когато $y=3$, защото ограничава $x=t$, в противен случай ако $y=4$, минималната може да има два варианта, а не точно един

* {0}

$$e_0(x) \Rightarrow \exists y \, e_{<0,3>}(x,y)$$

* {3}

$$e_3(x) \Rightarrow \exists y \, e_{<0,3>}(y,x)$$

От ~~буква~~ и-буква {<0,3>} аз трябва може да си
помогна да провери сигнатурите поотделно