

LA CONSTIPATION CHEZ LES ENFANTS

La constipation est un état qui se manifeste par le passage douloureux de selles dures et sèches ou des selles moins fréquentes.

La constipation chez les enfants est fréquente et n'est généralement pas causée par une affection grave. En fait, elle est souvent attribuable à une consommation excessive d'aliments constipants (comme les produits laitiers) ou à une ingestion insuffisante de liquides pendant la journée.

Lorsque la constipation est persistante, il arrive qu'une grosse masse de selles sèches et dures reste coincée dans le rectum (la partie inférieure de l'intestin). Il est possible que l'enfant salisse ses sous-vêtements car de petites quantités de selles peuvent s'écouler autour de cette « masse ». Il est important de se rappeler que l'enfant ne le fait pas exprès et donc qu'une punition n'est pas de mise.

La constipation peut être traitée, mais il faut faire preuve de patience car cela peut prendre du temps (parfois des mois) pour que les choses s'améliorent.

Manger et boire

Incitez votre enfant à faire des changements faciles :

- Limiter la consommation de produits laitiers à 2 portions par jour (8 ans et moins) et à 3 à 4 portions par jour (9 à 18 ans).
- Manger plus d'aliments riches en fibres et boire suffisamment de liquides. Un apport normal en liquides et en fibres est recommandé. Pour des conseils concernant les fibres, cliquez sur le lien suivant : <https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=964&language=French>

Élimination et propreté

Il est important de suivre une routine régulière au moment d'aller aux toilettes. Par exemple, incitez votre enfant à s'asseoir sur la cuvette des toilettes 5 à 10 minutes deux fois par jour, idéalement juste après les repas. Les pieds de l'enfant doivent être en appui s'ils n'atteignent pas le sol. Si votre enfant est assez âgé, vous pouvez utiliser un système de récompenses (comme des autocollants ou autres gâteries) quand il va régulièrement aux toilettes. Et n'oubliez pas de rappeler à votre enfant de ne pas ignorer le besoin de se soulager.

Traitement médicamenteux

Certains enfants doivent prendre des médicaments pour traiter la constipation. Le médicament le plus efficace est le PEG 3350; il se présente sous forme de poudre et se dissout facilement dans l'eau ou le jus. Le traitement dure généralement au moins deux mois. Tous les symptômes de la constipation doivent avoir disparu depuis au moins un mois avant que le traitement puisse être interrompu. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de soins avant d'arrêter de prendre un médicament.

Sources : **1)** Rowan-Legg A, Canadian Paediatric Society CPC. Managing functional constipation in children. *Paediatrics & child health*. Dec 2011;16(10):661-670.; **2)** Kosar L, Schuster B. Management of constipation. *RxFiles*. 2017. <http://www.rxfiles.ca>.; **3)** Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition*. Feb 2014;58(2):258-274.

