


INSUFFISANCE CARDIAQUE



Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque?

Votre cœur ne pompe pas assez de sang. Votre corps réagit en retenant le sel et l'eau, en faisant battre le cœur plus vite ou même en le faisant se dilater.

Quels sont les effets de l'insuffisance cardiaque?

- Vous pourriez vous fatiguer facilement.
- Vous pourriez être essoufflé.
- Vous pourriez avoir les jambes, les chevilles et les pieds enflés.
- Vous pourriez prendre du poids rapidement.
- Vous pourriez présenter de la toux et une respiration sifflante.
- Vous pourriez présenter des ballonnements et des nausées.

Quels changements devez-vous apporter à votre mode de vie?

- Consommez **MOINS DE SEL** → pour diminuer la quantité d'eau retenue dans votre organisme. Consommez-en moins de 1 cuillère à thé/jour
- Il se peut qu'on vous demande de **DIMINUER** la quantité de **LIQUIDE** que vous buvez (généralement à moins de 4 à 6 verres)
- **FAITES DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE** régulièrement (demandez conseil à votre médecin)
- **PERDEZ DU POIDS** (si vous êtes en surpoids)
- **LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION D'ALCOOL**
- **ARRÊTEZ DE FUMER**

Où pouvez-vous en apprendre plus?

- B.C. Heart Failure Network
<https://tinyurl.com/y3q6xh6n>
- Heart Failure Matters: Des renseignements pratiques pour les patients, les familles et les aidants <https://www.heartfailurematters.org> (comprend plusieurs vidéos de 3 à 6 minutes)
- Programme d'exercices à domicile de l'Université d'Ottawa <https://tinyurl.com/yybkul2s>
- Cliniques de prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal <https://www.icm-mhi.org/fr/prevention/cliniques-de-prevention-au-centre-epic>



Comment votre insuffisance cardiaque est-elle traitée?

En général, l'insuffisance cardiaque s'aggrave et il n'y a pas de remède connu. Mais le traitement et certaines habitudes de vie peuvent ralentir l'évolution de la maladie et vous aider à vous sentir mieux.

Le TRAITEMENT comprend :

- Des **MÉDICAMENTS** – certains empêchent l'insuffisance cardiaque de s'aggraver. Certains atténuent les symptômes
- Traitement des **CAUSES SOUS-JACENTES** (p. ex., hypertension, diabète, consommation d'alcool)
- **MODIFICATIONS DU MODE DE VIE**

Que pouvez-vous faire d'autre?

- Vérifiez vos symptômes **chaque jour**
- **Pesez-vous** quotidiennement et comparez votre poids avec celui du jour précédent – en le notant dans une grille à remplir
- Vérifiez si vos pieds, vos chevilles, vos jambes et votre ventre sont **enflés**
- Utilisez le feuillet des **Zones d'insuffisance cardiaque** pour vous aider à décider si vous devez communiquer avec votre professionnel de la santé.
- **Prenez vos médicaments** de la manière prescrite par votre professionnel de la santé.
- Utilisez les **grilles à remplir** et apportez-les à chaque visite – elles sont offertes à l'adresse : <https://tinyurl.com/qoxl22b>



Zones d'insuffisance Cardiaque



CHAQUE JOUR

CHAQUE JOUR

- Pesez-vous le matin avant le déjeuner. Notez votre poids et comparez-le avec celui de la veille.
- Ne consommez pas plus de six à huit verres de liquide par jour au total (1500 à 2000 ml, ou 48 à 64 oz).
- Prenez vos médicaments exactement comme votre médecin les a prescrits.
- Examinez vos pieds, vos chevilles, vos jambes et votre estomac pour voir s'ils enflent.
- Consommez des aliments contenant peu ou pas de sel.
- Établissez un équilibre entre les périodes d'activité et de repos.



Dans quelle zone êtes-vous aujourd'hui?

VERT ZONE DE SÉCURITÉ

FEU VERT – Cette zone est votre objectif!

Vos symptômes sont maîtrisés. Vous n'avez :

- Aucun essoufflement.
- Aucun inconfort, pression ou douleur dans la poitrine.
- Aucune enflure des pieds, des chevilles, des jambes ou de l'estomac.
- Aucun gain de poids de plus de 2 kg (4 lb) sur une période de deux jours consécutifs ou de 2,5 kg (5 lb) au cours d'une semaine.



JAUNE ZONE DE PRUDENCE

ATTENTION – Cette zone est un avertissement

Communiquez avec votre dispensateur de soins de santé (p. ex. médecin ou infirmier) si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- Gain de poids de plus de 2 kg (4 lb) sur une période de deux jours consécutifs ou de 2,5 kg (5 lb) au cours d'une semaine
- Vomissements ou diarrhée qui durent plus de deux jours
- Essoufflement pire qu'à l'ordinaire.
- Augmentation de l'enflure des pieds, des chevilles, des jambes ou de l'estomac
- Toux quinteuse sèche
- Fatigue plus grande qu'à l'ordinaire et manque d'énergie pour accomplir vos tâches quotidiennes
- Faiblesse ou étourdissement, ce qui est nouveau pour vous
- Inconfort (vous ne vous sentez pas très bien)
- Respiration plus difficile en position couchée
- Sommeil plus facile avec plusieurs oreillers ou dans un fauteuil



Dispensateur de soins de santé : _____ Numéro de téléphone : _____

ROUGE ZONE DE DANGER

URGENCE – Cette zone signifie qu'il faut agir rapidement!

Rendez-vous au service des urgences ou composez le 9-1-1 si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- Difficulté à respirer
- Essoufflement qui ne disparaît pas lorsque vous êtes assis sans bouger
- Battements rapides du cœur qui ne ralentissent pas lorsque vous êtes au repos
- Douleur à la poitrine qui ne disparaît pas avec du repos ou des médicaments
- Difficulté à penser clairement ou confusion
- Antécédents d'évanouissements



La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC remercie Cardiac Services BC et les experts du réseau de l'insuffisance cardiaque de la Colombie-Britannique d'avoir rédigé cette ressource.

MC L'icône du cœur et de la / et les mots servant de marque Cœur + AVC sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.

