

SYNOVITE TRANSITOIRE

La synovite transitoire est une enflure et une irritation de la synoviale, la membrane tapissant la face interne d'une articulation. Elle affecte le plus souvent l'articulation de la hanche, auquel cas elle est également appelée « rhume de hanche ». Elle touche surtout les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle tend à toucher plus souvent les garçons que les filles.

La synovite transitoire est heureusement une affection bénigne qui se résorbe généralement d'elle-même en une à deux semaines.

Quelles sont les causes de la synovite transitoire?

La cause exacte est inconnue mais dans près de la moitié des cas, elle touche des enfants ayant guéri d'un rhume, d'une infection intestinale ou d'une autre maladie virale comme une infection à l'oreille.

Quels sont les symptômes de la synovite transitoire?

Les symptômes peuvent comprendre :

- Boiterie
- Difficultés à marcher à quatre pattes ou à se mettre debout
- Douleur à l'articulation affectée
- Refus de marcher, sans donner de raison

Existe-t-il des tests pour la dépister?

Votre médecin vous posera de nombreuses questions sur les symptômes de votre enfant et effectuera un examen physique approfondi. Généralement, aucun autre test n'est nécessaire.

Quel est le traitement?


- Acétaminophène (Tylenol) ou ibuprofène (Advil, Motrin) pour soulager la douleur. Assurez-vous de suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- Ne donnez **jamais** d'aspirine (AAS) à votre enfant.
- Repos complet à la maison – limitez toute activité imposant un poids sur la hanche de votre enfant.
- Il peut reprendre ses activités habituelles graduellement une fois que la douleur a disparu.

Quand dois-je consulter mon médecin?

Surveillez de près tout changement de la santé de votre enfant. Communiquez avec votre médecin si :

- l'état de votre enfant ne commence pas à s'améliorer en trois jours ou s'il n'est pas complètement rétabli en deux semaines;
- la douleur articulaire de votre enfant s'intensifie;
- votre enfant présente une fièvre de 38 °C ou plus.

Même une fois que votre enfant se porte mieux, la synovite transitoire peut réapparaître. Si les symptômes de votre enfant réapparaissent, vous devez consulter votre médecin.



Sources : 1) MyHealthAlberta.ca. Transient Synovitis in Children: Care Instructions. 2017 <https://myhealth.alberta.ca/Health/aftercareinformation/pages/conditions.aspx?hwid=ad1767>; **2)** The Royal Children's Hospital Melbourne.

Transient synovitis (irritable hip). 2018 https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Transient_synovitis/

© La Fondation pour l'éducation médicale continue, www.fmpe.org

février 2020

