

LAUDO DE FUMIGAÇÃO

Itabuna-BA, 06.05.2026

São muitas as espécies de pragas que se encontram em produtos armazenados e seus subprodutos. Dentre elas, destacam-se os insetos como um dos mais importantes agentes responsáveis pelas perdas no período pós-colheita.

Os insetos que desenvolvem em produtos armazenados e apresentam características de acordo com o ambiente que se encontram os grãos e subprodutos. Quanto aos seus hábitos alimentares, os insetos podem ser classificados em primários, secundários e associados. Os primários são capazes de romper o grão para atingir o endosperma; os secundários não são capazes de romper o grão e, geralmente, vivem associados aos insetos primários, pois, uma vez rompida a parte externa do grão, são capazes de se desenvolver; enquanto os insetos associados são frequentemente encontrados nos grãos, porém, sem danificá-los.

Atualmente, a produção mundial de alimentos sofre perda significativa devido à existência dessas pragas durante o armazenamento e transporte após a colheita. Estas perdas, após avaliação, chegam a valores preocupantes e por conta disso as indústrias alimentícias têm buscado procedimentos e/ou alternativas que auxiliem no controle das principais causas dessas perdas. Entre as técnicas mais utilizadas e que fornecem os melhores resultados está a fumigação.

A fumigação é um procedimento mais aconselhado e tem sido um dos mais usados porque consegue atingir todas as fases do ciclo de vida dos insetos e por garantir um controle mais adequado. Entretanto, existem os procedimentos apropriados e indispensáveis no ato da fumigação tais como o uso de lonas apropriadas, cobras de areia e a total vedação das pilhas são procedimentos de suma importância.

Na fábrica e nos depósitos da empresa onde foi executado o serviço, as condições encontradas no local permitiram a execução da fumigação. Estas condições foram verificadas após visita dos técnicos da ASTRAL ao local.

Assim, durante este mês, foram feitas fumigações seguindo os procedimentos devidos para o referido processo:

- 1) Uso de lonas apropriadas para cobertura das pilhas;
- 2) Uso de cobras de areia para vedação das lonas e dessa forma maior confinamento do gás;
- 3) Uso de placas sinalizadoras para evidenciar a área onde estava acontecendo a fumigação;
- 4) Uso da distancia de segurança (5 m) das pilhas para movimentação de cargas;
- 5) Uso dos EPIs correto (macacões com cobertura total do corpo e impermeáveis, máscaras com filtros apropriados, botas com biqueira de aço, luvas).

No quadro abaixo podem ser observadas as especificações sobre local, metro cubico,data tipo de tratamento, produto tratado e produto utilizado:

RELATÓRIO DE TRATAMENTO DE EXPURGO –					
LOCAL	DATA	TIPO TRATAMENTO	PRODUTO TRATADO	PRODUTO UTILIZADO	METRO CUBICO/QUANT. FUMIGADAS
BLACK KING	06/05/2026	FUMIGAÇÃO	CACAU	PHOSTEK	2,39M ³ DE CACAU

NO TOTAL FORAM FUMIGADAS 2,39 M³ DE CACAU COM O PRODUTO PHOSTEK, NO BLACK KING.