

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

东南大学成贤学院期末考试卷（A卷）

课程名称	概率论与数理统计（经）		适用专业	经管类（普通层次）	
考试学期	23-24-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120分钟
学号		姓名		得分	

题号	一	二	三	四	五
得分					

备用数据： $\Phi(-1.645)=0.05$; $\Phi(1)=0.8413$; $\Phi(1.5)=0.9332$;
 $\Phi(1.96)=0.975$; $\Phi(2)=0.9772$; $\Phi(2.84)=0.997$;

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_9^2 \geq 19)=0.025$; $P(\chi_9^2 \geq 2.7)=0.975$;
 $P(\chi_8^2 \geq 17.5)=0.025$; $P(\chi_8^2 \geq 2.2)=0.975$;

$T_n \sim t(n)$ $P(T_8 \geq 1.86)=0.05$; $P(T_8 \geq 2.3)=0.025$;

一、判断题（共5小题，每小题3分，共15分）

1、设袋中有7个白球，3个红球，从中有放回抽取2个，则至少取到1个

红球的概率为 $1-\frac{C_7^2}{C_{10}^2}$. []

2、设二维离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y		0	1	2
X				
	0	0.1	0.2	0.3
	1	0.2	0.1	0.1

则 X 与 Y 不独立。 []

3、 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， X 服从泊松分布 $P(1)$ ，

Y 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布 $E(1)$ ，则 $P(X=1, Y=1)=2e^{-1}$ 。 []

4、设随机变量 X, Y, Z 独立都服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则 $\frac{(X-Y)^2}{2Z^2}$ 服从
的分布为 $F(1,1)$. []

5、设 $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量 n 为的简单随机样本，
 μ 未知，对检验问题：

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

若在显著水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0 ，则在显著水平 $\alpha=0.01$ 下，可能接受，
也可能拒绝 H_0 . []

二、填空题（本题共5小题，每小题3分，满分共15分）

1、设 $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B|A)=\frac{1}{3}$, 则 $P(\overline{A} \cup B)=$ _____.

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(2, 4)$ ， $Y \sim N(1, 1)$ ，
则 $2X-3Y$ 服从_____（写出分布名称及参数）.

3、设随机变量 X 服从参数 $\lambda=2$ 的泊松分布 $P(2)$,则 $P(X=EX)=$ _____.

4、 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布列为

X	-1	2	3
P	0.5	0.4	0.1

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____。

5、设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 1, & \theta < x < \theta+1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的容量为 n 的简单随机样本，则 $D\bar{X}=$ _____.

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 市场上有甲、乙、丙三家工厂生产的同一品牌产品, 已知三家工厂的市场占有率分别为30%、20%、50%, 且三家工厂的次品率分别为3%、3%、1%,

- (1)、求市场上该品牌产品的次品率;
- (2)、若某顾客买到该品牌次品, 问此次品是由甲工厂生产的概率为多少?

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2}, & -2 < x < 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = 3X + 1$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(X^3)$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{4}, & 0 < x < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求: 1、 Y 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- 3、 $P(X < 1, Y < 1)$.

五、(本题共 4 小题，满分共 35 分)

1、 (8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$Y \backslash X$	1	2	3	4
2	0	0.1	0.2	0.05
4	0.1	0.05	0.1	0.1
6	0.15	0.1	0.05	0

- 求： (1)、 关于 X 的边缘分布律
(2)、 在 $Y = 3$ 发生条件下关于 X 的条件分布律.

2、 (10分) 某保险公司有 400 辆汽车投保，若每辆汽车在一年内出事故受损，保险公司需赔付。各辆汽车在一年内是否出事故相互独立，出事故的概率为 0.2 , 利用中心极限定理求保险公司一年内赔付超过96辆汽车的概率.

3、 (10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 2\theta x^{2\theta-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求： (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ； (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

4、 (7分) 随机地取某种炮弹9发做试验，得炮口速度的样本标准差 $S = 4 \text{ m/s}$ ， 设炮口速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， 求这种炮弹的炮口速度的方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间.