

# PDE 知识整理

整理者：颜成子游/南郭子綦

2023 年 5 月 11 日

## 目录

1. 齐次化原理。

设  $L$  是  $t, x$  的线性微分算子。且关于  $t$  的最高阶求导次数小于  $m$ ，则定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^m \omega}{\partial t^m} = L\omega + f(x, t), t > 0 \\ \omega|_{t=0} = \cdots = \frac{\partial^{m-1} \omega}{\partial t^{m-1}}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解表示为：

$$\omega = \int_0^t z(x, t; \tau) d\tau$$

其中  $z$  是定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^m z}{\partial t^m} = Lz, t > \tau > 0 \\ z|_{t=\tau} = \cdots = \frac{\partial^{m-2} z}{\partial t^{m-2}}|_{t=\tau} = 0, \frac{\partial^{m-1} z}{\partial t^{m-1}}|_{t=\tau} = f(x, \tau) \end{cases}$$

的解。

在实际应用中，如果有第一个方程待解，可以考虑下面的方程。把  $\tau$  看作参数般解出  $z$  后，对  $\tau$  做积分得到第一个方程的解。

**例 0.1 (Duhamel 原理: 对于波动方程)** 设柯西问题为：

$$\begin{cases} \square_4 \omega = 0, t > \tau \\ \omega(x, \tau, \tau) = 0 \\ \omega_t(x, \tau, \tau) = f(x, \tau) \end{cases}$$

则  $u(x, t) = \int_0^t \omega(x, t, \tau) d\tau$  是柯西问题：

$$\begin{cases} \square_4 u = f(x, t), t > 0 \\ u(\dot{x}, 0) = 0 \\ u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

的解。只需要把  $L$  代为  $\Delta$  算子即可。