
Name, Vorname	Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2	Wintersemester 23/24	
Studiengänge: SWB/TIB/IEP	Seite: 1 von 13	
Prüfungsnummer: IT 105 20 03 / IT 105 20 13	Zeit: 90 Minuten	
Dozent: Prof. Dr. Jürgen Koch	Punkte: 54	

Hilfsmittel:      Manuskript  
Literatur  
Taschenrechner Casio FX-87DE Plus / Casio FX-87DE Plus 2nd edition

Hinweise:        Bearbeiten Sie die Aufgaben ausschließlich auf diesen Prüfungsblättern.  
Begründen Sie alle Lösungsschritte.

**Aufgabe 1 (10 Punkte)** Hinweis: Alle Teilaufgaben können unabhängig voneinander bearbeitet werden.





a) Ordnen Sie den Differenzialgleichungen die Richtungsfelder zu:

(A)  $y' = \frac{x}{y}$

(B)  $y' = \frac{y}{x}$

(C)  $y' = -\frac{x}{y}$

(D)  $y' = -\frac{y}{x}$



		
Name, Vorname	Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2		Wintersemester 23/24
Studiengänge: SWB/TIB/IEP		Seite: 2 von 13

b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung


$$y'(x) = 3x^2 y.$$



c) Berechnen Sie für die Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) = \frac{y}{1+x^2}, \quad y(1) = 3,$$

einen Näherungswert, indem Sie einen Schritt mit dem Euler-Polygonzugverfahren mit der Schrittweite  $h = 0.2$  durchführen.



Name, Vorname	
Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2	Wintersemester 23/24
Studiengänge: SWB/TIB/IEP	Seite: 3 von 13

- d) Beurteilen Sie den folgenden Dialog mit ChatGPT 3.5. Sind die Berechnungen und die Behauptungen von ChatGPT korrekt?

**You**

Bitte erstelle ein Beispiel für ein lineares Differenzengleichungssystem mit zwei Unbekannten, das asymptotisch stabil ist.

**ChatGPT**

Betrachten wir das folgende lineare Differenzengleichungssystem mit zwei Unbekannten:

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= 0.8 x_k + 0.2 y_k \\y_{k+1} &= 0.4 x_k + 0.6 y_k\end{aligned}$$

Die obigen Gleichungen können in Matrixform geschrieben werden als:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \text{ mit der Matrix } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Die Matrix  $\mathbf{A}$  ist die Übertragungsmatrix des Systems. Um die asymptotische Stabilität zu überprüfen, betrachten wir die Eigenwerte dieser Matrix. Die Eigenwerte  $\lambda$  können durch das Lösen der charakteristischen Gleichung gefunden werden:

$$\begin{vmatrix} 0.8 - \lambda & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (0.8 - \lambda)(0.6 - \lambda) - 0.2 \cdot 0.4 = 0 \iff \lambda^2 - 1.4\lambda + 0.4 = 0$$

Die Lösungen dieser quadratischen Gleichung sind  $\lambda_1 = 1$  und  $\lambda_2 = 0.4$ . Beide Eigenwerte haben Beträge kleiner als 1, was darauf hinweist, dass das System asymptotisch stabil ist. In diesem Beispiel konvergieren die Lösungen für  $x_k$  und  $y_k$  gegen Null, was auf eine asymptotische Stabilität hinweist.



		
Name, Vorname	Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2		Wintersemester 23/24
Studiengänge: SWB/TIB/IEP		Seite: 4 von 13

**Aufgabe 2 (9 Punkte)** Bestimmen Sie die allgemeine reelle Lösung der Differenzialgleichung

$$y''(x) + 4\,y(x) = 8\cos(2\,x) - 4\sin(2\,x)\,.$$



		
Name, Vorname	Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2		Wintersemester 23/24
Studiengänge: SWB/TIB/IEP		Seite: 6 von 13

**Aufgabe 3 (10 Punkte)** Bestimmen Sie die allgemeine reelle Lösung des Differenzialgleichungssystems

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2x_1 + 3x_2 + 6e^{-2t}, \\ \dot{x}_2 &= 2x_1 + 3x_2 \quad . \end{aligned}$$









Name, Vorname	
Matrikelnummer	Wintersemester 23/24
Prüfungsfach: Mathematik 2	Seite: 10 von 13
Studiengänge: SWB/TIB/IEP	

**Aufgabe 5 (9 Punkte)** Gegeben ist die Funktion  $f$  mit


$$f(x) = e^{-x^2}.$$

- a) Entwickeln Sie die Funktion  $f$  in eine Potenzreihe um die Entwicklungsstelle  $x_0 = 0$ . Für welche  $x$  Werte konvergiert die Reihe?
- b) Berechnen Sie einen Näherungswert  $\tilde{I}$  für das bestimmte Integral

$$I = \int_0^1 f(x) \, dx$$

mithilfe der Potenzreihe mit den Gliedern bis zur Ordnung 4. Schätzen Sie die maximale Abweichung  $|I - \tilde{I}|$  des Näherungswertes  $\tilde{I}$  vom exakten Wert  $I$  mit dem Leibniz-Kriterium ab.

- c) Geben Sie eine Formel für  $f^{(n)}(0)$  an, d.h. für die  $n$ -te Ableitung der Funktion  $f$  an der Stelle  $x = 0$ . Unterscheiden Sie dabei die Fälle für gerades und ungerades  $k$ .





		
Name, Vorname	Matrikelnummer	
Prüfungsfach: Mathematik 2	Wintersemester 23/24	
Studiengänge: SWB/TIB/IEP	Seite: 12 von 13	

**Aufgabe 6 (8 Punkte)** Gegeben ist die periodische Funktion  $f$ , mit

$$f(t) = t^2 \text{ für } t \in [-2, 2), \quad f(t+4) = f(t).$$

- a) Skizzieren Sie die Funktion  $f$  für  $t \in [-2, 10]$ .
- b) Bestimmen Sie den Mittelwert  $m$  der Funktion  $f$ .
- c) An welchen Stellen tritt bei der Funktion  $f$  das Gibbsche Phänomen auf?
- d) Im folgenden bezeichnen  $a_k$ ,  $b_k$  die reellen und  $c_k$  die komplexen Fourier-Koeffizienten der Funktion  $f$ . Welche der folgenden Aussagen ist wahr und welche ist falsch?

- |                               |                               |                                 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Alle $a_k$ sind null          | <input type="checkbox"/> wahr | <input type="checkbox"/> falsch |
| Alle $b_k$ sind null          | <input type="checkbox"/> wahr | <input type="checkbox"/> falsch |
| Alle $c_k$ sind reell         | <input type="checkbox"/> wahr | <input type="checkbox"/> falsch |
| Alle $c_k$ sind rein imaginär | <input type="checkbox"/> wahr | <input type="checkbox"/> falsch |

