

CONSENTIMIENTO INFORMADO PUENTES Y CORONAS

Las coronas son restauraciones que cubren o forran los dientes devolviendo su tamaño natural color y forma. Una corona no solo ayuda con la apariencia, sino tambien hace al diente mas resistente.

Un puente esta diseñado para reemplazar los dientes perdidos. Estos necesitan ser reemplazados por estetica, para prevenir o corregir la mordida y los problemas de las encias relacionados con la migracion de los dientes. A veces una corona que cobra todo el diente no es necesario y una lamina de porcelana (on-lay o in-lay) pueden ser usados como restauracion. Un in-lay restaura la parte del diente con la que mastica sin cubrir las cuspides. Un on-lay restaura la parte del diente con la que mastica incluyendo las cuspides. Las porcelanas laminadas o Veneers, cubren la parte frontal del diente. Las coronas y puentes pueden estar hechas de metal, porcelana, o metal-porcelana. Los in-lay y on-lay pueden estar hechos de metal o porcelana. Los Veneers estan hechos de porcelana. Como todos los procedimientos, existen ciertas complicaciones potenciales, asociadas con los puentes y coronas. Estos incluyen pero no estan limitados a:

- La necesidad potencial de *terapia endodontica*, los efectos acumulados de las *caries, rellenos y fisuras* en los dientes, pueden producer esta necesidad que puede ser evidente durante la preparacion de la corona o despues que la corona fue terminada.
- En algunos casos es dificil igualar exactamente el *color* de los dientes.
- *Enfermedad periodontal* (enfermedad de las encias). Puede ocurrir a cualquier edad con o sin la presencia de coronas y puentes, en general los puentes y las coronas no crean ni previenen la enfermedad periodontal.
- *Fracturas* de la porcelana, pueden ocurrir despues de colocar la corona. Pequeñas fracturas pueden ser reparadas alisando los bordes de la fractura. Fracturas grandes puede requerir una nueva corona o puente.
- Lineas negras alrededor de la encia pueden aparecer con las coronas y puentes. Este es el borde de metal de la corona. Si la encia sufre recesion despues del cementado de la corona o puente el metal aparecera. Para corregir aquello la mayoria de las veces una nueva corona o puente sera necesario.



- *Caries recurrente*, puede ocurrir despues del cementado de la corona o puente. Esto puede ser corregido con un relleno o una nueva corona o puente pueden ser necesarios si la caries es extensa.
- *Empaquetamiento de comida* puede ocurrir por debajo del puente y aquello puede ser inevitable, un cuidado meticuloso es necesario.
- **Disfuncion temporomandibular** puede ocurrir debido a cambios en la mordida despues que una corona o puente fueron cementados. Esto puede ser usualmente corregido pero en raras ocasiones puede causar sintomas que requieran tratamiento extensivo.

Entiendo el tratamiento recomendado, los riesgos de dicho tratamiento y todas las alternativas me han sido explicadas y los riesgos de esas alternativas, las consecuencias de no hacer nada acerca de mi condicion y los costos del tratamiento. **Todas mis preguntas han sido contestadas**.

Diente #	Costos: Corona / Puente \$
	Reconstruccion \$
Color :	Perno y muñon \$
	Otros: \$
	TOTAL:
Firms del Paciente	Facha
Firma del Paciente	