

5. 已知截面面积的立体体积

已知过 $x = x_0$ 的平面截立体的截面面积为 $A(x)$, 记立体 Ω 在 $x \in [a, x]$ 部分的体积为 $V(x)$.

此时近似有

$$\begin{aligned} V(x + \Delta x) - V(x) &= A(x)\Delta x, \\ \implies V'(x) &= A(x), \quad V = V(b) - V(a) = \int_a^b A(x) dx. \end{aligned}$$

祖暅原理是这个公式的直接推论: $A(x)$ 相同的立体体积均相等.

6. 旋转体的体积

将曲边梯形 $S: x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)$ 绕 x 周旋转一周得到的立体称为旋转体 Ω . 根据上一节的结论有

$$A(x) = \pi f^2(x), \quad V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

例 求椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的体积.

解 可以将上述椭球体看成曲边梯形

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 - \frac{x^2}{a^2}$$

所对应的旋转体, 相应地其截面积和体积为

$$\begin{aligned} A(x) &= \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right), \\ V &= \int_{-a}^a A(x) dx = \pi bc \int_{-a}^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = \pi bc \left(x - \frac{x^3}{3a^2} \right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi abc. \end{aligned}$$

7. 曲线弧长

给定参数方程决定的曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta, x(t), y(t) \in C[\alpha, \beta]$. 利用分割 Δ 近似曲线弧长为

$$\ell(\Delta) = \sum_{i=1}^n |\overline{M_{i-1}M_i}|, \quad M_i = (x(t_i), y(t_i)).$$

若 $\sup_{\Delta} \ell(\Delta) < \infty$, 则称曲线 γ 是可求长的. 不可求长曲线的例子包括

$$y = x \sin \frac{1}{x}, x \in [0, 1]; \quad \text{Koch 雪花曲线.}$$

记 $L(t)$ 为曲线在 $[\alpha, t]$ 之间的长度, 则

$$\begin{aligned}
L(t+\Delta t) - L(t) &= |\overline{M_{t+\Delta t} M_t}| = \sqrt{(x(t+\Delta t) - x(t))^2 + (y(t+\Delta t) - y(t))^2} \\
&\approx \sqrt{(x'(t)\Delta t)^2 + (y'(t)\Delta t)^2} \\
&= \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \Delta t \quad (\text{默认 } \Delta t > 0, \text{注意积分上下限带来的正负号问题}) \\
\Rightarrow L'(t) &= \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}, L(t) = \int_a^t L'(t) dt.
\end{aligned}$$

对于以 $y = f(x)$ 形式给出的曲线, 可以取参数方程 $\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}$, 其弧长公式即为

$$L(t) = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

类似地, 对于极坐标系曲线 $r = r(\theta)$, 取参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$ 即得

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} x'(\theta) = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta \\ y'(\theta) = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta \end{cases} \\
&x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 = r'(\theta)^2 + r(\theta)^2, \\
\Rightarrow L &= \int_\alpha^\beta \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} d\theta.
\end{aligned}$$

8. 旋转体的侧面积

采取微元法分析一小段 Δx 对应的侧面积:

$$\begin{aligned}
\Delta S(x) &= 2\pi f(x) \Delta s = 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f')^2} \Delta x, \\
\Rightarrow S &= \int_a^b 2\pi f \sqrt{1 + (f')^2} dx,
\end{aligned}$$

相应的参数方程版本即为

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt.$$

例 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的表面积.

解 相应的曲边梯形为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

于是表面积为

$$S = \int_0^\pi 2\pi y \sqrt{(x')^2 + (y')^2} d\theta = \int_0^\pi 2\pi r^2 \sin \theta d\theta = 4\pi r^2.$$

第八章 广义积分

在应用的定积分的换元法时, 经常会出现积分上下限异常的情形, 例如

$$\int_0^1 \sin \frac{1}{t} dt \stackrel{u=\frac{1}{t}}{=} \int_1^{+\infty} \frac{\sin u}{u^2} du.$$

这不是我们已经定义的闭区间上的定积分, 因此我们需要拓展我们的定义来研究这类积分.

定义 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义且 $\forall x > a, f \in R[a, x]$.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) \, dx$ 存在, 则称 f 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分收敛, 记

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(x) \, dx,$$

否则称 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 发散.