

PHYS 2311 Ch. 19 HW
Corbin Hibler (c-hibler@onu.edu)
December 12, 2024

MisConcQ 1.

- 7. D
- 10. D
- 11. D
- 12. B
- 13. B

Problem 1.

$$Q = mc\Delta T$$

$$6800 = (3.0)(1.000)(T_f - 10)$$

$$T_f = \frac{6800}{(3.0)(4186)} + 10 = \boxed{10.5^\circ\text{C}}$$

Problem 6.

$$Q = mc\Delta T$$

$$32\,000\,000 = m(4186)(42 - 12)$$

$$\frac{32\,000\,000}{(4186)(30)} = m = \boxed{254.8\text{ kg/h}}$$

Problem 8.

Mass of 18 L of water is 18 kg.

$$m = 18\text{ kg}, \quad \Delta T = 80^\circ\text{C}$$

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q = (18)(4186)(80) = \boxed{6.03\text{ MJ}}$$

Problem 9.

$$Q = mc\Delta T$$

$$165\,000 = (4.1)c(37.2 - 18.0)$$

$$c = \frac{165\,000}{(4.1)(19.2)} = \boxed{2096 \text{ J/kg}^\circ\text{C}}$$

Problem 20.

$$L_V = 210 \text{ kJ/kg}, Q = 3.40 \times 10^5 \text{ J}$$

$$Q = mL_V$$

$$3.40 \times 10^5 \text{ J} = m(210 \text{ kJ/kg})$$

$$m = \frac{3.40 \times 10^5 \text{ J}}{210\,000 \text{ J/kg}} = \boxed{1.62 \text{ kg}}$$

Problem 21.

Silver is solid at 25°C .

$$m = 26.50 \text{ kg}, L_F = 88 \text{ kJ/kg} = 88\,000 \text{ J/kg}, \quad \Delta T = (961 - 25) = 936^\circ\text{C}, \quad c = 230 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

$$Q = mc\Delta T + mL_F = (26.50)(230)(936) + (26.50)(88\,000) = \boxed{8.0 \text{ MJ}}$$

Problem 32.

Isothermal means:

$$\Delta E_{\text{int}} = 0, \quad Q = W_{\text{by}}$$

(a)


$$\boxed{\Delta E_{\text{int}} = 0}$$

(b)

$$Q = W_{\text{by}} = \boxed{4.3 \text{ kJ}}$$

Problem 33.

(Generated using TikZ)



Problem 35.

Isobaric means:

$$Q = \Delta E_{\text{int}} + W = \Delta E_{\text{int}} + P\Delta V$$


(a)

$$W = P\Delta V = (101325)(4.1 - 2.2) = \boxed{193 \text{ kJ}}$$

(b)

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - P\Delta V = 680\,000 - (101325)(4.1 - 2.2) = \boxed{487 \text{ kJ}}$$

(c) (Generated using TikZ)

**Problem 36.**

Isovolumetric means:

$$W = 0, \quad Q = \Delta E_{\text{int}}$$

Given:

$$Q = 425 \text{ kJ}$$

(a)

$$\boxed{W = 0}$$

(b)

$$\Delta E_{\text{int}} = Q = \boxed{425 \text{ kJ}}$$

Problem 40.

Isothermal means:

$$\Delta E_{\text{int}} = 0, \quad Q = W_{\text{by}}$$

Given:

$$n = 3.20 \text{ mol}, \quad T = 295 \text{ K}, \quad V_1 = 3.50 \text{ m}^3, \quad V_2 = 7.00 \text{ m}^3$$

(a)

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = (3.20)(8.314)(295) \ln\left(\frac{7.00}{3.50}\right) = \boxed{5440 \text{ J}}$$

(b)

$$Q = W = \boxed{5440 \text{ J}}$$

(c)

$$\boxed{\Delta E_{\text{int}} = 0}$$

Problem 49.

Given:

$$n = 5.40 \text{ mol}, \quad T = 2450 \text{ K}$$

For a fully excited diatomic gas:

$$C_V = \frac{7}{2}R$$

$$E_{\text{int}} = \frac{7}{2}nRT = \frac{7}{2}(5.40)(8.314)(2450) = \boxed{385 \text{ kcal}}$$