

# 1 Дифференциал

Минитеория:

1.  $d(XY) = dX \cdot Y + X \cdot dY$
2.  $dA = 0$
3.  $d(X') = dX'$
4.  $d \det X = \text{tr}(\dots)$

## 1.1 Вспомним дифференциал :)

1. Известно, что  $f(x) = x^2 + 3x$ . Найдите  $f'(x)$  и  $df$ . Чему равен  $dx$  в точке  $x = 5$  при  $dx = 0.1$ ?
2. Известно, что  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2^3$ . Найдите  $df$ . Чему равен  $df$  в точке  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 1$  при  $dx_1 = 0.1$  и  $dx_2 = -0.1$ ?
3. Известно, что  $F = \begin{pmatrix} 5 & 6x_1 \\ x_1x_2 & x_1^2x_2 \end{pmatrix}$ . Найдите  $dF$ .
4. Известно, что  $F = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ . Найдите  $dF$ .
5. Матрица  $F$  имеет размер  $2 \times 2$ , в строке  $i$  столбце  $j$  у неё находится элемент  $f_{ij}$ . Выпишите выражение  $\text{tr}(F'dF)$  в явном виде без матриц.

## 1.2 Пусть $t$ — скалярная переменная, $r, s$ — векторные переменные, $R, S$ — матричные переменные. Кроме того, $a, b$ — векторы констант, $A, B$ — матрицы констант.

Применив базовые правила дифференцирования найдите:

1.  $d(ARB)$ ;
2.  $d(r'r)$ ;
3.  $d(r'Ar)$ ;
4.  $d(R^{-1})$ , воспользовавшись тем, что  $R^{-1} \cdot R = I$ ;
5.  $d \cos(r'r)$ ;
6.  $d(r'Ar/r'r)$ .

## 1.3 В методе наименьших квадратов минимизируется функция

$$Q(\hat{\beta}) = (y - X\hat{\beta})'(y - X\hat{\beta}).$$

1. Найдите  $dQ(\hat{\beta})$  и  $d^2Q(\hat{\beta})$ ;
2. Выпишите условия первого порядка для задачи МНК;
3. Выразите  $\hat{\beta}$  предполагая, что  $X'X$  обратима.

## 1.4 В методе LASSO минимизируется функция

$$Q(\hat{\beta}) = (y - X\hat{\beta})'(y - X\hat{\beta}) + \lambda \hat{\beta}'\hat{\beta},$$

где  $\lambda$  — положительный параметр, штрафующий функцию за слишком большие значения  $\hat{\beta}$ .

1. Найдите  $dQ(\hat{\beta})$  и  $d^2Q(\hat{\beta})$ ;
2. Выпишите условия первого порядка для задачи LASSO;
3. Выразите  $\hat{\beta}$ .

**1.5** Пусть  $A$  и  $B$  — матрицы одного размера.

1. Докажите, что сумму  $\sum_{ij} A_{ij}B_{ij}$  можно представить в виде  $\text{tr}(A'B)$ .
2. Докажите, что  $\text{tr}(A'B) = \text{tr}(AB') = \text{tr}(B'A) = \text{tr}(BA')$ .

**1.6** Выведите формулу для  $d \det X$ .

**1.7** Пусть  $x_i$  — вектор-столбец  $k \times 1$ ,  $y_i$  — скаляр, равный  $+1$  или  $-1$ ,  $\hat{\beta}$  — вектор-столбец размера  $k \times 1$ . Рассмотрим функцию

$$Q(\hat{\beta}) = \sum_{i=1}^n \ln(1 + \exp(-y_i x_i' \hat{\beta})) + \lambda \hat{\beta}' \hat{\beta}$$

1. Найдите  $dQ$ ;
2. Найдите вектор-столбец  $\text{grad } Q$ .

## 2 Линейная регрессия

**2.1** Рассмотрим задачу линейной регрессии

$$Q(w) = (y - Xw)^T (y - Xw) \rightarrow \min_w.$$

1. Найдите  $dQ(w)$  и  $d^2Q(w)$ .
2. Выведите формулу для оптимального  $w$ .
3. Выведите формулу для матрицы-шляпницы (hat-matrix), связывающей вектор фактических  $y$  и вектор прогнозов  $\hat{y} = H \cdot y$ .

**2.2** Рассмотрим задачу регрессии с одним признаком и без константы,  $\hat{y}_i = w \cdot x_i$ . Решите в явном виде задачи МНК со штрафом:

1.  $Q(w) = (y - \hat{y})^T (y - \hat{y}) + \lambda w^2$ ;
2.  $Q(w) = (y - \hat{y})^T (y - \hat{y}) + \lambda |w|$ ;

**2.3** Храбрая и торопливая исследовательница Мишель хочет решить задачу линейной регрессии по  $n$  наблюдениям с вектором  $y$  и матрицей признаков  $X$ . Сначала исследовательница Мишель так торопилась, что совсем забыла последнее наблюдение и оценила задачу с более коротким вектором  $y^-$  и матрицей  $X^-$ , где не хватает последней строки. Затем Мишель взяла правильную матрицу  $X$ , но неправильный вектор  $y^*$ , в котором она вместо фактического последнего наблюдения вектора  $y$  вписала его прогноз, полученный с помощью регрессии с  $y^{-1}$  и  $X^-$ .

1. Как связаны  $\hat{y}_n^-$  и  $\hat{y}_n^*$  (прогнозы для последнего наблюдения полученные по модели без последнего наблюдения и модели с неверным последним наблюдением)?
2. Как выглядит вектор, равный разнице  $y - y^*$ ?

3. Какие величины находятся в векторе  $H \cdot (y - y^*)$ ? Чему равна последняя,  $n$ -ая, компонента этого вектора? Выразите её через  $H_{nn}$  и ошибку прогноза последнего наблюдения по модели без последнего наблюдения,  $y_n - \hat{y}_n^-$ .
4. Как связаны между собой ошибка прогноза  $n$ -го наблюдения по полной модели, ошибка прогноза  $n$ -го наблюдения по модели без последнего наблюдения и  $H_{nn}$ ?
5. Как быстро провести кросс-валидацию с выкидыванием одного наблюдения для задачи линейной регрессии?

### 3 Линейные классификаторы

**3.1** Рассмотрим плоскость в  $\mathbb{R}^3$ , задаваемую уравнением  $5x_1 + 6x_2 - 7x_3 + 10 = 0$  и две точки,  $A = (2, 1, 4)$  и  $B = (4, 0, 4)$ .

1. Найдите любой вектор, перпендикулярный плоскости.
2. Правда ли, что отрезок  $AB$  пересекает плоскость?
3. Найдите длину отрезка  $AB$ ;
4. Не находя расстояние от точек до плоскости, определите, во сколько раз точка  $A$  дальше от плоскости, чем точка  $B$ ;
5. Найдите расстояние от точки  $A$  до плоскости.

**3.2** Рассмотрим простейший персептрон с константой, единственным входом  $x_1$  и пороговой функцией активации. Подберите веса так, чтобы персептрон реализовывал логическое отрицание (в ответ на 0 выдавал 1, и наоборот).

**3.3** Рассмотрим простейший персептрон с константой, двумя входами  $x_1, x_2$  и пороговой функцией активации.

Здесь ассистенты нарисуют в tikz картинку, достойную стоять вместо Джоконды в Лувре

1. Подберите веса так, чтобы персептрон реализовывал логическое ИЛИ (OR).
2. Подберите веса так, чтобы персептрон реализовывал логическое И (AND).
3. Докажите, что веса невозможно подобрать так, чтобы персептрон реализовывал исключающее логическое ИЛИ (XOR).
4. Добавьте персептрону вход  $x_3 = x_1 \cdot x_2$  и подберите веса так, чтобы персептрон реализовывал XOR.
5. Реализуйте XOR с помощью трёх персептронов с двумя входами и константой. Укажите веса и схему их взаимосвязей.

**3.4** В коробке завалялось три персептрона, у каждого два входа с константой и пороговая функция активации. Реализуйте с их помощью функцию

$$y = \begin{cases} 1, & \text{если } x_2 \geq |x_1 - 3| + 2; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

**3.5** Рассмотрим следующий набор данных:

$x_i$	$z_i$	$y_i$
-1	-1	0
1	-1	0
-1	1	0
1	1	0
0	2	1
2	0	1
0	-2	1
-2	0	1

1. Существует ли перспетрон с константой, двумя входами и пороговой функцией активации, способный идеально классифицировать  $y_i$  на данной выборке? А хватит ли двух таких персептронов? А может хватит трёх?
2. Введите такое преобразование исходных признаков  $h_i = h(x_i, z_i)$ , при котором с идеальной классификацией  $y_i$  справился бы даже персептрон с одним входом, константой и пороговой функцией активации.

**3.6** Бандерлог из Лога<sup>1</sup> ведёт блог, любит считать логарифмы и оценивать логистические регрессии. С помощью нового алгоритма Бандерлог решил задачу классификации по трём наблюдениям и получил  $b_i = \hat{\mathbb{P}}(y_i = 1|x_i)$ .

$y_i$	$b_i$
1	0.7
-1	0.2
-1	0.3

1. Постройте ROC-кривую.
2. Найдите площадь под ROC-кривой и индекс Джини.
3. Постройте PR-кривую (кривая точность-полнота).
4. Найдите площадь под PR-кривой.
5. Как по-английски будет «бревно»?

**3.7** Классификатор Бандерлога имеет вид

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{если } b_i > t; \\ -1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Докажите, что площадь под ROC-кривой равна вероятности того, случайно выбранный положительный объект окажется позже случайно выбранного отрицательного объекта, если объекты ранжированы по возрастанию величины  $b_i$ .

**3.8** Все средние издали выглядят одинаково, среднее  $= f^{-1}(0.5f(x_1) + 0.5f(x_2))$ . Например, у среднего арифметического  $f(t) = t$ , у среднего гармонического  $f(t) = 1/t$ .

1. Какая  $f$  используется для среднего геометрического?

Для измерения качества бинарной классификации Ара использует среднее арифметическое точности и полноты, Гена — среднее геометрическое, а Гарик — среднее гармоническое.

<sup>1</sup>деревня в Кадуйском районе Вологодской области

2. У кого будут выходить самые «качественные» и самые «некачественные» прогнозы?

**3.9** Бандерлог начинает все определения со слов «это доля правильных ответов»:

1. ассурасу — это доля правильных ответов...
2. точность (precision) — это доля правильных ответов...
3. полнота (recall) — это доля правильных ответов...
4. TPR — это доля правильных ответов...

Закончите определения Бандерлога так, чтобы они были, хм, правильными.

**3.10** Алгоритм бинарной классификации, придуманный Бандерлогом, выдаёт оценки вероятности  $b_i = \hat{\mathbb{P}}(y_i = 1|x_i)$ . Всего у Бандерлога 10000 наблюдений. Если ранжировать их по возрастанию  $b_i$ , то окажется что наблюдения с  $y_i = 1$  занимают ровно места с 5501 по 5600. Найдите площадь по ROC-кривой и площадь под PR-кривой.

**3.11** Бандерлог собрал выборку из 900 муравьёв и 100 китов. Переменная  $y_i$  равна 1 для китов. Бандерлог хочет, чтобы его алгоритм классификации выдавал для каждого наблюдения число  $b_i = f(x_i) \in [0; 1]$ , оценку вероятности того, что наблюдение является китом. В качестве признака Бандерлог использует количество глаз, не задумавшись о том, что оно равно двум и для муравьёв, и для китов.

Решите задачу минимизации эмпирической функции риска и найдите все  $b_i$  для функций потерь:

1.  $L(y_i, b_i) = (y_i - b_i)^2$ , если для муравьёв  $y_i = 0$ ;
2.  $L(y_i, b_i) = |y_i - b_i|$ , если для муравьёв  $y_i = 0$ ;
3.  $L(y_i, b_i) = \begin{cases} -\log b_i, & \text{если } y_i = 1 \\ -\log(1 - b_i), & \text{иначе.} \end{cases} ;$
4.  $L(y_i, b_i) = \begin{cases} 1/b_i, & \text{если } y_i = 1 \\ 1/(1 - b_i), & \text{иначе.} \end{cases} ;$

**3.12** Бандерлог утверждает, что открыл новую верхнюю границу для пороговой функции потерь,  $\tilde{L}(M_i) = 1 + \frac{1}{\pi} \cdot \arctan(-x_i)$ , где  $M_i = y_i \cdot \langle w, x_i \rangle$ . Прав ли бандерлог?

**3.13** Бандерлог из Лога оценил логистическую регрессию по четырём наблюдениям и одному признаку с константой, получил  $b_i = \hat{\mathbb{P}}(y_i = 1|x_i)$ , но потерял последнее наблюдение:

$y_i$	$b_i$
1	0.7
-1	0.2
-1	0.3
?	?

1. Выпишите функцию потерь для задачи логистической регрессии.
2. Выпишите условие первого порядка по коэффициенту перед константой.
3. Помогите бандерлогу восстановить пропущенные значения!

**3.14** У Бандерлога три наблюдения, первое наблюдение — кит, остальные — муравьи. Киты кодируются  $y_i = 1$ , муравьи —  $y_i = -1$ . На этот раз Бандерлог, чтобы быть уверенным, что  $x_i$  различаются, сам лично определил  $x_i = i$ . После этого Бандерлог оценивает логистическую регрессию с константой.

1. Выпишите эмпирическую функцию риска, которую минимизирует Бандерлог;
2. При каких оценках коэффициентов логистической регрессии эта функция достигает своего минимума?

**3.15** Рассмотрим целевую функцию логистической регрессии с константой

$$Q(w) = \frac{1}{\ell} \sum L(y_i, b_i),$$

где  $b_i = 1/(1 + \exp(-\langle w, x_i \rangle))$  и  $L(y_i, b_i) = \begin{cases} -\log b_i, & \text{если } y_i = 1 \\ -\log(1 - b_i), & \text{иначе.} \end{cases}$

1. Найдите  $dQ(w)$  и  $d^2Q(w)$ ;
2. Найдите  $dQ(0)$  и  $d^2Q(0)$ ;
3. Выпишите квадратичную аппроксимацию для  $Q(w)$  в окрестности  $w = 0$ ;
4. С какой задачей совпадает задача минимизации квадратичной аппроксимации?

**3.16** Винни-Пух знает, что мёд бывает правильный,  $honey_i = 1$ , и неправильный,  $honey_i = 0$ . Пчёлы также бывают правильные,  $bee_i = 1$ , и неправильные,  $bee_i = 0$ . По 100 своим попыткам добыть мёд Винни-Пух составил таблицу сопряженности:

	$honey_i = 1$	$honey_i = 0$
$bee_i = 1$	12	36
$bee_i = 0$	32	20

Винни-Пух использует логистическую регрессию с константой для прогнозирования правильности мёда с помощью правильности пчёл.

1. Какие оценки коэффициентов получит Винни-Пух?
2. Какой прогноз вероятности правильности мёда при встрече с неправильными пчёлами даёт логистическая модель? Как это число можно посчитать без рассчитывания коэффициентов?

**3.17** Винни-Пух оценил логистическую регрессию для прогнозирования правильности мёда от высоты дерева (м)  $x_i$  и удалённости от дома (км)  $z_i$ :  $\ln odds_i = 2 + 0.3x_i - 0.5z_i$ .

1. Оцените вероятность того, что  $y_i = 1$  для  $x = 15$ ,  $z = 3.5$ .
2. Оцените предельный эффект увеличения  $x$  на единицу на вероятность того, что  $y_i = 1$  для  $x = 15$ ,  $z = 3.5$ .
3. При каком значении  $x$  предельный эффект увеличения  $x$  на единицу в точке  $z = 3.5$  будет максимальным?

## 4 Матрицы

**4.1** Известна матрица  $X$ ,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix};$$

1. Найдите QR-разложение матрицы  $X'X$ ;
2. Найдите QR-разложение матрицы  $XX'$ ;
3. Найдите спектральное разложение матрицы  $X'X$ ;
4. Найдите спектральное разложение матрицы  $XX'$ ;
5. Найдите сингулярное разложение (SVD) матрицы  $X$ ;

**4.2** Объясните геометрический смысл QR, SVD и спектрального разложений.

**4.3** Бандрелог выполнил SVD-разложение матрицы регрессоров  $X$ . Помогите Бандерлогу поскорее найти формулу для матрицы-шляпницы  $H$ , которая проецирует  $y$  на пространство столбцов матрицы  $X$ ,  $\hat{y} = Hy$ .

**4.4** Бандрелог выполнил QR-разложение матрицы регрессоров  $X$ . Помогите Бандерлогу поскорее найти формулу для матрицы-шляпницы  $H$ , которая проецирует  $y$  на пространство столбцов матрицы  $X$ ,  $\hat{y} = Hy$ .

## 5 Метод опорных векторов

**5.1** На плоскости имеются точки двух цветов. Красные:  $(1, 1)$ ,  $(1, -1)$  и синие:  $(-1, 1)$ ,  $(-1, -1)$ .

1. Найдите разделяющую гиперплоскость методом опорных векторов при разных  $C$ .
2. Укажите опорные вектора.

**5.2** На плоскости имеются точки двух цветов. Красные:  $(1, 1)$ ,  $(1, -1)$  и синие:  $(-1, 1)$ ,  $(-1, -1)$  и  $(2, 0)$ .

1. Найдите разделяющую гиперплоскость методом опорных векторов при разных  $C$ .
2. Укажите опорные вектора.

**5.3** Эконометресса Авдотья решила использовать метод опорных векторов с гауссовским ядром с параметром  $\sigma = 1$  и штрафным коэффициентом  $C = 1$ . Соответственно, она минимизировала целевую функцию

$$\frac{w'w}{2} + C \sum_{i=1}^n \xi_i,$$

где разделяющая плоскость задаётся  $w'x - w_0 = 0$ , а  $\xi_i$  — размеры «заступа» за разделяющую полосу.

Затем Авдотья подумала, что неплохо бы выбрать наилучшие  $C$  и  $\sigma$ . Ей лень было использовать кросс-валидацию, поэтому Авдотья минимизировала данную функцию по  $C \geq 0$  и  $\sigma \geq 0$ . Какие значения она получила?

**5.4** Задан вектор  $w = (2, 3)$  и число  $w_0 = 7$ .

1. Нарисуйте прямые  $\langle w, x \rangle = w_0$ ,  $\langle w, x \rangle = w_0 + 1$ ,  $\langle w, x \rangle = w_0 - 1$ .
2. Найдите ширину полосы между  $\langle w, x \rangle = w_0 + 1$  и  $\langle w, x \rangle = w_0 - 1$ .
3. Найдите расстояние от точки  $(5, 6)$  до прямой  $\langle w, x \rangle = w_0 - 1$ .

**5.5** Заданы две прямые,  $l_0: x^{(1)} + 3x^{(2)} = 9$  и  $l_1: x^{(1)} + 3x^{(2)} = 13$ . Найдите подходящий вектор  $w$  и число  $w_0$  так, чтобы прямая  $l_0$  записывалась как  $\langle w, x \rangle = w_0 - 1$ , а прямая  $l_1$  как  $\langle w, x \rangle = w_0 + 1$ .

**5.6** Даны наблюдения

$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$y$
1	0	0
2	0	0
0	3	1
0	4	1

1. Нарисуйте разделяющую полосу наибольшей ширины.
2. Решите задачу оптимизации


$$\min_{w, w_0} \frac{1}{2} \langle w, w \rangle$$

при ограничении: для  $y_i = 1$  выполнено условие  $\langle w, x \rangle \geq w_0 + 1$ , а для  $y_i = 0$  выполнено условие  $\langle w, x \rangle \leq w_0 - 1$ .

3. Для точки  $x = (x^{(1)}, x^{(2)}) = (1, 1)$  найдите значение  $\langle w, x \rangle - w_0$  и постройте прогноз  $\hat{y}$ .

**5.7** По картинке качественно решите задачу разделения точек:





Целевая функция имеет вид:

$$\min_{w, w_0} \frac{1}{2} w' w + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

Уравнение разделяющей поверхности —  $w'x = w_0$ , уравнения краёв полосы:  $w'x = w_0 + 1$  и  $w'x = w_0 - 1$ . Нарушителями считаются наблюдения, которые попали на нейтральную полосу или на чужую территорию. Здесь  $\xi_i = |w| \cdot d_i$ , где  $d_i$  — длина «заступ» наблюдения за черту «своих».

1. Как пройдёт разделяющая полоса при  $C = 1$ ? Найдите  $w$ ,  $w_0$ , и величины штрафов  $\xi_i$ .
2. Как пройдёт разделяющая полоса при  $C = +\infty$ ? Найдите  $w$ ,  $w_0$ , и величины штрафов  $\xi_i$ .

## 5.8 юююю

## 6 Ядра к бою!

**6.1** Ядерная функция, скалярное произведение в расширяющем пространстве, имеет вид  $K(a, b) = \exp(-|a - b|^2)$ .

Имеются вектора  $a = (1, 1, 1)$  и  $b = (1, 2, 0)$ .

Найдите длину векторов и косинус угла между ними в исходном и расширяющем пространстве.

**6.2** Рассмотрим два вектора,  $v_1 = (1, 1, 2)$  и  $v_2 = (1, 1, 1)$ . Переход в спрямляющее пространство осуществляется с помощью гауссовской ядерной функции с параметром  $\gamma$ ,  $k(v, v') = \exp(-\gamma|v - v'|^2)$ .

1. Как от  $\gamma$  зависят длины векторов в спрямляющем пространстве?
2. Как от  $\gamma$  зависит угол между векторами в спрямляющем пространстве?

**6.3** Имеются три наблюдения  $A$ ,  $B$  и  $C$ :

	$x$	$y$
$A$	1	-2
$B$	2	1
$C$	3	0

1. Найдите расстояние  $AB$  и косинус угла  $ABC$ .
2. Найдите расстояние  $AB$  и косинус угла  $ABC$  в расширенном пространстве с помощью гауссовского ядра с  $K(x, x') = \exp(-|x - x'|^2)$ .
3. Найдите расстояние  $AB$  и косинус угла  $ABC$  в расширенном пространстве с помощью полиномиального ядра второй степени.

**6.4** Переход из двумерного пространства в расширяющее задан функцией

$$f : (x_1, x_2) \rightarrow (1, x_1, x_2, 3x_1x_2, 2x_1^2, 4x_2^2).$$

Найдите соответствующую ядерную функцию.

**6.5** Ядерная функция имеет вид

$$K(x, y) = x_1^2 y_1^2 + x_2^2 y_2^2 + 2x_1 x_2 y_1 y_2.$$

Как может выглядеть функция  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  переводящие исходные векторы в расширенное пространство?

**6.6** Является ли функция  $K(x, z)$  ядром?

1.  $K(x, z) = \begin{cases} 1, & \text{if } x = z; \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} ;$
2.  $K(x, z) = \begin{cases} 0, & \text{if } x = z; \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} ;$
3.  $K(x, z) = \sin(x^T z);$
4.  $K(x, z) = \cos(x^T x) \sin(z^T z);$

**6.7** Пусть  $x$  и  $z$  — строки символов, возможно разной длины. Рассмотрим две функции. Функция  $K_1(x, z)$  равна единице, если строки  $x$  и  $z$  совпадают. Функция  $K_2(x, z)$  — число совпадающих подстрок. Функция  $K_3$  — произведение количеств букв «а» в обеих словах.

1. Найдите  $K_1(\text{«мама»}, \text{«ам»})$  и  $K_2(\text{«мама»}, \text{«ам»})$ ,  $K_3(\text{«мама»}, \text{«ам»})$
2. Является ли функция  $K_1$  ядром?
3. Является ли функция  $K_2$  ядром?
4. Является ли функция  $K_3$  ядром?

**6.8** На прямой аллее растёт три дуба. Находятся в точках с координатами  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 2$  и  $x_3 = -3$ . Исследователь Винни-Пух проверил и выяснил, что на втором Дубе водятся правильные пчёлы, а на остальных — неправильные.

1. Являются ли пчёлы линейно разделимыми в пространстве исходной аллеи?
2. Помогите Винни-Пуху выписать прямую задачу метода опорных векторов в пространстве исходной аллеи;
3. Помогите Винни-Пуху выписать двойственную задачу метода опорных векторов в пространстве исходной аллеи;
4. Помогите Винни-Пуху выписать двойственную задачу метода опорных векторов в бесконечномерном пространстве с ядерной функцией  $K(x, z) = \exp(-(x - z)^2)$ ; Являются ли точки в нём линейно разделимыми?
5. Помогите Винни-Пуху выписать прямую и двойственную задачу метода опорных векторов в спрямляющем пространстве с ядерной функцией  $K(x, z) = (xz + 1)^2$ ; Являются ли точки в нём линейно разделимыми?

## 7 Двойственные задачи

- 7.1** Выпишите двойственную задачу для минимизации  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$  при ограничении  $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10$ .
- 7.2** Выпишите двойственную задачу для  $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \max$  при ограничениях  $x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$ ,  $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$ , все  $x_i \geq 0$ .
- 7.3** Выпишите двойственную задачу для максимизации  $1/x_1 + 2/x_2$  при ограничении  $2x_1 + 3x_2 = 10$  и  $x_1 \in [1; 10]$ ,  $x_2 \in [2; 6]$ .
- 7.4** Выпишите двойственную задачу для минимизации  $f(x) = \frac{1}{2}x'Hx + g'x$  при ограничении  $A'x = b$ .

- 7.5** Выпишите двойственную задачу для минимизации  $f(x) = \frac{1}{2}x'Hx + g'x$  при ограничении  $A'x \leq b$ .
- 7.6** Выпишите прямую и двойственную задачу для метода опорных векторов в исходном пространстве.
- 7.7** Выпишите прямую и двойственную задачу для метода опорных векторов в спрямляющем пространстве с использованием ядра  $K(.,.)$ .

## 8 Метод главных компонент

- 8.1** Найдите прямую, у которой сумма квадратов расстояний до точек  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(2, 1)$  будет минимальной. Чему равна при этом доля объяснённого разброса точек?
- 8.2** Есть две переменных,  $x = (1, 0, 0, 3)'$ ,  $z = (3, 2, 0, 3)'$ . Найдите первую и вторую главные компоненты.
- 8.3** Известна матрица выборочных ковариаций трёх переменных. Для удобства будем считать, что переменные уже центрированы.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

1. Выразите первую и вторую главные компоненты через три исходных переменных.
  2. Выразите первую и вторую главные компоненты, через три исходных переменных, если перед методом главных компонент переменные необходимо стандартизировать.
- 8.4** Пионеры, Крокодил Гена и Чебурашка собирали металлолом несколько дней подряд. В распоряжение иностранной шпионки, гражданки Шапокляк, попали ежедневные данные по количеству собранного металлолома: вектор  $g$  — для Крокодила Гены, вектор  $h$  — для Чебурашки и вектор  $x$  — для Пионеров. Гена и Чебурашка собирали вместе, поэтому выборочная корреляция  $\text{sCorr}(g, h) = -0.9$ . Гена и Чебурашка собирали независимо от Пионеров, поэтому выборочные корреляции  $\text{sCorr}(g, x) = 0$ ,  $\text{sCorr}(h, x) = 0$ . Если регрессоры  $g$ ,  $h$  и  $x$  центрировать и нормировать, то получится матрица  $\tilde{X}$ .
1. Найдите параметр обусловленности матрицы  $(\tilde{X}'\tilde{X})$ .
  2. Вычислите одну или две главные компоненты (выразите их через вектор-столбцы матрицы  $\tilde{X}$ ), объясняющие не менее 70% общей выборочной дисперсии регрессоров.
  3. Шпионка Шапокляк пытается смоделировать ежедневный выпуск танков,  $y$ . Выразите оценки коэффициентов регрессии  $y = \beta_1 + \beta_2g + \beta_3h + \beta_4x + \varepsilon$  через оценки коэффициентов регрессии на главные компоненты, объясняющие не менее 70% общей выборочной дисперсии.

## 9 На природу! В лес! К деревьям!

**9.1** Для случайных величин  $X$  и  $Y$  найдите индекс Джини и энтропию

$x$	0	1	$y$	0	1	5
$\mathbb{P}(X = x)$	0.2	0.8	$\mathbb{P}(Y = y)$	0.2	0.3	0.5

**9.2** Найдите энтропию  $X$ , спутанность (perplexity)  $X$ , индекс Джини  $X$ , если

1. величина  $X$  равновероятно принимает значения 1, 7 и 9;
2. величина  $X$  равновероятно принимает  $k \geq 2$  значений;
3. величина  $X$  равномерно распределена на отрезке  $[0; a]$ ;
4. величина  $X$  нормальна  $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ ;

**9.3** У Васи была дискретная случайная величина  $X$ , принимавшая натуральные значения. Вася решил изменить закон распределения величины  $X$ . Он увеличил количество возможных значений величины  $X$  в два раза, разделив каждое событие  $X = k$  на два равновероятных подсобытия:  $X = k - 0.1$  и  $X = k + 0.1$ . Как при этом изменились энтропия, спутанность (perplexity) и индекс Джини?

**9.4** Случайная величина  $X$  принимает значение 1 с вероятностью  $p$  и значение 0 с вероятностью  $1 - p$ .

1. Постройте график зависимости индекса Джини и энтропии от  $p$ .
2. Являются ли функции монотонными? выпуклыми?
3. При каком  $p$  энтропия и индекс Джини будут максимальны?

**9.5** Шаман Ыуыуыуыыыы по прошлым наблюдениям знает, большая охота на мамонта оказывается удачной с вероятностью 0.3. Если племя ждёт от Ыуыуыуыыыы прогноз охоты, то Ыуыуыуыыыы поплясав вокруг костра (10 минут) и постуча бубном (16 раз) прогнозирует удачную охоту с вероятностью 0.3 и неудачную с вероятностью 0.7. Конкурирующий шаман Уыуыууууууу всегда прогнозирует неудачную охоту, как более вероятную. Когда шаман даёт неверный прогноз, его бьют палками.

1. Какова вероятность того, что Ыуыуыуыыыы ошибётся?
2. Кто чаще бывает бит палками, Ыуыуыуыыыы или Уыуыууууууу?
3. Чему равен индекс Джини для случайной величины равной удаче с вероятностью 0.3 и неудаче с вероятностью 0.7?

**9.6** Шаман Ыуыуыуыыыы заметил по прошлым данным, что в дождливые дни большая охота на мамонта удачна с вероятностью 0.7, а в сухие — с вероятностью 0.1. Поэтому в дождливый день Ыуыуыуыыыы предскажет удачу с вероятностью 0.7, а в сухой — с вероятностью 0.1. Дождливых дней — 20%.

1. Какова вероятность того, что Ыуыуыуыыыы ошибётся?
2. Чему равен индекс Джини выборки разделённой на две части: в части А шесть бананов и 14 апельсинов, а в части В — восемь бананов и 72 апельсина?

- 9.7** Постройте регрессионное дерево для прогнозирования  $y$  с помощью  $x$  на обучающей выборке:

$x_i$	0	1	2	3
$y_i$	5	6	4	100

Критерий деления узла на два — минимизация  $RSS$ . Дерево строится до трёх терминальных узлов.

- 9.8** Постройте регрессионное дерево для прогнозирования  $y$  с помощью  $x$  на обучающей выборке:

$y_i$	$x_i$
100	1
102	2
103	3
50	4
55	5
61	6
70	7

Критерий деления узла на два — минимизация  $RSS$ . Узлы делятся до тех пор, пока в узле остаётся больше двух наблюдений.

- 9.9** Дон-Жуан предпочитает брюнеток. Перед Новым Годом он посчитал, что в записной книжке у него 20 блондинок, 40 брюнеток, две рыжих и восемь шатенок. С Нового Года Дон-Жуан решил перенести все сведения в две записные книжки, в одну — брюнеток, во вторую — остальных.


Как изменились индекс Джини и энтропия в результате такого разбиения?

- 9.10** Машка пять дней подряд гадала на ромашке, а затем выкладывала очередную фотку «Машка с ромашкой» в инстаграмчик. Результат гадания — переменная  $y_i$ , количество лайков у фотки — переменная  $x_i$ . Постройте классификационное дерево для прогнозирования  $y_i$  с помощью  $x_i$  на обучающей выборке:

$y_i$	$x_i$
плюнет	10
поцелует	11
поцелует	12
к сердцу прижмёт	13
к сердцу прижмёт	14

Дерево строится до идеальной классификации. Критерий деления узла на два — максимальное падение индекса Джини.

- 9.11** По данной диаграмме рассеяния постройте классификационное дерево для зависимой переменной  $y$ :



Дерево необходимо построить до идеальной классификации, в качестве критерия деления узла на два используйте минимизацию индекса Джини.

**9.12** Рассмотрим обучающую выборку для прогнозирования  $y$  с помощью  $x$  и  $z$ :

$y_i$	$x_i$	$z_i$
$y_1$	1	2
$y_2$	1	2
$y_3$	2	2
$y_4$	2	1
$y_5$	2	1
$y_6$	2	1
$y_7$	2	1

Будем называть деревья разными, если они выдают разные прогнозы на обучающей выборке. Сколько существует разных классификационных деревьев для данного набора данных?

**9.13** Исследовательница Мишель строит классификационное дерево для бинарной переменной  $y_i$ . Может ли при разбиении узла на два расти индекс Джини? Энтропия?


**9.14** Приведите примеры наборов данных, для которых индекс Джини равен 0, 0.5 и 0.999.

**9.15** Рассмотрим задачу построения классификационного дерева для бинарной переменной  $y_i$ . Приведите пример такого набора данных, что никакое разбиения стартового узла на два не снижает индекс Джини, однако двух разбиений достаточно, чтобы снизить индекс Джини до нуля.

**9.16** Пятачок собрал данные о визитах Винни-Пуха в гости к Кролику. Здесь  $x_i$  — количество съеденного мёда в горшках, а  $y_i$  — бинарная переменная, отражающая застревание Винни-Пуха при выходе.

Для построения предиктивной модели Пятачок собирается использовать дерево с заданной структурой:

$y_i$	$x_i$
0	1
1	4
1	2
0	3
1	3
0	1



Пятачок использует квадратичную аппроксимацию для логистической функции потерь:

$$Obj(w) = \sum_{i=1}^n \left( loss(y_i, 0) + loss'_w(y_i, 0)(w_i - 0) + \frac{1}{2} loss''_{ww}(y_i, 0)(w_i - 0)^2 \right) + \frac{1}{2} \lambda |w|^2.$$

Помогите Очень Маленькому Существу подобрать оптимальные веса  $(w_i)$  при  $\lambda = 1$ .

**9.17** Нарисовано дерево: деление 1, справа от первого деления — деление 2. Веса равны  $w_L$ ,  $w_{RL}$ ,  $w_{LL}$ . Дана выборка.

1. Выпишите в явном виде функцию правдоподобия и логистическую функцию потерь.
2. Оцените  $w$  методом максимального правдоподобия.
3. Тут другую функцию потерь написать!
4. Разложите функцию потерь в окрестности  $w = (0, 0, 1)$  в ряд Тейлора до второго члена и примерно оцените  $w$ .

## 10 Бэггинг

**10.1** У Винни-Пуха есть 100 песенок (кричалок, вопелок, пыхтелок и сопелок). Каждый день он выбирает и поёт одну из них равновероятно наугад. Одну и ту же песенку он может петь несколько раз. Сколько в среднем песенок оказываются неспетыми за 100 дней?

**10.2** Вася поймал 3 рыбки, весом в 300, 600 и 1200 граммов. И посчитал среднее арифметическое,  $\bar{x} = 700$ .

1. Найдите закон распределение бутстрэп статистики для  $\bar{x}$ .
2. Найдите математическое ожидание и дисперсию бутстрэп статистики.

## 11 Решения

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.



**2.3.**

$$y_n - \hat{y}_n = (1 - H_{nn})(y_n - \hat{y}_n^-)$$

**3.1.**  $(5, 6, -7)$

**3.2.**

**3.3.**

**3.4.**

**3.5.**

**3.6.**

**3.7.**

**3.8.**

**3.9.**

**3.10.**

**3.11.**

**3.12.** Нет. Не выполнено  $\tilde{L} \geq L$  для всех  $M \in \mathbb{R}$ .

**3.13.**

**3.14.**

**3.15.**

**3.16.**

**3.17.** Предельный эффект максимален при максимальной производной  $\Lambda'(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x + \hat{\beta}_3 z)$ , то есть при  $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x + \hat{\beta}_3 z = 0$ .

**4.1.**

**4.2.**

**4.3.**

**4.4.**

**5.1.**

**5.2.**

**5.3.**  $C = 0$  и  $\sigma = +\infty$

**5.4.**

**5.5.**

**5.6.**

**5.7.**

**5.8.**

**6.1.** В исходном пространстве:  $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ ,  $|\vec{b}| = \sqrt{5}$ ,  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \sqrt{0.6}$ .

В расширяющем пространстве:  $|h(\vec{a})| = 1$ ,  $|h(\vec{b})| = 1$ ,  $\cos(h(\vec{a}), h(\vec{b})) = e^{-2}$ .

**6.2.** Длина равна 1 и не зависит от  $\gamma$ . При  $\gamma \approx 0$  вектора примерно совпадают, при больших  $\gamma$  вектора примерно ортогональны.

**6.3.**

**6.4.**

**6.5.**  $f(x_1, x_2) = (x_1^2, x_2^2, \sqrt{2}x_1x_2)$

**6.6.**

**6.7.**

**6.8.**

**7.1.**

**7.2.**

**7.3.**

**7.4.**

**7.5.**

**7.6.**

**7.7.**

**8.1.**

**8.2.**

**8.3.**

**8.4.**

9.1.

9.2. Если величина  $X$  равновероятно принимает  $k$  значений, то спутанность равна  $k$ . У равномерной на  $[0; a]$  спутанность равна  $a$ .

9.3.

9.4.  $I = 2p(1 - p)$ , энтропия и индекс Джини максимальны при  $p = 0.5$ .

9.5.

$$I = 2 \cdot 0.7 \cdot 0.3$$

9.6.

$$I = 0.2I_L + 0.8I_R$$

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11. Сначала делим по  $z$ , потом по  $x$ , так как индекс Джини в таком порядке падает сильнее.

9.12.

9.13. Нет, в силу выпуклости функций.

9.14. Все  $y_i$  одинаковые; поровну  $y_i$  двух типов; 1000 разных типов  $y_i$ , по одному наблюдению каждого типа.

	$y_i$	$x_i$	$z_i$
	1	1	1
9.15.	1	2	2
	0	1	2
	0	2	1

9.16.

9.17.

10.1.  $100 \cdot \left(\frac{99}{100}\right)^{100} \approx 100/e \approx 37$

10.2.

## 12 Источники мудрости