Lab 08: Modelos mixtos y efectos aleatorios

Diseño de estudios, dependencia y estructura de agrupamiento

Introducción

En esta actividad, analizaremos diseños ecológicos para decidir cuándo una estructura de agrupamiento puede requerir efectos aleatorios. En cada caso, consideren qué observaciones comparten condiciones, cuál es la unidad experimental o de muestreo y qué efecto se desea estimar.

Un efecto aleatorio cumple dos funciones que conviene distinguir. Cuando la cantidad a estimar compara **entre** grupos (por ejemplo, un predictor medido a nivel de sitio), el efecto aleatorio evita tratar las observaciones de un mismo grupo como réplicas independientes (pseudorreplicación). Cuando la cantidad a estimar compara **dentro** de los grupos (por ejemplo, tratamiento y control dentro de cada bloque), el efecto aleatorio separa la variación entre grupos del error residual y aumenta la precisión de la comparación.

i Actividad: estaciones de aprendizaje

- **Grupos de hasta 4 personas.** Cada grupo recibe esta introducción, la tabla de referencia y la hoja de trabajo.
- **Estaciones:** cada uno de los cuatro casos está impreso en dos estaciones alrededor del aula (ocho estaciones en total). Dos grupos pueden trabajar el mismo caso al mismo tiempo en estaciones distintas.
- **Rotación [5–6 minutos por estación]:** en cada estación, lean el caso, discutan las preguntas de "Conversen" y completen la fila correspondiente de la tabla. Al terminar, roten a una estación con un caso que no hayan visto.
- **Cierre en grupo [10 minutos]:** con los cuatro casos completos, respondan las tres preguntas de discusión de la hoja de trabajo.
- **Puesta en común [10–15 minutos]:** cada grupo presenta un caso; los demás comparan con sus respuestas.
- **Bitácora (individual):** la última página presenta un caso nuevo. Resuélvanlo individualmente en la bitácora aplicando lo discutido; esa es la entrada calificada.

i Sintaxis de efectos aleatorios en R

Los efectos aleatorios se escriben entre paréntesis dentro de la fórmula. A la izquierda de `|` va lo que varía entre grupos; a la derecha, la variable de agrupamiento. El `1` representa el intercepto.

- `y ~ x + (1 | grupo)` — **intercepto aleatorio**: cada nivel de `grupo` tiene su propio intercepto (su propia línea base). La pendiente de `x` es la misma para todos los grupos.
- `y ~ x + (1 + x | grupo)` — **intercepto y pendiente aleatorios**: cada grupo tiene su propio intercepto y su propia pendiente de `x`.
- `y ~ x + (1 | a/b)` — **agrupamiento anidado**: `b` está dentro de `a`. Equivale a `(1 | a) + (1 | a:b)`: un intercepto por cada nivel de `a` y otro por cada `b` dentro de cada `a`. El orden importa: `a/b` no es lo mismo que `b/a`.

! Paquetes necesarios

Los modelos con efectos aleatorios (modelos mixtos) no se ajustan con `lm()` ni `glm()`. Se necesitan paquetes como `lme4` (funciones `lmer()` y `glmer()`) o `glmmTMB` (función `glmmTMB()`), que ya usamos para datos de conteo. Ambos aceptan la misma sintaxis de efectos aleatorios.

Referencia: efectos fijos y efectos aleatorios

Característica	Efectos fijos	Efectos aleatorios
Selección de grupos	Los grupos específicos son de interés directo (por ejemplo, comparar tratamiento y control, o machos y hembras).	Los grupos son una muestra aleatoria de una población más amplia (por ejemplo, 20 ranas de una población de miles).
Objetivo	Estimar el tamaño del efecto para cada grupo específico.	Estimar y controlar la variación entre grupos.
Tamaño de muestra	Puede funcionar con pocos grupos, pero requiere suficientes datos dentro de cada grupo.	Requiere un mayor número de grupos (por lo general, entre 5 y 10 o más) para estimar la varianza con precisión.
Interpretación	Se enfoca en los niveles específicos del factor incluidos en el modelo.	Se enfoca en la variabilidad entre los niveles del factor, más que en cada nivel específico.
Predictor medido a nivel de grupo	No es posible: el factor fijo de grupo es colineal con el predictor y el efecto de este no se puede estimar.	Permite estimar el efecto del predictor y, a la vez, representar la dependencia entre observaciones del mismo grupo.


Caso 1. Muestreo anidado

Un equipo de investigación selecciona 12 sitios de bosque de una región. En cada sitio selecciona cuatro parcelas. Dentro de cada parcela asigna al azar la mitad de las plántulas a un tratamiento de adición de nutrientes y la otra mitad a un control. Mide la altura de cada plántula al inicio y al final de la estación de crecimiento; el crecimiento de cada plántula es la diferencia entre ambas medidas, un solo valor por plántula.

Predicción: La adición de nutrientes aumenta el crecimiento de las plántulas.

Cantidad a estimar: La diferencia promedio en crecimiento entre plántulas tratadas y controles en la población de sitios y parcelas representada por la muestra.

Conversen: ¿Qué plántulas comparten condiciones? ¿En qué niveles se asignó el tratamiento y se midió la respuesta?




Caso 2. Medidas repetidas

Un equipo asigna al azar 30 plántulas individuales a adición de nutrientes o control (15 por tratamiento). Mide la altura de cada plántula una vez por semana durante ocho semanas. La tasa de crecimiento de una plántula es la pendiente de su altura en función de la semana.

Predicción: La adición de nutrientes aumenta la tasa de crecimiento en altura.

Cantidad a estimar: La diferencia entre tratamientos en la tasa promedio de crecimiento, expresada en centímetros por semana.

Conversen: ¿Qué observaciones provienen del mismo individuo? ¿Podrían las plántulas diferir en su altura inicial o en su tasa de crecimiento? ¿Qué término del modelo evaluaría la diferencia en tasa entre tratamientos?




Caso 3. Diseño en bloques

Un equipo establece 10 bloques a lo largo de un gradiente de humedad del suelo. Cada bloque contiene dos parcelas experimentales. Asigna al azar una parcela de cada bloque a la adición de nutrientes y la otra al control. Mide el crecimiento promedio de las plántulas en cada parcela.

Predicción: La adición de nutrientes aumenta el crecimiento, luego de tomar en cuenta las diferencias de base entre bloques (humedad del suelo y otras condiciones locales).

Cantidad a estimar: La diferencia promedio entre las parcelas tratadas y controles dentro de bloques comparables.

Conversen: ¿Por qué comparar parcelas dentro del mismo bloque? ¿Qué observaciones comparten condiciones de humedad?




Caso 4. Predictor medido a nivel de sitio

Un equipo mide el crecimiento de 120 plantas distribuidas entre 12 sitios de bosque. Mide la cobertura del dosel una vez por sitio, por lo que todas las plantas de un sitio tienen el mismo valor de cobertura. Las plantas de un sitio también comparten suelo, clima y otras condiciones locales. Mide la altura de cada planta al inicio y al final de la estación de crecimiento. Para cada planta, calcula un solo valor de crecimiento como la diferencia entre ambas mediciones.

Predicción: El crecimiento de las plantas cambia con la cobertura del dosel.

Cantidad a estimar: La pendiente que relaciona la cobertura del dosel con el crecimiento promedio de las plantas entre los sitios de bosque de la región.

Conversen: ¿A qué nivel varía la cobertura del dosel? ¿La información independiente para estimar su relación con el crecimiento proviene principalmente de las 120 plantas o de los 12 sitios? ¿Qué agrupamiento debería representar el modelo?



Hoja de trabajo grupal

Análisis de los casos

Para cada caso, identifiquen la unidad experimental o de muestreo, indiquen qué observaciones podrían ser dependientes y propongan las variables de agrupamiento que incluirían como efectos aleatorios, si corresponde. Justifiquen su decisión en relación con la predicción.

Caso	**Unidad experimental o de muestreo**	**¿Qué observaciones comparten condiciones o individuo?**	**Efecto(s) aleatorio(s) propuesto(s) y justificación**
1. Muestreo anidado			
2. Medidas repetidas			
3. Diseño en bloques			
4. Predictor a nivel de sitio			

Preguntas de discusión

1. En diseños anidados, ¿cuáles observaciones comparten condiciones ambientales o corresponden al mismo individuo? ¿Cuál(es) variable(s) de agrupamiento representan esas fuentes de dependencia?

2. En el caso de medidas repetidas, ¿cuál término del modelo permite evaluar si el tratamiento cambia la tasa de crecimiento?

3. En cada caso, ¿la cantidad a estimar compara observaciones *dentro* de los grupos o *entre* grupos? Si se omitiera el agrupamiento, ¿la incertidumbre del efecto estimado sería demasiado grande o demasiado pequeña? ¿Por qué?

Entrada de bitácora (individual)


Apliquen lo discutido en la actividad a un diseño nuevo. Respondan en su bitácora, de forma individual.

Caso para la bitácora. Efectos de lote

Un equipo cultiva plántulas en macetas individuales y asigna al azar los tratamientos de nutrientes (adición o control) a cada maceta. Debido a limitaciones de espacio, debe realizar el experimento en seis lotes sucesivos en el mismo invernadero. Cada lote incluye 20 macetas, 10 por tratamiento, asignadas al azar a posiciones del invernadero. Las condiciones de temperatura y luz podrían variar un poco entre lotes. Mide la altura de cada plántula al inicio y al final de su lote; el crecimiento es la diferencia entre ambas medidas.

Predicción: La adición de nutrientes aumenta el crecimiento, a pesar de la variación en las condiciones entre lotes.

Cantidad a estimar: El efecto promedio del tratamiento entre los lotes representados por el experimento.



Preguntas:

1. ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Qué observaciones comparten condiciones?
2. ¿Qué variable(s) incluiría como efecto aleatorio y por qué? Escriba el modelo con la sintaxis de R de la página 1.
3. ¿A cuál de los cuatro casos de la actividad se parece más este diseño? ¿En qué se diferencia?
4. ¿El tratamiento se compara *dentro* o *entre* lotes? Si se omitiera el lote del modelo, ¿la incertidumbre del efecto del tratamiento sería demasiado grande o demasiado pequeña? ¿Por qué es importante que cada lote incluya ambos tratamientos?