Coopertest verstehen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Der Coopertest

Der Coopertest wurde von dem amerikanischen Arzt Kenneth Cooper entwickelt. Man läuft **12 Minuten** so weit wie möglich. Die Strecke zeigt, wie gut die Ausdauer ist. Gehen ist erlaubt, Stehenbleiben bringt aber nichts.

B Strecke und Tempo berechnen

Auf einer 400-m-Bahn zählt man die Runden und schätzt den letzten Teil ab. Aus der Strecke lässt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnen:

Beispiel: 6 Runden und 200 m = 2400 m + 200 m = 2600 m in 12 Minuten.
In 60 Minuten wären das 5 · 2600 m = 13 000 m. Die Geschwindigkeit ist also **13 km/h**.
Für eine Runde braucht man im Schnitt 12 min : 6,5 Runden ≈ 1 min 51 s.

C Die richtige Taktik

Am meisten schafft, wer **gleichmäßig** läuft. Wer schnell startet, bildet in den Muskeln viel Laktat, wird sauer und muss später deutlich langsamer werden. Gute Läufer teilen sich die 12 Minuten ein: Sie nehmen sich eine Rundenzeit vor und kontrollieren sie an jeder Runde. Erst in der letzten Minute wird gesteigert.

Ziel	Rundenzeit (400 m)
2000 m	2:24 min
2400 m	2:00 min
2800 m	1:43 min
3200 m	1:30 min

D Wie geht es besser?

Wer seine Leistung verbessern will, sollte über mehrere Wochen zwei- bis dreimal pro Woche locker laufen, zum Beispiel 20 bis 30 Minuten im Bereich der Grundlagenausdauer. Kurz vor dem Test bringt Training nichts mehr.

E Kopfsache

Laufen über 12 Minuten ist auch Kopfsache. Viele teilen sich den Lauf in Abschnitte ein („noch drei Runden“), konzentrieren sich auf ihren Atemrhythmus oder sagen sich innerlich Mut zu. Wer nur an die Erschöpfung denkt, wird schneller langsamer.

Das Wichtigste

- 12 Minuten so weit wie möglich laufen.
- Gleichmäßiges Tempo bringt die beste Strecke.
- Verbessern durch lockeres Laufen über mehrere Wochen.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Rechne die gelaufene Strecke aus (Runde = 400 m).

5 Runden + 100 m	6 Runden + 300 m	7 Runden	4 Runden + 350 m
2100 m	2700 m	2800 m	1950 m

◐ **2** Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h wie im Beispiel.

2000 m in 12 min	2400 m in 12 min	3000 m in 12 min
10 km/h	12 km/h	15 km/h

◐ **3** Ein Schüler will 2400 m schaffen. Seine Rundenzeiten: 1:40, 1:50, 2:05, 2:20, 2:30 … Was macht er falsch? Gib einen Rat.

Er startet viel zu schnell (1:40 statt 2:00) und wird immer langsamer. Rat: von Anfang an gleichmäßig 2:00 pro Runde laufen und erst am Ende steigern.

● **4** Plane für dich ein Training über vier Wochen, um beim nächsten Coopertest weiter zu kommen.

Woche 1 und 2: zweimal 20 min locker laufen. Woche 3: zweimal 25 min, einmal 4 Runden in Wunschtempo. Woche 4: zweimal 30 min locker, zwei Tage vor dem Test Pause.

◐ **5** Welche Rundenzeit brauchst du im Schnitt für 2600 m? Und für 3000 m?

2600 m = 6,5 Runden: 12 min : 6,5 ≈ 1:51 min. 3000 m = 7,5 Runden: 12 min : 7,5 = 1,6 min = 1:36 min.

◐ **6** Welche Tricks helfen dir, wenn es beim Laufen schwer wird? Nenne drei und erkläre, warum sie helfen.

In Abschnitte einteilen, dann wirkt die Strecke kürzer. Auf den Atem achten, das beruhigt. Sich Mut zusprechen, das lenkt ab.

◐ **7** Warum wird man nach einem zu schnellen Start später so viel langsamer? Erkläre.

Beim schnellen Start entsteht viel Laktat, die Muskeln werden sauer und schwer. Danach muss man das Tempo stark senken.

● **8** Wie lief dein letzter Coopertest? Beschreibe ihn und schreibe auf, was du beim nächsten Mal anders machen willst.

Beispiel: Ich bin zu schnell gestartet und musste nach 5 Minuten gehen. Nächstes Mal nehme ich mir 2:00 min pro Runde vor und schaue an jeder Runde auf die Uhr.