BÀI 1: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ENZYME POLYPHENOLOXYDASE ĐẾN MÀU SẮC NƯỚC TRÀ

Mục đích: Xác định sự thay đổi màu sắc của nước trà theo nhiệt độ và thời gian

	Nhiệt độ (1000C) Tỉ lệ 5:150	10:150
0	L: 51,63 a: -5,46 b: 4,6	L: 46,16 a: -5,35 b: 13,23
15	L: 47,52 a: -5,31 b: 9,9	L: 43,52 a: -4,15 b: 18,52
Thời gian 30	L: 41,79 a: -5,63 b: 14,94	L: 30,67 a: -4,99 b: 19,09
45	L: 44,55 a: -7,16 b: 19,62	L: 30,67 a: -6,68 b: 17,05
60	L: 42,85 a: -5,63 b: 12,67	L: 12,34 a: -12,98 b: 24,34

BÀI 2 KHẢ NĂNG TẠO MÀNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT SINH HỌC
Mục đích: đánh giá khả năng tạo màng của một số hợp chất sinh học

Xác định độ ẩm của màng chitosan và màng chitosan + gelatin

Cách tiến hành

Pha dung dịch


1. Pha 500ml dung dịch acid acetic 1%: 5 ml acid acetic hòa tan với ít nước cất rồi định mức đủ 500 ml bằng nước cất.

2. Pha 500 ml dung dịch chitosan 2%: cân 10 g chitosan hòa vào một ít dung dịch acid acetic 1% vừa pha sau đó cho tiếp tục dd acid acetic vừa đủ định mức 500ml . Khuấy 30 phút ở nhiệt độ phòng.

3. Pha 200 ml dung dịch gelatin 2,5%: cân 5 g gelatin hòa với ít nước cất sau đó thêm nước đủ 100 ml nước, rồi cốc vào khuấy gia nhiệt 30 phút.

Tiến hành cân hai đĩa





Đĩa 1: 6,934 (g) Đĩa 2: 7,062 (g)

Tiến hành cân hai mẫu

Cân 25, 053g (m_0) chitosan và đổ dung dịch trãi đều ra đĩa 1.

Cân 24,24g (m_0) chitosan + gelatin và đổ dung dịch trãi đều ra đĩa 2.

Để đĩa 2 đĩa petri có màng vào tủ ấm 45 độ C để màng khô trong vòng 1 ngày tiến hành bóc màng và cân xác định độ ẩm.

Sau 1 ngày, thu được khối lượng

Đĩa 1: 7,453g Đĩa 2: 7,618g





m chitosan sau khi sấy là 0,519g (m_1) m chitosan + gelatin sau khi sấy là 0,5557g (m_1)

Độ ẩm của màng tính theo công thức:

Độ ẩm =

Độ ẩm của màng chitosan:

Độ ẩm =

Độ ẩm của màng chitosan + gelatin:

Độ ẩm =

Bài 3: ĐO ĐỘ BRIX DUNG DỊCH NƯỚC TRÀ

Mục đích: xác định lượng đường thích hợp bổ sung vào dung dịch nước trà

Cách tiến hành:

Mỗi nhóm lấy 1 gói trà cho vào cốc 250 ml. Cho nước sôi vào ngâm trà (lượng từ 100-150ml)

Ngâm trà 30 phút sau đó lấy gói trà khỏi cốc và đo độ brix của dung dịch nước bằng Brix kế

Đo độ Brix của dung dịch nước đường

Tính toán lượng nước đường bổ sung để dung dịch nước trà đạt 8 độ Brix

Tiến hành thí nghiệm

Pha 150 ml trà, ngâm trà 30 phút.

Đo độ Brix của trà. 

Trà có độ Brix là 0




Đo độ Brix của dung dịch nước đường

Dung dịch nước đường có độ Brix là 64,2. Nhưng trong quá trình thí nghiệm, sau khi đo lại thì dung dịch nước đường có độ Brix là 65.

Yêu cầu: Cần bao nhiêu gam đường để pha được 30 ml trà có độ Brix là 8.

Cần đổi (ml) trà sang (g) trà



Khối lượng cốc : 35,519g



Cho 30ml trà vào cốc đã cân ta được khối lượng trà (g)