

MATH-F307 - Mathématiques Discrètes
Laurent LA FUENTE
Notes de cours

André MADEIRA CORTES
Nikita MARCHANT

Table des matières

1	Théorie des Graphes	3
1.1	Définitions	3
1.2	Chemins dans les graphes	4
1.3	Arbres	4
2	Arithmétique Modulaire	5
3	Combinatoire énumérative	6
4	Théorie des Codes	7
5	Transformées de Fourier discrètes	8

1 Théorie des Graphes

1.1 Définitions

Définition 1.1. Un graphe Γ est un triplet (V, E, γ) où V est un ensemble fini dont les éléments sont appelés sommets, E est un ensemble fini dont les éléments sont appelés arêtes, γ est une fonction $\gamma : E \rightarrow \text{Paires}(V)$. On nottera le plus souvent $\Gamma = (V, E)$ en omettant la fonction γ .

Soit $\gamma(e) = \{x, y\}$ pour $e \in E, x, y \in V$:

1. On dit que x et y sont adjacents.
2. On dit que e est incidente à x et y .

Définition 1.2. Soit $\Gamma = (V, E, \gamma)$ un graphe.

1. $\gamma(e) = \{x, x\}$ pour $e \in E, x \in V$ est appelé un lacet.
2. Si au moins 2 arêtes sont incidentes à 2 mêmes sommets, on les appelle arêtes multiples.
3. Un graphe est simple s'il n'a ni lacet, ni arêtes multiples. Dans ce cas, on omet la fonction γ , on note $\Gamma = (V, E)$ et E est identifié un sous-ensemble de $\text{Paires}(V)$.

Définition 1.3. Soit $\Gamma = (V, E)$ un graphe. Le degré d'un sommet $v \in V$ est le nombre d'arêtes incidentes à v , les lacets comptant pour 2 arêtes. On note le degré de v par $\deg(v)$.

Exemple. Dans la figure suivante, nous avons 2 sommets de degré 4 et 6 sommets de degré 1.




FIGURE 1 – Exemple degrés des sommets dans la molécule C_2H_6 .

Théorème 1.1. Soit $\Gamma = (V, E)$, alors

$$\sum_{i=1}^{\#V} \deg(v_i) = 2\#E$$

Démonstration. Chaque arête contribue 2 fois dans la somme des degrés.

Corollaire. La somme des degrés des sommets d'un graphe est paire.

Définition 1.4. Le graphe complet K_n est le graphe simple à n sommets pour lequel chaque paire de sommets est une arête.

Exemple. <Dessin des graphes complets $K_1 K_5$ >

Définition 1.5. Un graphe $\Gamma' = (U, F)$ est un sous-graphe de $\Gamma = (V, E)$ si $U \subseteq V$ et $F \subseteq E$. On nottera $\Gamma' \leq \Gamma$.

Exemple. $K_m \leq K_n$ si $m \leq n$.

Exercice. Montrer que K_n possède $q = \frac{1}{2}n(n-1)$ arêtes.

1.2 Chemins dans les graphes

Définition 1.6.

Définition 1.7.

Définition 1.8.

1.3 Arbres

Définition 1.9.

Définition 1.10.

Exemple.

Proposition 1.1.

Démonstration.

Théorème 1.2.

Démonstration.

2 Arithmétique Modulaire

3 Combinatoire énumérative

4 Théorie des Codes

5 Transformées de Fourier discrètes