



HORY.



1. Vznikání horstva z planiny s vrstvami horizontálně uloženými a nezvrásněnými. -
2. Vznikání horstva (stupňů) v terénu s nakloněnými nezvrásněnými vrstvami. -
3. Schematický průřez zvrásněným horstvem (dle A. Heima). Tečkované partie denudovány. -
4. ideální průřez v Uinta-Mountains (sev. Amerika) dle Powella. Jest příkladem značného horstva utvořeného jedinou vrásou. -
5. Průřez archaickými usazeninami od Petit Nation až k St. Jerôme v Kanadě (dle Logana). Ze zbytků vrás lze souditi na bývalé velehorstvo (tečkované čáry), z něhož působením erose a denudace stala se rovina.

HORY.



6. Typické tvary vrcholů horských (dle Sonklara v. Innstädten). - 7.-11. Vznikání horských forem při střídajících se tvrdých (bílé) a měkkých (stínované) vstřevách dle J. P. Lesleye. - Obr. č. 7 ukazuje, jak horizontálně uložené vrstvy tvořivají v případě, že se tvrdá vrstva nalézá na povrchu, tabulové hory. Z pánvi poněkud více prohnutých vznikají dvě hory. Na obr. č. 8-10 znázorněno, jak při ostrých synklinálách tvořivá se ostrý třbet. Je-li tvrdých vrstev více, odpovídá jim i více ostrých hřbetů. Při úplně vvinuté pánvi shledáváme z pravidla dvakrát tolik hřbetů, co jest tvrdých vrstev. Na obr. č. 11 jeví se různé tvary vznikající při antiklinálách (sedlech).