


KOŘENONOŽCI.



1. *Amoeba proteus* Aut. ve stavu sympodiální. - 2. *Amoeba proteus* ve stavu monopodiální. - 3. *Amoeba proteus* ve stavu polypodiální (stav podráždění). - 4., 5., 6., 7. *Amoeba proteus*, postupná měna ze stavu polypodiálního ve stav sympodiální (normální). - 8. a-f Pasivní pohyby jádra *Amoeb*y *proteus*. - 9. Část plasmy *Amoeb*y *proteus* silně zvětš., ukazující krystalky amydokyseliny ve vakuolách, kapky tukové a bakterie souživné. - 10. - 19. *Amoeba proteus*, stav chystající se k rozmnožení dělením a postupné fáse dělení na dva nové jedince. - 20. *Pelomyxa palustris* Greef., stav lezoucí (válnocitý). - 21. *Pelomyxa palustris*, stažená (stav kulovitý, jevíci se po mechanickém podráždění). - 22. *Pelomyxa palustris*: a) jádro jevíci na povrchu tyčinkovitě bakterie, v obsahu svém pak pásku chromatinovou a kapky tukové; b) lesklá tělesa (Glanzkörper), jejichž obsah (glykogen) byl vyčerpán, jak jeví se to na jedincích vyhladovělých; c) tatáž tělesa zvětšená a naplněná glykogenem, jak jeví se na tomž jedinci, když krměn byl po 24 hodin škrobem. - 23. *Amoeba verrucosa* Ehrbg. - 24. *Amoeba radiosa* Ehrbg. - 25. *Difflugia urceolata* Carter. - 26. *Hyalosphenia papilio* Leidy. - 27. *Acella vulgaris* Ehrbg. - 28. *Quadrula symmetrica* Schulze. - 29. *Nebela collaris* Ehrb (encystovaná). - 30. *Cochliopodium pellucidum* Hertw. a Less. - 31. *Euglypha alveolata* Duj. - 32. *Cyphoderia ampulla* Leidy, s jednou panožku bičíkovitě se smršťující. - 33. *Pseudodifflugia gracilis* Schlumb. - 34. *Sphenoderia lenta* Schlumb. - 35. *Pamphagus mutabilis* Bailey. - Vše zvětš. - Fig. 1. - 22. dle autora článku, fig. 23. - 35. dle Leidyho.