


MEDUSY POLYPOVITÉ.



1. *Lucernaria pyramidalis* Haeck. málo zvětš. (s stopka, již jest medusa připevněna, r ramena, t tykadla, ž žlázy pohlavní). - 2. *Procharagma prototypus* Haeck. zvětš. (u svrchní stěna tělní, f gastrální vlákna, s žlázy pohlavní, al ústní lalok, ml sval podélný, o ústroj smyslový či rhopalium, t tykadlo). - 3. *Palephyra primigenia* Haeck zvětš. - 4. *Desmonema Annasethe* Haeck. zmenš. svislý řez tělem, částečně zobrazený (u svrchní stěna tělní, r paprskovitý kanál vakovitý, d střední část dutiny gastrovaskulární, o smyslový ústroj či rhopalium, t tykadla, ž žlázy pohlavní, žd dutina žláz pohlavních, l řasnaté laloky ústní). - 5. *Floscula Prometheus* Haeck. zvětš. - 6. *Ulmaris prototypus* Haeck. zvětš. (t tykadla, l řasnatý lalok ústní). - 7. *Stomolophus fritillaria* Haeck. zmenš. poněkud. - 8. *Cassiopea ornata* Haeck. zmenš. - 10. a 11. *Cannorhiza connexa* Haeck. zmenš. poněkud. Pohled na celou medusu a řez svislý tělem (u svrchní stěna tělní, ž žlázy pohlavní, o ústroj smyslový či rhopalium, d střední část dutiny gastrovaskulární, r radiální či paprskovitý kanál, m rameno ústní, k kanál ramenní, p okraj ramena s druhotnými otvory ústními).