




MLŽI.





Průřez trupem Anodonta v krajině srdeční dle Griesbacha.
1 dutina pericardia, 2. komora srdeční, 3. předsíně srdeční, 4. průřez konečniku, 5. průřez venosním sinusem, 6. nálevka renopericardiálního průchodu, 7. vnitřek ledviny, 8. močovod, 9. ústí močovodu v dutině pláště, 10. otvor pohlavní, 11. kořen nohy, 12. plášť, 13. žábry, 14. cévy přivádějící krev ze žaber k srdci, 15. céva žaberní (s krví venosní).



Nucula nucleus dle Pelseneera, s leva po odstranění levé chlopně plášťové.
a průřez předního svěrače, b průřez předního zatahovače nohy, c průřez svalů nohy zvedajícího, d gonada, e žláza hypobranchiální, f zadní zatahovač (retractor) nohy, g zadní svěrač lastur, h žabro, i dutina plášťová, k plíživá plocha nohy (chodidlo) vroubená trásnými nožními, l noha, m pysk, n dlouhý přívěsek pysku, o krátký přívěsek nohy.




Levé nephridium Protobranchiata Leda sulculata dle Stempella.
1. hlavní kmen ledvinový, 2. nálevka kanálku renopericardiálního, 3. příčná rourka spojovací s pravým nephridiem, 4. chodbička spojující perikard s vývodem pohlavním, 5. zúžený tractus nephridia, 6. společný otvor močopohlavní, 7. vývod gonady, 8. slepé žláznaté přívěsky nephridia.




Tělo Cuspidariidya Silenta Sarsii z lastur vyňaté dle Pelseneera, jako paradigma Septibranchiat.


A s leva, B od břišní strany, plášť většinou odstraněn; a přední, p zadní pól, d hřbetní, v břišní plocha, r pravý, l levý bok; 1. přední svěrač lastur, 2. ústa, 3. přední řada šterbin žaberních, 4. prosvítající játra, 5. žaberní septum, 6. zadní řada šterbin žaberních, 7. zad. svěrač, 8. řitní siph, 9. siphonální tykadla, 10. žaberní (čili přívodní) siph, 11. místo srůstu v okraji plášťovém (kde chlopně obou stran splývají), 12. střední řada šterbin žaberních, 13. volný okraj pláště, 14. noha, 15. zadní pár laloků příušních (pysků), 16. přední pár laloků ústních.



Yoldia limatula dle Drewa. Zvíře myšleno průhledné k znázornění vnitřní stavby.
aa přední zatahovač, cg zauzlina mozková, afm přední svaly nohy, int střevo, h srdce provrtané konečником, pfm zadní sval nožní, vg zauzlina viscerální, pa zadní svěrač, es řitní (anální) siph, is žaberní (branchiální) siph, st siphonální makadlo, pap dlouhý přívěsek pysku, pe zadní výběžek pláště, g žabra, lp pysk ústní, sto žaludek, ot váček sluchový, pg zauzlina nožní, f noha, bg žláza byssová.



Schemata k znázornění anatomie žaber dle Langa.
A typ protobranchiální, B filibranchiální, C eulamellibranchiální po případě pseudolamellibranchiální, D sentibranchiální - 1. plášť, 2. vak útrobní, 3. noha, 4. dutina plášťová uvnitř septa, 5. dutina plášť. mimo septum (4 a 5 jen u D); s svalnaté septum, v němž se přeměnily žabry u septibranch., provrtané otvory o; e vnější i vnitřní filament žaberní u A, e1 vzestupná větev vnějšího, i1 vnitřního vlákna žaberního u B1 u C jest e1 a i1 analogická lamella plátků žaberních.



Nervstvo Dreisseusie dle Babora.
1. gangl. cerebropleurální, 2. přední nerv plášťový, 3. gangl. pedální, 4. gangl. parientální, 5. ganglion osphradia, 6. gangl. viscerální, 7. zadní nerv plášťový, 8. kommissura accessorických ganglii viscerálních, jež innervují osphradia (5), s nervy útrobními.

Nervstvo Nuculy dle Pelseneera.
1. ganglion pleuropedální, 2. konnektiv pleuropedální, 3. společný kmen konnektivů pleuropedálního a ceregropedálního, 4. nerv k otocystě, 5. ganglion pedální, 6. gangl. visceroparientální, 7. zadní nerv plášťový, 8. osphradium, 9. kommissura pleuroviscerální, 10. otocysta, 11. chodba k otocystě, 12. ústí otocystové chodby na povrchu těla na venek, 13. konnektivoceregropedální, 14. přední nerv plášťový, 15. nerv k lalokům ústním jdoucí, 16. ganglion cerebrální.