




Nálevníci brvití (Infusoria).




Vorticella nebulifera Ehrbg. 1. contractilní vakuola, 2. individuum, povstale podélným dělením, 3. individuum dělicí se, 4. Akt coniugace, 5. jádro.



Stentor roeseli Stein. PV contractilní vakuola, N nucleus.




Stylonychia mytilus O. F. M. Wzadoralni zona membranel, C contractilní vakuola, N macronucleus, N' micronucleus, A cytopyge.




Protodon teres Ehrbg. 1. cystom, 2. cystophorynx, 3. nálevka, 4. macronucleus, 5. potravni vakuola, 6. cytopyge, 7. contractilní vakuola, 8. micronucleus, 9. pellicula.

Nálevníci bičíkovití (Mastigophora).




Gymnodinium lenuissimum Lauterb. 1. žluté chormatophory, 2. bičík v rýze okružní, 3., 4. podélný bičík, 5. jádro.




Bodo edax Klebs.

A při přijímání potravy, B v klidu, 1. monada, 2. přední bičík, 3. contractilní vakuola, 4. jádro, 5. zadní bičík.



Bicosoeca socialis Lauterborn, 1. přední bičík, 2. schránka, 3. contractilní vacuola, 4. límcovitý oraj, 5. jádro, 6. zadní bičík.



Codonosiga botrytis J. Cl. 1. bičík, 2. límec, 3. a 4. jeho pokračování kornoutovitě, 5. prohloubeninka s přijatou potravou, 6 a 7. potravní vacuoly, 8. pulsující vacuola, 9. stoněk.