



Obojživelníci.




Surýn úhořovitý (*Siren lacertina* L.), v 1/2 skut. vel.




Ouhořík tříprstý (*Amphiuma tridactylum* Cuv.), v 1/2 skut. vel.

Obojživelníci.



Mlok obecný (*Salamandra maculosa* Laur.), ve skut. vel.




Čolek veliký (*Triton cristatus* Laur.), samec a samička, ve skut. vel.

Obojživelníci.




Slepoň žízalový (*Coecilia lumbricoides* Daud.), ve skut. vel.



Skokan hnědý (*Rana fusca* Rös.), ve skut. vel.

Obojživelníci.




Rosnička zelená (*Hyla viridis* Laur.), samička a sameček, ve skut. vel.



Pipa americká (*Pipa americana* Laur.), v 1/2 skut. vel.

OBOJŽIVELNÍCI.

(Anatomie.)




1. Lebka mloka černého (*Salamandra atra*) shora, 2. zdola (zvětš.); As alisfenoid, Bp chrupavčitý základ lebky mezi oběma sluchovými vácí, Can dutina nosní, Cocc kloubní plochy týlní, D otvor slzní v přední kosti čelní, Ep epitoticum, F kost čelní, Fl otvor pro nerv čichový, Fov okénko oválné, Ch chosny, In internasální část chrupavčité lebky, Lgt ligament mezi kůstkou skluchovou a suspensoriem dolejší čelisti, M hořejší čelist, N kosti nosní, Na vnější dírká nosní, NK schránka čichová, OB vácí sluchové, Os orbitosfenoid, P kost temenní, Pf praefrontale, Pmx kost mezičelistní, Pp kost patrová, Ps parasfenoid, Pt a Ptc kost křídlová, Qu (Pa, Ped, Pot) kost čtvercová, Squ kost šupinová (squamosum), St kůstka sluchová (stapes), Vo kost radličná, Vop táž kost srostlá s kostí patrovou, Z výrostek desky internasální, II, V, VII otvory nervů 2., 5. a 7. páru. - 3. Lebka skokana (*Rana esculenta*) zdola (zvětš.); E ethmoideum, FP frontoparietale, GK váček sluchový, NN1 chrupavčitá končina nosní, Olat postranní kost týlní, Pal kost patrová, PP palatoquadratum, Pro proticum, Ojg quadratojugale, WK chrupavka Wiedersheimova, II, V, VI otvory nervů 2., 5. a 6. páru; ostatní jako v obr. 1. a 2. - 4. Lebka Stegocephalů (*Branchiosaurus*); Br oblouky žaberní, Fp otvor v kosti tlátní, Oc kruh kosti na bělímě oka, Socc svrchní kost týlní; ostatní jako v obr. 1.-3. - 5. Páteř žáby *Discoglossus pictus* (zvětš.); Ob hořejší oblouk, Oc kostřec, Pa processus articularis, Ps pr. spinosus, Pt a Ptc pr. transversus, R zbytky žeber, SW obratel křížový. - 6. Pásmo lopatkové axolotla, 7. skokana (*Rana esculenta*, typ Firmisternia; zvětš.); C korakoid, Cl v obr.6. prokorakoid, v 7. kost klíční (clavicula), EC epikorakoid, Fe otvor mezi Cl a C, OS a OS1 episternum, Pf kloubní jamka pro kost ramenní, S lopatka, Sb a St metasternum, St kost prsní (?), + a * v obr. 6. otvory pro nervy, + v obr. 7. kloubní jamka pro kost ramenní. - 8. Pánev mloka (*Salamandra maculosa*; zvětš.), 9. Skokana (*Rana esculenta*); Ac a G acetabulum pro kost stehenní, Cr srista ischiopubica, Ep epipubis, Fo foramen obturatum, Is kost sedací, J a J' kost kyčelní, Jp ventrální část pánve (srostlé Is a P), u ** zkosnatělá (pars ischiadica), Oc kostřec, P chrupavčitá část stydky, Pt příčné násadce křížového obratle, Sy symfysa.

Obojživelníci.



Rosnička zelená (*Hyla viridis* Laur.), samička a sameček, ve skut. vel.



Pipa americká (*Pipa americana* Laur.), v 1/2 skut. vel.