


RHIZOCARPEAE (KOŘENOPLODÉ).



I. *Marsilia quadrifolia* L. Rostlina zmenšená, a mladý, pérovitě na konci svinutý list, s plody (sporokarpy.) II. *Pilularia globulifera* L. Rostlina zmenšená, s plody (sporokarpy). III. *salvinia natans* L. A rostlina zmenšená se strany, B též shora, C klíčící rostlinka 15krát zvětšená, msp velkovýtrus (makrospora), p prvostélka (prothallium), a stonek, b, b2 b3 první listy (b1=t. zv. štítek). IV. *Salvinia natans* L. A tři plody na průřezu, v levém (ma) velkovýtrusnice, v druhých dvou (mi) malovýtrusnice, 8krát zvětšeno, B malovýtrusnice 55krát zvětšená, C část malovýtrusnice, ukazující v pěnovitěm pletivu uložené 4 malovýtrusy, 250krát zvětšeno, D velkovýtrusnice s velkovýtrusem uvnitř, obě podél proříznuto a 55krát zvětšeno, E vrcholek velkovýtrusu, p perinium, e exin, a proteinová (aleuronová) zrnka, n jádro, 240krát zvětšeno. V. *Salvinia natans* L. Vznik samčí prvostélky, A malovýtrus ve 3 buňky rozdělen, 860krát zvětšen, B hotová prvostélka samčí se strany. C též se strany břišné, obě 640krát zvětšeno, s1 a s2 buňky spermatogenní, z nichž každá zplozuje po 2 buňkách, mateřských to buňkách spermatozoidů (chámooových tělísek). Vždy dvě a dvě buňky spermatogenní (viz vyobr. C) s obklopujícími je buňkami sousedními menšími b, c, d, e představují jedno antheridium, zbytek t. j. buňky a a p náleží prvokličku. VI. *Salvinia natans* L. Zárodek (embryo) na průřezu podélném, 100krát zvětšený, spw stěna velkovýtrusnic, p perinium, e exin, s buňka výtrusná, pr prvostélka, embr zárodek, f noha, b1 b2 b3 první tři listy, st vrcholek lodyžní.