


ROZSIVKY (DIATOMACEAE) A RUDUCHOVITÉ ŘASY (FLORIDEAE).



Obr. 1. a 2. Rozsivky. - Obr. 3. - 6. Řasy ruduchovité.

Obr. 1. *Licmophora flabellata*. Kolonie rozsivek s rozvětvenými stopkami rosolovitými. Obr. 2. Způsob, kterým se tvoří zveličující výtrusy u rozsivky *Navicula viridula*. A jedinec se strany hřbetní. B dvě buňky k sobě přiložené; obsah každé rozdělil se ve dvě buňky dceřinné. C, D, dvě a dvě protějších buněk dceřinných kopulovalo. E, obě buňky kopulací vzniklé vyrostly ve výtrusy zveličující, na nichž lpí ještě vyprázdněné misky buněk mateřských. Obr. 3. *Callithamnion corymbosum*. A čtverovýtrusy ještě ve výtrusnici obsažené, B z téže právě vystouplé. Obr. 4. *Batrachospermum moniliforme* (žabí símě). A jednotlivé rozvětvené větevky s okrouhlými samčími výtrusnicemi (s) vypouštějícími po jednom tělísku chámovém, bezbrvém (spermácium, s*). B větevka stélky se samičím ústrojím (carpogonium) dosud neoplozeným: c zpoděk (teřich) karpogonu, t trychogyn. C karpogon oplozený, při s samčí buňka (spermácium) po kopulaci své s trychogynem, při c z břicha (teřichu) karpogonu počínají pučeti budoucí vlákna výtrusorodná. (obr. 1. - 4. při silném zvětšení.) Obr. 5. *Chondrus crispus*, pohled na stélku o polovic zmenšenou, při s vejčité plody (cystokarpy) ve stélce pohřížené. Obr. 6. *Gigartina mammosa*, stélka na 3/4 zmenš., na ní při s bradavkovité plody (cystokarpy).