



# ROZTOČOVITÍ (ACARIDA).



1. *Demodex canis* Leydig, 200/1. 2. *Sarcoptes scabiei* Geer, 200/1. 3. *Glyphopsis Bostocki* Michael 38/1 (mesostigmat). 4. *Holothyrus* sp. se strany (orig.) 15/1. 5. *Glycyphagus Canestrini* Armanelli, 200/1 (tyroglyphid). 6. *Trombidium fuliginosum* Herm., 25/1 (prostigmat). 7. Stadium nymphochrysalis *Trombidia*, 100/1. 8. Nymphophanstadium *Trombidia*, 100/1. 9. *Oribata setosa* Koch, 80/1. 10. Vodule: *Piona nodata* Müller, 30/1 (orig.); mk prázdné capitulum staré larvy (ac), b částečně ulámané nohy larvy, ep tvořící se kůže nového zvířete, z vakuolovité buňky pod starou larvální kůží, ml zaživací traktus, ed exkreční orgán, b nohy larvální, b1-4 nohy nymfy, mx maxillární palpus, ap apoderma.



# ROZTOČOVITÍ (ACARIDA).



1. Sagitální řez tyroglyphidem *Hericia Robini*. 2. Samičí orgány tyroglyphida *Glyphagus platygaster*. 3. Samičí orgány u *Trombidium fuliginosum*. 4. Zaživací traktus mesostigmata *Uropoda Kramerii*. 5. Vajíčko klišťe se založeným entodermem (*en*). Fig. 6. - 7. Dvě stadia vývoje larvy klišťe. Na prvním založen čtvrtý pár noh, který pak zmizí(7); vývoj exkrečního aparátu. 8. Absorpční orgán Bereseho ze zaživací roury u *Liogryllus campestris*. 9. Erechthæsthet vodule *Limnocharaes aquaticus*. 10. Srdce Gamasa. - Vysvětlivky ku fig. 1.: *m* ústa, *mdm* a *mdf* ústní ústroje, *ph* pharynx, *oe* oesophagus, *v* ventriculus, *r* rectum, *a* řít, *gso* a *gsu* hoření a dolení část nervové soustavy, *s* svalstvo, *ov* vaječník, *od* vejcovod, *o* vajíčko, *ge* zevnější otvor pohlavní, *rs* receptaculum seminis.