BRIE's alongshore step on six sections (x = 1000, 1000, 900, 900, 900, 1000 m): the angle reads only the north neighbour, so each section has one rate

1 The angle (brie.py 820-828)
θ[i] = atan((x[i+1] − x[i]) / 500)

i	x[i]	x[i+1]	θ[i] °
0	1000	1000	0
1	1000	900	−11.3
2	900	900	0
3	900	900	0
4	900	1000	+11.3
5	1000	1000	0

2 The rate (1294-1309)
r[i] = max(0, D(θ[i]) × dt / 2 / dy²)

i	θ[i] °	D(θ)	r[i]
0	0	-119	0.000
1	−11.3	9214	0.018
2	0	-119	0.000
3	0	-119	0.000
4	+11.3	56935	0.114
5	0	-119	0.000

3 The update (1315-1324)
change[i] = r[i]·(x[i+1]−x[i]) + r[i]·(x[i−1]−x[i])

i	r[i]	with north	with south
0	0.000	0	0
1	0.018	−1.84	0
2	0.000	0	0
3	0.000	0	0
4	0.114	+11.39	0
5	0.000	0	0

4 Each boundary's two books
south's book + north's book should be 0

boundary	south	north	left over
0|1	0	0	0
1|2	−1.84	0	−1.84
2|3	0	0	0
3|4	0	0	0
4|5	+11.39	0	+11.39
5|0	0	0	0
all			+9.54

Full year from Brie.update(): the summed x grows by 15.0 m (≈ 148,000 m³ of sand lost) with nothing removing any. Option A waves, 500 m sections.