

1 Übungsaufgaben Analysis 1 für den 19. und 21.06.24

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Nullstellen, Pole und Asymptoten von


$$\frac{x^5 - 16x^3 + 2x^2 + 60x - 19}{x^2 - 10}.$$

Bei Nullstellen und Polen wird eine Genauigkeit von mindestens 10^{-3} gefordert. Wenn Sie das Verhalten der Funktion kennen, skizzieren Sie den Graphen.

Lösung zu Aufgabe 1

$$\frac{x^5 - 16x^3 + 2x^2 + 60x - 19}{x^2 - 10} = x^3 - 6x + 2 + \frac{1}{x^2 - 10}.$$

Verhalten für kleine x und für große x wie $x^3 - 6x + 2$. Im Bereich um $x = \sqrt{10}$ und $x = -\sqrt{10}$ je ein Polwechsel von $-\infty$ nach ∞ .



Aufgabe 2

Welche Kurve erhalten Sie, wenn Sie eine Potenzfunktion $f(x) = cx^m$ auf doppelt logarithmisches Millimeterpapier zeichnen? Warum? (Beweis!). Welche Art von Millimeterpapier benötigen Sie um für eine Exponentialfunktion $f(x) = a^x$ den gleichen Effekt zu erzielen?

Lösung zu Aufgabe 2

$$f(x) = cx^m \tag{1}$$

$$\log(f(x)) = \log c + m \log x \tag{2}$$

Trägt man $\log(f(x))$ über $\log x$ auf, so erhält man eine Gerade.

$$f(x) = a^x \tag{3}$$

$$\log(f(x)) = \log a \cdot x \tag{4}$$

Trägt man nun $\log(f(x))$ über x auf, so erhält man eine Gerade.

Aufgabe 3

Führen Sie eine vollständige Kurvendiskussion durch für die Gauß'schen Normalverteilung mit der Dichtefunktion

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

Skizzieren Sie den Graphen. Welche Bedeutung haben die Parameter μ und σ ?

Lösung zu Aufgabe 3

$$\text{Asymptote: } y = 0 \quad (5)$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} = a \cdot e^{-b(x-\mu)^2} \quad (6)$$

$$\text{mit } a = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{ und } b = \frac{1}{2\sigma^2} \quad (7)$$

$$\varphi \text{ ist symmetrisch zu } x = \mu. \quad (8)$$

$$\varphi'(x) = -2ab(x-\mu)e^{-b(x-\mu)^2} \quad (9)$$

$$\varphi'(\mu) = 0 \text{ und } \varphi''(\mu) < 0 \Rightarrow \varphi \text{ hat Maximum in } x = \mu. \quad (10)$$


$$\varphi''(x) = -2ab[1 - 2b(x-\mu)^2]e^{-b(x-\mu)^2} \quad (11)$$

$$\varphi''(x) = 0 \quad (12)$$

$$\Leftrightarrow (x-\mu)^2 - \frac{1}{2b} = 0 \quad (13)$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \mu \pm \sigma \quad (14)$$

$$\varphi'''(x_{1,2}) \neq 0 \quad (15)$$



Aufgabe 4

Führen Sie für die Funktion $f(x) = \ln(\cos x)$ eine Kurvendiskussion durch. Nehmen Sie Stellung zu: Definitionsbereich, Stetigkeit, Symmetrie, Nullstellen, Grenzwerte für $x \rightarrow \pm\pi/2$, Lokale Extrema, Wendepunkte, Grenzwert für $x \rightarrow \infty$ und erstellen Sie eine Skizze der Funktion.

Lösung zu Aufgabe 4

Def.-Bereich: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi/2 + k2\pi < x < \pi/2 + k2\pi \text{ für } k \in \mathbb{Z}\}$

Stetigkeit: f stetig auf D , da \ln und \cos stetig.

Symmetrie: $f(-x) = \ln(\cos(-x)) = \ln(\cos(x)) = f(x) \Rightarrow$ symmetr. zur y-Achse.

Nullstellen:

$$\ln(\cos x) = 0 \quad (16)$$


$$\cos x = e^0 = 1 \quad (17)$$

$$x = \arccos 1 \quad (18)$$

\Rightarrow Nullstellen für $x = k \cdot 2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Grenzwerte: $\lim_{x \rightarrow \pm\pi/2} \ln(\cos x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(\cos x)$ existiert nicht

Graph:



Aufgabe 5

Beweisen Sie daß für $a > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $a^{(x+y)} = a^x a^y$.

Lösung zu Aufgabe 5

$$a^{(x+y)} = \exp((x+y) \cdot \ln a) = \exp(x \cdot \ln a + y \cdot \ln a) = \exp(x \cdot \ln a) \cdot \exp(y \cdot \ln a) = a^x \cdot a^y$$

Aufgabe 6

Berechnen Sie die Ableitung von \arcsin mit Hilfe eines geeigneten Satzes aus der Vorlesung.

Lösung zu Aufgabe 6

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Aufgabe 7

Aus Messungen seien die unbekannten Parameter a und b der Funktion $y = a \cdot \exp(x) + b \cdot 1/x$ zu bestimmen. Es liegen die beiden Wertpaare $(x_1, y_1) = (2, 10)$ und $(x_2, y_2) = (3, 9)$ vor. Untersuchen Sie die gefundene Funktion auf Extrema.

Lösung zu Aufgabe 7


$$a \approx 0.1539, b \approx 17.73$$

f hat keine Nullstellen

Minimum bei $x \approx 2.735$.

Pol bei $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$



Aufgabe 8

Berechnen Sie die 1. Ableitung der Funktion

$$f(x) = \frac{e^{-x} \cos(x + \pi/4)}{x}$$

Lösung zu Aufgabe 8

$$f'(x) = -e^{-x} \left[\frac{\sin(x + \pi/4)}{x} + \frac{x+1}{x} \cos(x + \pi/4) \right]$$

Aufgabe 9

Berechnen Sie folgende Grenzwerte:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_{10} x}{\ln(\sin x)}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 5^x}{\sin x}$$


Lösung zu Aufgabe 9

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_{10} x}{\ln(\sin x)} = \frac{1}{\ln 10}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 5^x}{\sin x} = 1 - \ln 5$$

Aufgabe 10

In der x-y-Ebene sind gemäß Skizze vier Punkte gegeben. Die Lage der Punkte P_1 , P_2 , P_3 ist vorgegeben. Berechnen Sie die x-Koordinate des Punktes $Q = (x, 0)$ auf der x-Achse, so daß die Summe der Abstände zu den anderen Punkten ein Minimum wird.



Lösung zu Aufgabe 10


Summe der Abstände $S(x) = 2 \cdot \overline{QP_1} + \overline{OP_3} = 2 \cdot \sqrt{x^2 + a^2} + b - x$

$$S'(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 1/\sqrt{3} \cdot a$$

$$S''(x) = 1.29/a > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Minimum.}$$

Aufgabe 11

Das nebenstehende Bild zeigt einen mit Wasser gefüllten Zylinder. In der Höhe $H - h$ über dem Boden befindet sich eine seitliche Öffnung, aus der das Wasser mit der Geschwindigkeit $v_0 = \sqrt{2gh}$ waagerecht austritt. In welcher Höhe $H - h$ muß man diese Öffnung anbringen, damit der austretende Wasserstrahl den Boden an einer möglichst weit entfernten Stelle trifft? (Nehmen Sie an, die Wasserhöhe H sei konstant.)



Lösung zu Aufgabe 11

Papula-Übungen S. 78.