



# 1. Histogramă



$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) \cdot dx = \text{arie trapez dreptunghic}$$




$$A = \text{baza} \cdot h = H_i \cdot h$$

$$A = P(x_i \leq x \leq x_{i+1}) \simeq \frac{n_i}{N}$$

nr. de valori în intervalul  $[x_i, x_{i+1}]$

nr. total de înregistrări  $\{x_1, \dots, x_N\}$

$$H_i = \frac{n_i}{N \cdot h}$$

v.a. continue (nume)	Notatie + parametrii	Densitatea de probabilitate ( $f$ )	Proprietati
Distributia exponentiala	$X \sim \text{Exp}(\theta)$ $\theta > 0$	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{\theta} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \end{cases}$	$M(x) = \theta$ $\nabla^2(x) = \theta^2$ Lipsa de memorie $P(X > b+t \mid X > b) = P(X > t)$
Distributia uniforma pe un interval $[a, b]$	$X \sim \text{Unif}([a, b])$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$	$P(a \leq X < a+L) = \int_a^{a+L} \frac{1}{b-a} dt = \frac{1}{b-a} \cdot L = \frac{L}{b-a}$ Probabilitatea ca v.a X sa aiba valori intr-un interval de lungime L.
Distributia normala (gaussiană)	$X \sim N(m, \nabla^2)$ $m \in \mathbb{R}, \nabla > 0$ multimea valbrii $x \in \mathbb{R}$	$f(x; m, \nabla^2) = \frac{1}{\nabla \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\nabla^2}}$ $f(m) = \frac{1}{\nabla \sqrt{2\pi}}$ $(m, f(m))$ $\rightarrow$ coord. vârful. clopot	$G f \rightarrow$ clopotul lui Gauss $V(m, f(m))$ 
Distributia normala standard	$m=0, \nabla=1$ $X \sim N(0, 1)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$	


## Distributia exponențială

- Parametru:  $\theta$ ;
- Domeniu de valori  $[0, \infty)$ ;
- Notăție:  $\text{Exp}(\theta)$ ;
- Den de prob.  $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } x < 0 \\ \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & \text{dacă } x \geq 0 \end{cases}, \quad \theta > 0$
- Funcția de repartiție:  $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } x < 0 \\ 1 - e^{-x/\theta} & \text{dacă } x \geq 0 \end{cases}$ ,
- $M(X) = \theta, \sigma^2(X) = \theta^2$
- Model: timpul de așteptare pentru un proces continuu
- Lipsa de memorie: probabilitatea de a aștepta încă  $t$  minute nu este afectată de aceea de a fi așteptat deja  $s$  minute fără eveniment.

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$


## Distributia uniformă

- Parametrii:  $a, b$
- Domeniu de valori (adică mulțimea de valori posibile unde  $f_X(x) > 0$ ):  $[a, b]$
- Notăție:  $\text{Unif}[a, b]$  sau  $\text{uniform}[a, b]$ ;
- Model: valorile din domeniu au probabilitate egală de apariție;
- den. de prob.  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{dacă } x \in [a, b] \\ 0 & \text{dacă } x \notin (a, b) \end{cases}$
- funcție de repartiție  $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{dacă } a \leq x < b \\ 1 & \text{dacă } x \geq b \end{cases}$



Caz special

$$U \sim \text{Unif}([0, 1]) \Rightarrow f_U(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$



## Distributia normală

- Parametrii:  $m, \sigma$ ;
- Domeniu de valori  $(-\infty, \infty)$ ;
- Notăție:  $N(m, \sigma)$  sau  $N(m, \sigma^2)$
- Den de prob:  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,
- Funcția de repartiție: nu are formulă (valorile se pot determina folosind tabele sau software matematice: pnorm in R)
- Dacă  $X \sim N(m, \sigma^2)$ , atunci  $M(X) = m, \sigma^2(X) = \sigma^2$ .
- Model: măsurarea erorilor, înălțime, media big data;

## Distributia normală standard

- Parametrii:  $m = 0, \sigma = 1$ ;
- Den de prob:  $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ ;
- $\varphi$  este pară;
- graficul său se numește clopotul lui Gauss;
- Notăție  $Z \sim N(0, 1)$ ;
- Funcția de repartiție:  $\Phi(x) = P(Z \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$
- $M(Z) = 0, \sigma^2(Z) = 1$




Figure: Densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare  $Z \sim N(0, 1)$ .

Funcția de repartiție a variabilei aleatoare  $Z \sim N(0, 1)$  se notează cu  $\Phi$ :

$$\Phi(x) = P(Z \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

### Proprietăți:

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$
- Valoarea funcției  $\Phi$  într-un punct  $x$  se poate calcula doar prin metode aproximative, dar există tabele pentru aceste valori;




Figure: Ilustrarea semnificației geometrice a valorii funcției de repartiție într-un punct.

Observații legate de parametrii  $m$  și  $\sigma^2$  ai distribuțiilor normale

Se poate arăta că dacă  $X \sim N(m, \sigma^2)$  atunci  $M(X) = m$   
 $\sigma^2(X) = \sigma^2$

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x; m, \sigma^2) dx = m$$

$$\sigma^2(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \sigma^2$$

Funcția de repartiție:  $F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \in (-\infty, x]) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt$


Notatii clasice folosite:

	Funcț. dens. de probabilitate	Funcția de repartiție
$X$ - Distribuție normală	$f(x; m=0, \sigma^2=1)$	$F_X(x; m, \sigma^2)$
$Z \sim N(0,1)$ Distribuție normală standard	$\varphi(x, m=0, \sigma^2=1)$ $= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$	$\Phi(x, m=0, \sigma^2=1)$    $\phi(x)$

Proprietăți ale funcției de repartiție  $\phi (Z \sim N(0,1))$

①  $\phi(-x) = 1 - \phi(x), \forall x \in \mathbb{R}$

② pt.  $x=0 \Rightarrow \phi(0) = 1 - \phi(0) \Rightarrow \phi(0) = \frac{1}{2}$   
 ||  
 $P(Z \leq 0)$



③  $\exists$  tabel cu val. fct.  $\phi$

Mediana unei variabile aleatoare  $X$  este acea valoare  $x$  pentru care:

$$P(X \geq x) = P(X \leq x) = 0,5$$

mediană :  $x_1 < x_2 < \dots < x_N$

$m_e = \text{mediană}$

$$F_X(m_e) = 0,5$$

#### Definiție mediană

Mediana unei variabile aleatoare  $X$  este valoarea  $x$  pentru care  $P(X \leq x) = P(X \geq x) = 0.5$ .

Adică, acea valoare  $x$  pentru care  $F(x) = 0.5$ .




Figure 3  
Measures of Central Tendency

De exemplu, dacă  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , atunci

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.68,$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95,$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.99.$$




Figure: Regula  $3\sigma$  a unei variabile aleatoare  $X \sim N(\mu, \sigma)$ .




Figure: Regula  $3\sigma$  a unei variabile aleatoare  $Z \sim N(0, 1)$ .

De exemplu, dacă  $Z \sim N(0, 1)$ , atunci

$$P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.68,$$

$$P(-2 \leq Z \leq 2) \approx 0.95,$$

$$P(-3 \leq Z \leq 3) \approx 0.99.$$

De exemplu, se poate calcula  $\phi(1)$ . Intr-adevăr,

$$\phi(1) = P(Z \leq 1) \approx 0.68 + 0.16 = 0.84.$$

Conceptul de  $\alpha$ -cwantilă

Notăm  $x_\alpha$  și e acea valoare a v.a.  $X$  pentru care:


$$F(x_\alpha) = P(X < x_\alpha) = \alpha, \\ \alpha \in [0, 1]$$

Echivalent,  $x_\alpha = F^{-1}(\alpha)$ , unde  $F : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ , strict crescătoare, inversa  $F^{-1} : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ .

Evident, mediana este  $x_{0.5}$ .

**Observație:** Pentru  $Z \sim N(0, 1)$ , notăm  $z_\alpha$ .

$\rightarrow$  sunt cwantile de ordinul 4  $\Rightarrow$  ne împart valorile v.a.  $X$  în 4 grupe



$$F(x_{0,25}) = 0,25 \Rightarrow x_{0,25} = Q_1$$

Prop:  $z_{1-\alpha} = -z_{\alpha}$

pt.  $\alpha = 0,5 \Rightarrow z_{0,5} = -z_{0,5} \Rightarrow z_{0,5} = 0$

$$F(0,5) = 0,5$$

$$F(0) = 0,5$$

$$F(z \leq 0) = 0,5$$

$$z \sim N(0,1)$$

$$z_{0,5} = \text{mediană}$$

Cum ne propunem să demonstrăm propoziția?

Nr.  $z_{1-\alpha}$  este nr. pentru care  $\Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$   $z \sim N(0,1)$

Nr.  $z_{\alpha}$  este nr. pentru care  $\Phi(z_{\alpha}) = \alpha$

$z_{1-\alpha} = -z_{\alpha}$  ( Vom folosi  $\Phi(-z_{\alpha}) = 1 - \Phi(z_{\alpha})$  )  
 $\Leftrightarrow 1 - \alpha = \Phi(z_{1-\alpha})$

Transformarea variabilelor aleatoare

$$x \xrightarrow{g} g(x) = y$$

ex:  $x \sim \text{Unif}[0,1]$ ,  $y = e^x$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

$$x \sim \text{Unif}[0,1] \Rightarrow b_x = [0,1]$$

$$y = e^x \Rightarrow b_y = [1, e]$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ x, & \text{dacă } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{dacă } x \geq 1 \end{cases}$$

Dom determina  $F_Y(y)$

$$y < 1 \Rightarrow F_Y(y) = 0$$

$$y \geq e \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1$$

$$y \in [1, e] \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y) = \ln y$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } y < 1 \\ \ln(y), & \text{dacă } 1 \leq y < e \\ 1, & \text{dacă } y \geq e \end{cases}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

$$M(Y) = M(e^X)$$

$$\text{LOTUS} \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^x f(x) dx = \int_0^1 e^x \cdot 1 dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & \text{dacă } 1 \leq y \leq e \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

Obs: Prin procedeul de standardizare, transformăm o v.a.  $X \sim N(m, \sigma^2)$  într-o v.a.  $Z \sim N(0, 1)$

Proprietate

Fie  $X \sim N(m, \sigma^2)$ . Atunci,  $Z = \frac{X-m}{\sigma}$  are proprietatea că  $Z \sim (0, 1)$ .

Intr-adevăr, se poate demonstra că

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi_Z\left(\frac{x-m}{\sigma}\right), \quad F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$$

$$\bullet \quad M\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) \stackrel{?}{=} 0$$

$$\frac{M(x) - m}{\sigma} = \frac{m - m}{\sigma} = 0$$

$$\bullet \quad \sigma^2 (aX) = a^2 \sigma^2 (X)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = ?$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq Z = \frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{b-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$$



**Exemplu:**

Fie  $X \sim N(1, 0.4^2)$ . Să se calculeze:  $P(0.75 < X \leq 1.3)$  și să se determine  $x \in \mathbb{R}$  astfel încât  $P(X \leq x) = 0.95$ ?

Rezolvare:  $P(0.75 < X \leq 1.3) = F_X(1.3) - F_X(0.75) = ?$

Vom standardiza variabila  $X$ , transformând-o în variabila  $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ .

Avem:  $P(0.75 < X \leq 1.3) = P(\frac{0.75-1}{0.4} < Z \leq \frac{1.3-1}{0.4}) =$   
 $\Phi((1.3 - 1)/0.4) - \Phi((0.75 - 1)/0.4) = \Phi(0.75) - \Phi(-0.625) =$   
 $\Phi(0.75) - 1 + \Phi(0.625).$

Avem de calculat  $P(X \leq x) = F_X(x) = \Phi((x - 1)/0.4) = 0.95$ .

Deci  $(x - 1)/0.4 = \Phi^{-1}(0.95) = z_{0.95}$ . Din tabele se știe că 0.95-cvantila distribuției normale standard este  $z_{0.95} = 1.64$ .

Deci  $x = 1 + 0.4 \cdot 1.64$ .