


蛙鸣

第 59 期



中国科学技术大学数学系 编
2005 年 6 月

刊首寄语

初夏已至，23 岁的《蛙鸣》满载春天的财富和喜悦，像清晨阳光中的静谧，落在等待收获的田野上。

地上盛开的第一朵花是对未来之歌的邀请。在《蛙鸣》中，我们散播思想的花瓣，不是为了未来的果实，而是为了片刻的玄思妙想。在这里，你可以领略数学大家的风采，可以体味身边良师的心路历程，也可以聆听同龄人青涩却锐意的成长宣言。也许言语稍显稚嫩，但遮掩不住同学们如金子般闪烁的思想火花和在数学道路上探寻求知的激情。

河岸对河流说，我留不住你的浪花，就让我把足迹留在心里吧。希望我们的《蛙鸣》能在你的心中留下些许痕迹，也祝福我们的生命像多节的芦笛，经过希望和收获的缺口，奏出多姿多彩的未来之歌。

目 录

刊首寄语	i
------------	---

大师 睿语

一个数学家的辩白	G.H.Hardy	1
----------------	-----------	---

访谈录

史济怀教授访谈	刘 阔	7
---------------	-----	---

研究讨论

A Proof of Finite Sum Theorem Using the Concept of Ultrafilter	雷 涛	9
A general approach rate to the strong law of large numbers	胡 明	12
从局部最短到整体最短	张鹏飞	19

蛙声一片

Hodge 星算子及其性质	孙 俊	26
曲面的自然标架与正交标架	修大成	33
$[-2,2]$ 中一类点集的稠密性	朱家林	38

新生园地

你能一直赌下去吗?	管枫 罗世森	41
-----------------	--------	----

试题选登

The 65th William Lowell Putnam Mathematical Competition	44
---	----

一个数学家的辩白（节选）

[英] G H 哈代

假如真的能把我的雕像塑在伦敦纪念碑上的话，我是希望这座碑高耸入云，以至人们见不到雕像呢，还是希望纪念碑矮得可以使人们对雕像一目了然呢？我会选择前一种，而斯诺博士可能会选择后一种。

§ 2

我建议对数学进行辩解。也许有人会跟我说这根本没必要，因为，不论原因如何，目前还没有哪一种学科被公认为比数学更有用、更值得称颂的。这或许是真实的。实际上，由于有了爱因斯坦的惊人成就，星体天文学与原子物理学可能已成为普遍高度评价的科学。数学家现在不必认为自己在自卫，因为他不会遭到像布拉德雷 (Bradley) 在他的值得钦佩的形而上学辩护词中所描绘的那种对抗的处境，那次卓有成效的捍卫使一部介绍形而上学的书《现象与实在》(Appearance Reality) 得以完成。

布拉德雷说，有人会对一个形而上学家说，形而上学知识整体而言是不可能的；即使在某种程度上是可能的，实际上它也决不是名副其实的知识。形而上学家还会听人说：“同样的问题，同样的争论，同样的彻底失败。为什么还不放弃这种知识？难道再也没有别的事值得你付出劳动了吗？”没有人会愚蠢到用同样语言讨论数学问题。数学的大部分真理都是显而易见的；数学的实际运用，如在桥梁、蒸汽机和发电机等正冲击着人们迟钝的想象。没有必要说服公众让他们相信数学是有用的。

这一切都以其独特的方式让数学家感到欣慰，而真正的数学家几乎不可能对此感到满足。任何一个真正的数学家一定会体会到，数学的真正美名并不是基于这些粗略的成就，数学之所以享有普遍的美名很大程度上是基于无知与混乱，因此，仍有必要对它进行更合理的辩解。不管如何，我有意来试试。我想这种辩解比起布拉德雷的艰难的辩白来，任务该会简单些。

接着我要问：“数学为什么值得人们进行认真的研究？一个数学家用一生的时间从事这些工作的充足理由是什么？”像人们希望一个数学家所回答的那样，在多数情况下，我会这么回答：我认为数学研究值得做，而且以数学家为职业的理由是充分的。但是同时我也要说明：我对数学的辩护也是为我自己辩护。我的辩

解在一定程度上是利己的。因为假如我真的把自己看作是一名失败的数学家，我就不认为对自己所研究的学科进行辩解是件值得做的事了。

在辩护中带着某种程度的利己主义的态度是难免的，我想，对这一点是用不着辩解的。我认为“谦卑”的人做不出优秀的工作。比方说，在任何一个学科里，教授的首要职责之一就是对自己这一学科的重要性以及自己本人在这一学科的重要性进行一点夸大。假如一个人总在问自己：“我所做的事是值得做的吗？”以及“我做这个合适吗？”这都会使自己永远无能而且也让别人泄气。这种人该把眼睛闭上一会儿，更多地考虑自己的学科和自己本人的情况，而不是更多地考虑学科与自己所应得的报酬。这不太困难，因为更加困难的是依靠紧闭眼睛来使自己的学科与自己本人不受他人所嘲笑。

§ 3

一个人在开始为自己的生活和活动的合理性进行辩解时，必须要认清两个问题。第一是他所做的工作是否值得做；第二则是他为什么要做这一工作，而并不在乎其价值。第一个问题常常很难且答案让人失望。而大多数人会觉得回答第二个问题却是十分容易的。如果这些人是诚实的话，他们通常会采取两种形式中的一种。第二种形式仅仅是第一种形式的更简略的变形。而第一种形式是我们需要考虑的惟一形式。

我之所以做我的事，因为这事是，而且是惟一的一件我完全可以做好的事。我是个律师，或者是一个股票经纪人，或者是一个职业板球手，这都是因为我对这一特别的工作有些真正的才能。我做律师，是因为我伶牙俐齿，而且对法律之微妙感兴趣；我做股票经纪人，是因为我对股市行情的判断迅速而准确；我做职业板球手，是因为我挥拍非同一般地好。有人说，我做个诗人或数学家也许更好，但不幸的是，我并没有才能做这样的工作。

我并不认为大多数人能够做出上述那样的辩解，因为多数人什么工作也做不好。可是只要这种辩解说得振振有词，它就很难反驳，事实上只有少数人能进行这样的辩解：也许只有 5% 或 10% 的人可做得不错。而只有极少数人可做得真正好。而能做好两件事的人只有寥寥无几的了。假如一个人有真正的才能，他就应该乐于牺牲几乎所有的一切，以充分发挥自己的才能。

约翰逊 (Johnson) 博士赞成这一观点，当我告诉他，我看过约翰逊 (与他同名的人) 骑在三匹马上，他说：“先生，这样的人应得到鼓励，因为他的表演显示了人类的能力限度……”

同样地，他会赞扬登山者，海峡泅渡者，闭目下棋者。至于我的看法，我也是将这些能力统统视为非常不一般的成绩。我甚至还称道魔术家和口技者；当阿廖欣 (Alekhine) 和布拉德曼 (Bradman) 在决定破记录时，假如他们失败了，我会

不管数学的任一分支是多么抽象，总有一天会应用在这实际世界上。

— 罗巴切夫斯基

极为失望的。在这种情况下, 约翰逊博士同我与公众的感觉是一样的。正像 W.J. 特纳 (Turner) 曾说过的一句实话那样: 只有那些自以为“博学”的人 (令人产生不悦之感之称谓), 才不去赞扬“真正的名家”。

当然我们不能不考虑到以上两种工作之间价值上的不同。我宁愿做一个小说家或画家, 而不愿成为政治家或诸如此类的人物。事实上, 尽管有很多成名之路, 但我们大部分人会因其甚为有害而宁可拒绝走这样的路。但是这种价值的不同, 很少会改变一个人的择业范围, 因为这种职业的选择是受着人们生就的能力限度的制约的。诗集比板球更有价值, 但假如布拉德曼放弃板球去写二流小诗 (我想, 他不大可能会写得更好) 的话, 他一定是个傻瓜。假如他的板球打得并不那么超众, 而诗歌却还写得好些, 那么对他来说选择就更加困难了。我不知道自己是成为特朗普尔 (Trumper) 还是布鲁克 (Brooke)。值得庆幸的是像这种左右为难的情况很少出现。

我还想补充说一点, 他们特别不可能指望自己成为数学家。人们常常过分夸大数学家与其他人的思维过程的不同。但不容否认的是, 对一个数学家来说, 他的天赋是他诸多特殊才能中的一方面。数学家们作为一个阶层, 并不因一般的能力和多才多艺而格外超群出众。假如一个人成为任何意义上的真正的数学家, 那么, 可以说他的数学百分之九十九会比他能做的任何其他事都好得多。而假如他为了做其他领域的普通工作, 而放弃了任何一次发挥自己才能的适宜的机会, 那么他就是愚蠢的。这样的牺牲, 只有在经济需要或年龄条件变化的情况下才是情有可原的。

§ 6

现在应该考虑在 § 3 我所谈到的问题了。这个问题比第二个问题难得多。数学, 即我和别的数学家所认为的数学这一学科, 是否值得研究? 假如值得, 理由是什么? 我一直在回顾着我的一篇讲稿的头几页 (那是我于 1920 年在牛津大学就职时的首次演讲稿)。在那几页中我写到了有关对数学进行辩解的要点。这种辩解是不够的 (只写了不足两页纸), 而且其文体风格现在看来并不使我感到特别自豪 (我想, 这可能是我用当时想象为“牛津”风格写成的第一篇论文)。但是我仍然觉得, 不论它需要怎样改进, 它还是包含了问题的实质。这里我愿重新把原来说过的话拿来作为全面讨论的前言。

(1) 首先我要强调数学的“无害性”。也就是说, “即使数学研究无利可图, 但它也绝对是有害而清白的职业”。我坚持这一点, 当然它需要大量的扩展和解释。

数学真的是无利可图吗? 显然, 在某种意义上并非如此。比如, 它为不少的人带来了很大的快乐。然而我是从更狭隘的意义上考虑所谓“利益”的。数学是否有用, 是否像化学和生理学等其他科学那样有直截了当的用途? 这并不是一

关于这个宇宙最让人难以理解的地方就是她竟然是可以被理解的。
——爱因斯坦

个容易回答或无可争议的问题。尽管有一些数学家和大多数外行会毫无疑问地作出肯定的回答，但我最终的回答还会是否定的。那么数学是“无害”的吗？对此，回答也是不确定的。在某种意义上我宁可回避这个问题。其理由是它提出了科学对战争的影响问题。例如，化学在这方面显然是有害的，那么是否可以说数学在同样的意义上是“无害”的？以后我一定回头再来谈这两个问题。

(2) 当时我还接着说“宇宙的范围很大，所以，如果我们在浪费着自己的时间，那么浪费大学里几位名家、教授的生命决不会带来了不起的大灾大难”。这里我或许像是要采取或故意装出虚伪的谦卑态度，而这种态度是我刚刚所反对的。我确信，这种态度并不是我真正意愿中的态度，我是企图用一句话把我在 § 3 里所谈的冗长的内容概括出来。我在想，我们这些名家、教授确实没有多少才能，而我们应尽可能地充分发挥运用这些才能才是。

(3) 最后 (以一些对我来说如今读起来仍感夸张的修辞)，我强调了数学成就的持久性 - 我们所做的工作也许很少，但都有着某种持久性的特点；我们所完成的任何事情，无论是一本诗集还是一条几何定理，只要能引起哪怕是最微小的但却是永久的兴趣，也就意味着已经做出了完全超出大部分人的能力的事情。

我还写道 - 在古代与现代研究有冲突的今天，对于某一门研究来说，一定存在某些值得一谈的东西，而这种研究并非始于毕达哥拉斯，也不会止于爱因斯坦，但它却是所有研究学科中最古老的，也是最年轻的。

所有这一切都是“言过其实”的，但在我看来，其实质仍包含着真理，对此，我可以马上进行扩展，同时又不致过早涉及我所留下的其他没有回答的问题。

§ 19

我现在必须回到我的牛津讲演上，对在 § 6 尚未谈及的问题作一些说明。从以上论述读者可以看到，我只对把数学当作一种创造性艺术感兴趣，但有很多问题还值得考虑，尤其是数学的“实用性”，它曾引起许多争议。此外还有必要检查一下数学是否真如我在牛津演讲中提到的那样“百利而无一害”，如果科学或艺术的发展能增加资源、方便人类，或增加人们情感上的愉悦，那么我们就可以认为它们是“有用”的。医学和生理学能减轻病痛，所以是有用的；工程设计能建筑高楼、桥梁，从而提高生活水平 (当然工程设计也会带来害处，但此处暂不涉及)，所以也是有用的。依此来看，数学也必然是有用的，工程师如没有数学基础是无法进行工程设计的，数学也正开始运用于生理学中。因此我们有为数学作辩护的依据，虽说并不完备，但值得去钻研。数学应用的更高层次，即运用于各种创造性艺术中，将与我们的研究无关。数学如同诗歌、音乐一样，能训练并陶冶人的性情，所以对数学家或数学爱好者来说，沉迷于其中，其乐也融融。不过，如从这方面去论证数学的用处，只不过是更为详尽地重复我的老话，而现在要考

优秀的数学家在定理或理论之间看到了类似，卓越的数学家则从类似中间看到了类似。

— 巴拿赫

虑的应是数学的原始的应用。

§ 20

这一切似乎是不言而喻的,但就这样也有不少争议,因为大多数“有用”的学科对我们中的多数人来说往往是学而无用的。生理学家和工程师对社会功用不小,但对常人来说,生理学和工程学并无多大用处(尽管他们的学习也许会基于其他原因),就我自己来说,我从未发现我拥有的纯数学之外的科学知识给我带来过些微的益处。

事实上我们不得不诧异,科学知识给普通人带来的实用价值是如此之小,如此乏味,而且毫无特色,其价值似乎与其在外的功用名声成反比。如果在简单的算术上反应快,是会很有用的;懂一点法语、德语,懂一点历史、地理或经济学知识也会是有用的;但仅懂一点化学、物理或生理学,在日常生活中却毫无用处。不用知道气体的组成我们便可以知道它会燃烧;汽车坏了我们自然送到修车厂去;胃不舒服会去看医生或去药店买药。我们的生活要么自有其规律操纵,要么需要各行各业人的帮助。

然而,这只是枝节问题,一个教育的问题,只有教师们对它感兴趣,因为他们必须说服那些为自己孩子的“有用的”教育而喋喋不休的父母们。当然,我们说生理学有用,并非鼓吹大多数人去学习生理学,但如有一定数量的专家致力于生理学的发展、研究,将会使绝大多数人受益。重要的问题是,数学的有用性究竟能延及多远?哪些数学领域有用性最强?怎样才能仅仅以这种“有用性”为理由,来为认真的数学研究,即数学家们所理解的数学研究进行辩护?

§ 21

我将作出的结论到这里似乎是显而易见的了,所以我先武断地将它表述出来,再对之详述。不可否认,初等数学中的很大一部分 - 我用的“初等”一词是职业数学家使用的那种意思,它包括诸如有关微积分等应用知识 - 是具有一定使用价值的。数学中的这些部分整体来说是比较枯燥的,它们是最乏美学价值的部分。“真正”的数学家所研究的“真正”的数学,如费马、欧拉、高斯和阿贝尔所研究的数学,几乎是完全“无用”的。(这一点对“应用”数学和“纯”数学来说都是如此。)以“实用性”为标尺来衡量一个天才数学家的工作是不可能的。

但是这里我要纠正一个错误概念。有人认为纯数学家以其工作的无用性为荣,并宣称他们的工作没有实际应用价值。这种念头是基于高斯的一句不谨慎的话,其大意是:如果数学是科学中的皇后,那么数论由于其极端无用性而成为数学中的皇后 - 我从没能找到这话的确切引用。我敢肯定高斯的原话(如果真的是他说的)被很粗鲁地曲解了。如果数论能够被应用于任何实用的、显赫的目的,如果它能像物理甚至化学那样直接增加人类的欢乐和减少人类的痛苦,那么高斯或

二分之一一个证明等于 0。

— 高斯

其他数学家决不会愚蠢到为这种应用哀叹或后悔。但是科学可为善服务，也可为恶助纣（特别是在战争时期），这样高斯和另一些数学家就应该庆幸有一种科学，就是他们的科学，由于其远离人类日常的活动而保留了其纯洁性。

§ 23

纯数学和应用数学间最大的差异也许表现在几何学方面。纯几何学科包括很多分支，如射影几何、欧几里得几何、非欧几何，等等。每一种几何都是一种模型，即概念构成的造型，应该按照各个独特造型的意义和美加以鉴别。几何是一幅图像，是很多方面的合成成品，也是数学实在的一部分，并且是一个不完全的副本（然而，在其范围内又是准确的副本）。但是现在对我们最重要的一点是：纯几何学无论如何也不能描写物理世界的时空实体，因为地震和日食不是数学概念。

这些话对于外行来说可能有点矛盾，但对于一个几何学家来说则是真理，我可以举一个形象的例子来加以说明。假如我作一个有关几何学的讲座，例如普通的欧几里得几何，我会在黑板上画一些图形，一些直线、圆或椭圆的草图来激发听众的想象。显然，我画图的质量不会对我所证明的定理有什么影响，图形的作用只是将我的意思明白地传达给听众，如果我已做到这一点，那么让技巧高超的画师来重画一遍是毫无必要的，它们只是辅助教学的工具，不是讲座的实质内容。

让我们再进一步。我讲课的教室是物理世界的一部分，有其固定的形状。对于这种形状以及对于物理世界的一般形状的研究本身就是科学，可称之为“物理几何”。假设现在有一个高功率的发电机，或一个巨大的引力体搬进教室，物理学家就会告诉我们教室的几何结构已改变，它的整个物理造型已经轻微但确实被改变了。那么我所证明的定理是否也变得错误了？我的求证当然是没受影响的，这就像莎翁的剧作不会由于读者不小心将茶泼在某一页上而改变一样。剧本是独立于所印刷的纸张的，“纯几何”也是独立于教室或物理世界的其他部分的。

这是纯数学家的观点。应用数学家、数学物理学家自然是另一种看法，因为物理世界（也有其结构和形状）已经在他脑中先入为主了，对于这种形状我们不能像描述纯几何学那样确切描绘，但是我们能说出几点名堂来。我们可以精确或粗略地描绘出它的组成部分之间的关系，并把这种关系与某些纯几何体系的组成间精确的关系作一个比较，这样我们也许可以找出两种关系间的相似之处，那么我们面前就会有一幅“符合物理世界的事实”的图来。几何学家给物理学家提供了一整套可供选择的图形，这当中可能某一幅图比其他的更符合事实，于是提供这幅图的几何学就成了应用数学家最重要的几何学。我可以补充一句，即使是纯数学家也会对这种几何学更加欣赏，因为还没有哪个数学家纯到对物理世界毫无兴趣的地步。但是，一旦他屈服于这种诱惑，他就放弃了他纯数学的立场。

我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身，这种伦理基础，我叫它猪栏的理想。

— 爱因斯坦

史济怀教授访谈

0301 刘阔

在科大数学系，没有听过史济怀先生数分课的同学恐怕是少之又少的——事实上，不论先生是否教大家，只要有机会，“蹭课”的同学绝对是大有人在的。史先生的课堂总是坐得满满的：本系的、外系的；本届的、上届的；甚至外校的同学，读研的同学……个个仔细聆听，认真笔记。每临学期终了，同学们也总是团团围住史先生，请他在他和常庚哲先生编著的《数学分析》上签名留念……先生深入浅出的讲解，淡然谦逊的风度，相信每个上过他数分课的同学都有深深的体会，都难以忘怀。

带着对先生深深的尊敬，我们有幸在近日采访了他。

早在 1958 年科大创建时，先生就来到了科大。回忆起科大当年下迁合肥时的情景，先生说，当时的科大都是泥巴路，校园是很荒芜的，以致农民们放牛都会常常进到科大。学校修围墙，常常是今天刚修好，明天就添了几个洞——附近的居民把砖头敲去自家用了。科大就是在那样艰苦的环境下一点点发展起来的。

先生在科大教书已经 48 年了，其间不知上过多少节课，教过多少学生。问及先生当老师的体会，先生说，“我们科大有句话，‘今天我以科大为荣，明天科大以我为荣’，当老师教学生也差不多是这样。77，78 级第一届少年班，我教他们高等数学。当时他们是十几岁的小孩，我四十几岁；去年他们回科大，他们四十几岁了，有的还带着自己的小孩，我成老头子了。”说罢就哈哈的笑起来。史先生谈到这两届学生中，出了不少人才，其中就有微软的全球副总裁张亚勤，还有德意志银行上海分行的总经理，还有……史先生依稀回忆起当年的情景，非常感慨。

史先生说，教学生的效果短时间里是看不出来的。可是如今，看到几十年前的学生现在都那么有成就，相信先生心里一定是倍感欣慰的吧。先生说，“我为什么喜欢教本科生呢？就是因为和你们在一起特别高兴，觉得你们当中一定能培养出一批人才。至于这个人才是张三还是李四，就要靠自己的勤奋努力了，光靠小聪明是成不了才的！”

史先生 1935 年出生，经历了“反胡风”、“反右”、“大跃进”、“文化革命”等等运动，用他自己的话说，他们是什么运动都经历过的一代人。史先生还能清晰的记得大跃进时，全国钢铁总产量计划要从 535 万吨翻一番达到 1070 万吨，高楼上到处写着 1070；除四害时，大家在厕所旁抓蛆，围追麻雀，麻雀被迫得飞不

A Proof of Finite Sum Theorem Using the Concept of Ultrafilter

0201 Lei Tao

In this discussion we aim towards a proof of a celebrated result in combinatorial number theory, the Finite Sum Theorem. Originally proven by Professor N.Hindman with number theoretic techniques, we here show a proof that involves a unique synthesis of topology and algebra. We state the theorem:

Theorem 1 (Finite Sum Theorem(Hindman)) *Let $\{A_i\}_{i=1}^k$ be a finite partition of the set of natural numbers N . There exists an A_i that contains an infinite sequence whose finite, nonrepeating sums remain in A_i .*

We will need the very useful concept of **ultrafilter** from set-theoretic topology.

Definition 1 *Let X be a set. A nonempty family $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ is a **filter** provided:*

- (1) $F \in \mathcal{F}$ implies $F \neq \emptyset$
- (2) $F, G \in \mathcal{F}$ implies $F \cap G \in \mathcal{F}$
- (3) $F \in \mathcal{F}, G \in \mathcal{P}(X)$ and $G \supset F$ imply $G \in \mathcal{F}$ (Superset Property)

Definition 2 *A filter \mathcal{F} on a set X is an **ultrafilter** if it is a maximal element in the set of all filters on X , partially ordered by inclusion. I.e, \mathcal{F} is not contained in any strictly larger filter on X .*

If \mathcal{U} is an ultrafilter then it contains so many subsets of X that for all $A \subset X$ either $A \in \mathcal{U}$ or $X \setminus A \in \mathcal{U}$.

Let $\beta N = \{\mathcal{U} : \mathcal{U} \text{ is an ultrafilter on } N\}$.

For a given $n \in N$, $\mathcal{U} = \{A \subset N : n \in A\}$ is an ultrafilter on N . These are *principal* ultrafilters.

A Topological Structure on βN :

For $A \subset N$, set $A^* = \{\mathcal{U} \in \beta N : A \in \mathcal{U}\}$. Then the set $\{A^* : A \subset N\}$ forms a basis

A general approach rate to the strong law of large numbers

0217 Hu Ming

We obtain the strong growth rate for the sum S_n of random variables by using a Hajek-Renyi type maximal inequality. Under the same conditions as that in Fazekas and Klesov (Theory Probab. Appl. 45 (2000) 436), we get sharper results for some dependent sums.

Introduction

The strong law of large numbers (SLLN) asserts that a sequence of cumulative sums of random variables becomes "nonrandom" by normalizing it by an appropriate sequence of nonrandom numbers and approaching the limit. Many results of this type were obtained for both independent and dependent summands forming cumulative sums.

There are two basic approaches to prove the strong law of large numbers. The first is to prove the desired result for a sub subsequence and then reduce the problem for the whole sequence to that for the subsequence. In so doing, a maximal inequality for cumulative sums is usually needed for the second step. Note that maximal inequalities make up a well-developed branch of probability theory and many inequalities are known for different classes of random variables.

The second approach is to use directly a maximal inequality for normed sums. Inequalities of this kind are said to be of Hajek-Renyi type, referring to the paper by Hajek and Renyi devoted to independent summands. However, after a Hajek-Renyi inequality is obtained, the proof of the strong law of large numbers becomes an obvious problem.

In this paper, our goals are to show that a Hajek-Renyi type inequality is, in fact, a consequence of an appropriate maximal inequality for cumulative sums and to show that the latter automatically implies the strong law of large numbers. Most important, we made no restriction on the dependence structure of random variables.

Recently, Fazekas and Klesov obtained a Hajek-Renyi type maximal inequality. Then they proved the strong law of large numbers for general summands, and give some applications for dependent summands. In this paper, we study the strong growth rate for sums of random variable under the same conditions as that in Fazekas and Klesov. We get sharper results for some dependent random variable sums.

Hajek-Renyi type maximal inequality and strong law of large numbers

Lemma 1 (*Hajek-Renyi type maximal inequality*) Let β_1, \dots, β_n be a nondecreasing sequence of positive numbers. Let $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ be nonnegative numbers. Let r be a fixed positive number. Assume that for each m with $1 \leq m \leq n$

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq m} |S_l| \right]^r \leq \sum_{l=1}^m \alpha_l \quad (1)$$

Then

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right| \right]^r \leq 4 \sum_{l=1}^n \frac{\alpha_l}{\beta_l^r} \quad (2)$$

Proof First, we multiply β_1^r on both side of (2). Since $\beta_1 > 0$, (2) holds true if and only if

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l/\beta_1} \right| \right]^r \leq 4 \sum_{l=1}^n \frac{\alpha_l}{(\beta_l/\beta_1)^r}$$

So we can suppose that $\beta_1 = 1$.

Let $c = 2^{1/r}$. Consider the sets

$$A_i = \{k : c^i \leq \beta_k < c^{i+1}\}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Because $\beta_1 = c^0 = 1$, we notice that $1 \in A_0$, $A_0 \neq \emptyset$. Using A_i , we can separate $1, \dots, n$ into some pieces.

Denote by $i(n)$ the index of the last nonempty A_i . When i is large enough such that $\beta_n < c^i$, $A_i = \emptyset$. So $i(n) < \infty$. If A_i is nonempty, let $k(i) = \max\{k : k \in A_i\}$, $i = 0, 1, 2, \dots$, while $k(i) = k(i-1)$ if A_i is empty. Let $k(-1) = 0$.

If A_l is nonempty, let

$$\delta_l = \sum_{j=k(l-1)+1}^{k(l)} \alpha_j, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

where δ_l is considered to be zero if A_l is empty.

For a fixed ω_0 , there exists some l_0, A_{i_0} such that $l_0 \in A_{i_0}$, and:

$$\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r (\omega_0) = \left| \frac{S_{l_0}}{\beta_{l_0}} \right|^r (\omega_0) \leq \max_{l \in A_{i_0}} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r (\omega_0) \leq \sum_{i=0}^{i(n)} \max_{l \in A_i} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r (\omega_0)$$

The inequality above holds true for almost every $\omega_0 \in \Omega$. After take expectation on both sides, the inequaltiy still holds true. We have:

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right] \leq E \left[\sum_{i=0}^{i(n)} \max_{l \in A_i} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right] = \sum_{i=0}^{i(n)} E \left[\max_{l \in A_i} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right]$$

Since $i(n) < \infty$, we can change the sum and expectation. According to the definition of A_i , when $l \in A_i$, $\beta_l \geq c^i$, so $\beta_l^{-r} \leq c^{-ir}$. We have:

$$\sum_{i=0}^{i(n)} E \left[\max_{l \in A_i} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right] \leq \sum_{i=0}^{i(n)} c^{-ir} E \left[\max_{l \in A_i} |S_l|^r \right]$$

Since $k(i) = \max\{k : k \in A_i\}$, $i = 0, 1, 2, \dots$, we notice that $A_i \subset \{1, \dots, k(i)\}$. Using the condition (1), we have:

$$E \left[\max_{l \in A_i} |S_l|^r \right] \leq E \left[\max_{1 \leq l \leq k(i)} |S_l|^r \right] \leq \sum_{l=1}^{k(i)} \alpha_l$$

$$\sum_{i=0}^{i(n)} c^{-ir} E \left[\max_{l \in A_i} |S_l|^r \right] \leq \sum_{i=0}^{i(n)} c^{-ir} \sum_{k=1}^{k(i)} \alpha_k$$

According to the defintion of δ_l and change the order of sum, we have:

$$\sum_{i=0}^{i(n)} c^{-ir} \sum_{k=1}^{k(i)} \alpha_k = \sum_{i=0}^{i(n)} c^{-ir} \sum_{l=0}^i \delta_l = \sum_{l=0}^{i(n)} \delta_l \sum_{i=l}^{i(n)} c^{-ir}$$

Now we get the inequality:

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right] \leq \sum_{l=0}^{i(n)} \delta_l \sum_{i=l}^{i(n)} c^{-ir} \leq \sum_{l=0}^{i(n)} \delta_l \sum_{i=l}^{\infty} c^{-ir} = \frac{1}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} \delta_l c^{-lr}$$

According to the definition of δ_l , we have:

$$\frac{1}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} \delta_l c^{-lr} = \frac{1}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} c^{-lr} \sum_{j=k(l-1)+1}^{k(l)} \alpha_j$$

On earth there is nothing great but man; in man there is nothing great but mind.

— William Rowan Hamilton

Using the definition of A_i , when $j \in A_l$, $\beta_j < c^{l+1}$, we have:

$$\begin{aligned} E \left[\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right|^r \right] &\leq \frac{1}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} c^{-lr} \sum_{j=k(l-1)+1}^{k(l)} \alpha_j \\ &\leq \frac{1}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} c^{-lr} \sum_{j=k(l-1)+1}^{k(l)} c^{(l+1)r} \frac{\alpha_j}{\beta_j^r} \\ &= \frac{c^r}{1 - c^{-r}} \sum_{l=0}^{i(n)} \sum_{j=k(l-1)+1}^{k(l)} \frac{\alpha_j}{\beta_j^r} = 4 \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{\beta_k^r} \end{aligned}$$

This completes the proof.

Lemma 2 (*Fazekas-Klesov strong law of large numbers*) Let b_1, b_2, \dots be a nondecreasing unbounded sequence of positive numbers. Let $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ be nonnegative numbers. Let r be a fixed positive number. Assume that for each $n \geq 1$

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right]^r \leq \sum_{l=1}^n \alpha_l \quad (3)$$

if $\sum_{l=1}^{\infty} (\alpha_l / b_l^r) < \infty$, then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{b_n} = 0 \quad a.s. \quad (4)$$

Proof Case 1: We assume that there exists an integer m , such that $\alpha_n = 0$, $n \geq m$. Using condition (3), for all $n > 1$, we have:

$$E \left[\max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right]^r \leq \sum_{l=1}^m \alpha_l$$

Let $n \rightarrow \infty$. By monotone convergence theorem, we get change the order of limitation and expectation:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right]^r = E \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right]^r = E \left[\sup_{n \geq 1} |S_n| \right]^r \leq \sum_{l=1}^m \alpha_l < \infty$$

So we get:

$$\sup_{n \geq 1} |S_n|^r < \infty \quad a.s.$$

For almost every $\omega_0 \in \Omega$,

$$\frac{|S_n(\omega_0)|}{b_n} \leq \frac{\sup_{n \geq 1} |S_n(\omega_0)|}{b_n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

So we have the conclusion:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{b_n} = 0, \quad a.s.$$

Case 2: We assume that $\alpha_n > 0$ for an infinite number of indices n . Set:

$$v_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\alpha_k}{b_k^r}, \quad \beta_n = \max_{1 \leq k \leq n} b_k v_k^{1/2r}$$

It is easy to see that $0 < v_n < \infty$, for all $n \geq 1$, and v_n is a decreasing sequence. Using the mean value theorem: $\forall 0 < \alpha < 1$, there exists $\xi \in (v_{n+1}, v_n)$, such that:

$$v_n^{1-\alpha} - v_{n+1}^{1-\alpha} = (1-\alpha)(v_n - v_{n+1})\xi^{-\alpha} \geq (1-\alpha) \frac{\alpha_n}{b_n^r v_n^\alpha}$$

Sum from 1 to ∞ , we have:

$$(1-\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{b_n^r v_n^\alpha} < v_1^{1-\alpha} - \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1}^{1-\alpha} = v_1^{1-\alpha} < \infty$$

At the same time, we notice that $v_k \rightarrow 0$, since $\sum_{k=1}^{\infty} v_k < \infty$. $\forall \varepsilon > 0$, there exists $N \in \mathbb{N}$, such that when $i > N$, $v_i^{1/2r} < \varepsilon$. When k is large enough, we have:

$$\frac{\beta_k}{b_k} \leq \frac{\max_{1 \leq i \leq N} b_i v_i^{1/2r}}{b_k} + \frac{\max_{N+1 \leq i \leq k} b_i v_i^{1/2r}}{b_k} \leq \frac{\max_{1 \leq i \leq N} b_i v_i^{1/2r}}{b_k} + \varepsilon$$

Let $k \rightarrow \infty$, we have $\beta_k/b_k < \varepsilon$. Let $\varepsilon \rightarrow 0$, we prove that $\lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k/b_k = 0$

So the sequence $\{\beta_n, n \geq 1\}$ is such that

- (a) $\beta_k < \beta_{k+1}, k = 1, 2, \dots$;
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k/\beta_k^r \leq \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k/b_k^r v_k^{1/2} < \infty$
- (c) $\lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k/b_k = 0$

Then Lemma 1 implies that (2) is satisfied. Therefore, $E[\sup_{l \geq 1} |S_l/\beta_l|]^r \leq 4 \sum_{l=1}^{\infty} \alpha_l/\beta_l^r < \infty$. This implies $\sup_{l \geq 1} |S_l/\beta_l| < \infty$, a.s.

Finally,

$$0 \leq \left| \frac{S_l}{b_l} \right| = \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right| \frac{\beta_l}{b_l} \leq \left\{ \sup_{l \geq 1} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right| \right\} \frac{\beta_l}{b_l} \rightarrow 0, \quad a.s. \quad as \quad l \rightarrow \infty$$

The lemma is proved. □

Number theorists are like lotus-eaters - having tasted this food they can never give it up.

—Leopold Kronecker

Strong growth rate of random sequence under moment conditions

Lemma 3 (*Dini Theorem*) Let c_1, c_2, \dots be nonnegative numbers, $v_n = \sum_{k=n}^{\infty} c_k$, if $0 < c_n < \infty$ for $n \geq 1$, then

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{v_n^\delta} < \infty, \quad \forall 0 < \delta < 1 \quad (5)$$

Proof Let $f(x) = x^{1-\delta}$, $x > 0$, $0 < \delta < 1$, then $f'(x) = (1-\delta)/x^\delta$. By the mean value theorem, there exists a $\xi \in (b, a)$, such that $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. Take $b = v_n$, $a = v_{n+1}$, then we have:

$$v_n^\delta - v_{n+1}^\delta = (1-\delta)(v_n - v_{n+1})/\xi^\delta \geq (1-\delta)c_n/v_n^\delta, \quad \xi \in (v_n, v_{n+1})$$

Thus:

$$(1-\delta) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{v_n^\delta} \leq v_1^\delta - \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1}^\delta = v_1^\delta < \infty$$

Then the lemma is proved. \square

Theorem 1 Let b_1, b_2, \dots be a nondecreasing unbounded sequence of positive numbers and $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ be nonnegative numbers. Let r and C be fixed positive numbers. Assume that for each $n \geq 1$

$$E \left(\max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right)^r < C \sum_{l=1}^n \alpha_l \quad (6)$$

$$\sum_{l=1}^{\infty} \frac{\alpha_l}{b_l^r} < \infty \quad (7)$$

then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{b_n} = 0 \quad a.s. \quad (8)$$

and with the growth rate

$$\frac{S_n}{b_n} = O \left(\frac{\beta_n}{b_n} \right) \quad a.s. \quad (9)$$

where

$$\beta_n = \max_{1 \leq k \leq n} b_k v_k^{\delta/r} \quad \forall 0 < \delta < 1, \quad v_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\alpha_k}{b_k^r}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta_n}{b_n} = 0 \quad (10)$$

Proof 1) First we assume that there exists an integer m such that $\alpha_n = 0$ for $n \geq m$, thus $\beta_n = \max_{1 \leq k \leq m} b_k v_k^{\delta/r}$ for $n \geq m$. By monotone convergence theorem, we have

$$E \left(\sup_{n \geq 1} |S_n| \right)^r = \lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\max_{1 \leq l \leq n} |S_l| \right)^r \leq C \sum_{l=1}^m \alpha_l < \infty,$$

thus $\sup_{n \geq 1} |S_n| < \infty$, a.s., and this easily gives (8)-(10).

2) We assume that $\alpha_n > 0$ for infinitely many n . By (7) and Lemma 3, we know that $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n / b_n^r v_n^\delta < \infty$, it is easy to see that $0 < \beta_k \leq \beta_{k+1}$ for $k \geq 1$, and $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n / \beta_n^r \leq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n / b_n^r v_n^\delta < \infty$,

$$\frac{\beta_k}{b_k} \leq \frac{\max_{1 \leq l < k_1} b_l v_l^{\delta/r}}{b_k} + \frac{\max_{k_1 \leq l \leq k} b_l v_l^{\delta/r}}{b_k} \leq \frac{\max_{1 \leq l < k_1} b_l v_l^{\delta/r}}{b_k} + v_{k_1}^{\delta/r},$$

by (7) and $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, we get $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n / b_n = 0$. (6) and Lemma 2 imply that

$$E \left(\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right| \right)^r \leq 4C \sum_{l=1}^n \frac{\alpha_l}{\beta_l^r} \leq 4C \sum_{l=1}^{\infty} \frac{\alpha_l}{\beta_l^r} < \infty,$$

hence by monotone convergence theorem, we have

$$E \left(\sup_{n \geq 1} \left| \frac{S_n}{\beta_n} \right| \right)^r = \lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\max_{1 \leq l \leq n} \left| \frac{S_l}{\beta_l} \right| \right)^r \leq 4C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n^r} < \infty,$$

so that $\sup_{n \geq 1} |S_n / \beta_n| < \infty$, a.s., and

$$0 \leq \left| \frac{S_n}{b_n} \right| \leq \frac{\beta_n}{b_n} \sup_{n \geq 1} \left| \frac{S_n}{\beta_n} \right| = O \left(\frac{\beta_n}{b_n} \right), \quad \text{a.s.},$$

this completes the proof. □

Reference

- [1] Hajek, J., Renyi, A., 1955. Generalization of an inequality of Kolmogorov, Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 6, 281-283.
- [2] Fazekas, I., Klesov, O., 2000. A general approach to the strong law of large numbers. Theory Probab. Appl. 45, 436-449.

从局部最短到整体最短

0201 张鹏飞

摘要：测地线是所有几何及相关科学中的核心概念。在几何上测地线的特征是局部最短性。对一条给定的测地线，我们比较关心它在什么标准下具有特定的最短性的。本文通过引入一些很自然的概念来描述这件事情，然后给出那些最常见的例子的有关最短性质结论。

引言 - 从局部最短出发

设 (M, g) 是 n 维定向黎曼流形，其黎曼度量为 g 。设 D 为 M 上的 Levi-Civita 联络。则 $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ 且曲率算子 $R_{XY} = D_{[X, Y]} - [D_X, D_Y]$ 。

给了一条曲线 $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ 后，我们问：在 M 上所有连接 $p = \gamma(a)$ 到 $q = \gamma(b)$ 的曲线中 γ 是不是最短的？有如下的考虑：

(1) 在 $\gamma(a)$ 的一个充分的小邻域内 (q 离 p 很近)。这时我们可以计算看它是不是满足测地线方程。这时最短性其实就是指数映射的性质。

(2) 在 γ 的一族临近曲线中（比如在管状邻域中）。由于一条不光滑的曲线在经过适当的光滑化之后总能得到更短的曲线，那么我们只需要把那些光滑的曲线拿过来比较它们的长短。这时一个有效的办法是计算变分，在微积分中我们已经很熟悉了。

如果考虑大范围上的最短性，用变分的方法就不够了。因为把流形 M 某点“吹大”之后，通过该点的最短测地线的最短性就被破坏了。扰动后最短的线将分成几个方向向山脚滑落（视吹大的那个点为山峰）。控制扰动的形状就可以得到整体上不是最短但在临近曲线中最短的线。因为变分只是在临近曲线中考虑的，在大范围上还没有很有效的方法。作为变通引入一个整体最短性的几何定义：割点。

Hodge 星算子及其性质

0201 孙俊

Hodge 星算子是微分几何中十分重要的一个算子, 有了 Hodge 星算子的定义, 我们就可以定义余微分算子, 进而定义流形上的 Laplace-Beltrami 算子, 最终可得到著名的 Hodge 分解定理。本文的主要目的是介绍 Hodge 星算子的定义及其基本性质。

设 (M, g) 是 m 维定向黎曼流形, 其黎曼度量为 g 。考虑 M 上任一坐标图 (U, φ, x^i) , 我们有

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j \quad (11)$$

$$g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right)$$

以下若无特别说明, 指标取值范围总是 $1, \dots, m$ 。

易知 M 的体积元 η 可以表示成

$$\eta = \sqrt{G} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m, \quad G = \det(g_{ij}) \quad (12)$$

为了便于计算, 我们引入 Kronecker 符号

$$\delta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} = \det \begin{pmatrix} \delta_{j_1}^{i_1} & \delta_{j_2}^{i_1} & \dots & \delta_{j_r}^{i_1} \\ \delta_{j_1}^{i_2} & \delta_{j_2}^{i_2} & \dots & \delta_{j_r}^{i_2} \\ \dots & \dots & & \dots \\ \delta_{j_1}^{i_r} & \delta_{j_2}^{i_r} & \dots & \delta_{j_r}^{i_r} \end{pmatrix} \quad (13)$$

当 $r=1$ 时, 这就是通常的 Kronecker delta δ_j^i , 由定义式(3)直接看出, Kronecker 符号具有以下性质:

1. $\delta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r}$ 关于指标 (i_1, \dots, i_r) 或 (j_1, \dots, j_r) 是反称的;
2. 若 $i_1 < \dots < i_r, j_1 < \dots < j_r$, 则 $\delta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} = \delta_{j_1}^{i_1} \dots \delta_{j_r}^{i_r}$;
3. $\delta_{j_1 \dots j_r}^{i_1 \dots i_r} = \begin{cases} 0, & \text{若 } (j_1, \dots, j_r) \text{ 不是 } (i_1, \dots, i_r) \text{ 的置换;} \\ 1, & \text{若 } (j_1, \dots, j_r) \text{ 是 } (i_1, \dots, i_r) \text{ 的偶置换;} \\ -1, & \text{若 } (j_1, \dots, j_r) \text{ 是 } (i_1, \dots, i_r) \text{ 的奇置换。} \end{cases}$

体积元 η 作为 M 的 m 次形式, 可写成

$$\eta = \sum_{i <} \eta_{i_1 \dots i_m} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_m} = \frac{1}{m!} \eta_{i_1 \dots i_m} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_m} \quad (14)$$

其中

$$\sum_{i <} \equiv \sum_{i_1 < \dots < i_m}$$

表示指标按大小顺序排列后求和, 且

$$\eta_{i_1 \dots i_m} = \sqrt{G} \delta_{i_1 \dots i_m}^{1 \dots m} \quad (15)$$

显然 $d\eta=0$, 由于 $\eta_{i_1 \dots i_m}$ 是 $(0, m)$ 型张量的分量, 故

$$\eta_{i_1 \dots i_m, k} = \frac{\partial \eta_{i_1 \dots i_m}}{\partial x^k} - \sum_{t=1}^m \Gamma_{i_t k}^l \eta_{i_1 \dots i_{t-1} l i_{t+1} \dots i_m}$$

为 $(0, m+1)$ 型张量的分量。又 $\dim M = m$, 故有

$$\eta_{i_1 \dots i_m, k} = 0 \quad (16)$$

用 $A^r(M)$ 表示 M 上 r 形式构成的向量空间, 我们定义 Hodge 星算子 $*$: $A^r(M) \longrightarrow A^{m-r}(M)$ 如下:

定义 1 设 $\alpha \in A^r(M), 0 \leq r \leq m$, 局部可表示为

$$\alpha = \sum_{i <} \alpha_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r} = \frac{1}{r!} \alpha_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r} \quad (17)$$

定义 $*\alpha \in A^{m-r}(M)$ 是

$$*\alpha = \sum_{j <} *\alpha_{j_{r+1} \dots j_m} dx^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge dx^{j_m} \quad (18)$$

其中

$$*\alpha_{j_{r+1} \dots j_m} = \sum_{i <} \eta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m} \alpha^{i_1 \dots i_r} \quad (19)$$

$$\alpha^{i_1 \dots i_r} = g^{i_1 k_1} \dots g^{i_r k_r} \alpha_{k_1 \dots k_r}, \quad (g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}$$

$*\alpha$ 称为 α 的伴随形式。

设 $\beta \in A^r(M)$,

$$\beta = \sum_{i <} \beta_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r} \quad (20)$$

定义 2 r 次形式 α 和 β 的局部内积 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \sum_{i <} \alpha^{i_1 \dots i_r} \beta_{i_1 \dots i_r} = \frac{1}{r!} \alpha^{i_1 \dots i_r} \beta_{i_1 \dots i_r} \quad (21)$$

以上我们均已假设 $\alpha_{i_1 \dots i_r}$ (或 $\beta_{i_1 \dots i_r}$) 关于 i_1, \dots, i_r 是反对称的。

为了简化计算, 我们有时取局部正交规范标架场 $\{e_i\}$ 及其对偶标架场 $\{w^i\}$, 这样

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_j^i, \quad g^{ij} = \delta_j^i, \quad \sqrt{G} = 1$$

如果设

$$\alpha = \sum_{i <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r}$$

则由定义 1, 有

$$*\alpha = \sum_{j <} *\tilde{\alpha}_{j_{r+1} \dots j_m} \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m}$$

其中

$$\begin{aligned} *\tilde{\alpha}_{j_{r+1} \dots j_m} &= \sum_{i <} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \tilde{\alpha}^{i_1 \dots i_r} \\ &= \frac{1}{r!} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \tilde{\alpha}^{i_1 \dots i_r} \end{aligned}$$

于是, 在正交规范标架场下, 体积元可写成

$$\eta = \omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^m = *1 \quad (22)$$

利用下述命题易知:

$$*\eta = *(\omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^m) = 1$$

命题 1 设 $\alpha, \beta \in A^r(M), f \in C^\infty(M)$, 则有

$$(i) *(\alpha + \beta) = *\alpha + *\beta, \quad *f\alpha = f(*\alpha)$$

$$(ii) **\alpha = *(*\alpha) = (-1)^{r(m-r)}\alpha$$

$$(iii) \alpha \wedge *\beta = \beta \wedge *\alpha = \langle \alpha, \beta \rangle \eta$$

证明 为简便起见, 取局部正交规范标架场, 设

$$\alpha = \sum_{i <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r}$$

$$\beta = \sum_{i <} \tilde{\beta}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r}$$

则

$$g_{ij} = \delta_j^i, \sqrt{G} = 1, \eta_{i_1 \dots i_m} = \delta_{i_1 \dots i_m}^{1 \dots m}, \tilde{\alpha}^{i_1 \dots i_r} = \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r}$$

(i) 由定义知显然。

(ii) 由定义 1 知:

$$\begin{aligned} *\tilde{\alpha} &= \sum_{j <} *\tilde{\alpha}_{j_{r+1} \dots j_m} \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m} \\ &= \sum_{j, i <} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m} \end{aligned}$$

故有

$$*(*\tilde{\alpha}) = \sum_{j, i <} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} *(\omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m})$$

记 $\tilde{\gamma} = \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m}$, 则

$$\tilde{\gamma}_{l_{r+1} \dots l_m} = \begin{cases} 1, & \text{当 } l_{r+1} = j_{r+1}, \dots, l_m = j_m \text{ 时;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

于是,

$$*\tilde{\gamma} = \sum_{k <} *\tilde{\gamma}_{k_1 \dots k_r} \omega^{k_1} \wedge \dots \wedge \omega^{k_r}$$

其中,

$$\begin{aligned} *\tilde{\gamma} &= \sum_{l <} \delta_{l_{r+1} \dots l_m k_1 \dots k_r}^{1 \dots m} \tilde{\gamma}_{l_{r+1} \dots l_m} \\ &= \sum_{l <} (-1)^{r(m-r)} \delta_{k_1 \dots k_r l_{r+1} \dots l_m}^{1 \dots m} \tilde{\gamma}_{l_{r+1} \dots l_m} \\ &= (-1)^{r(m-r)} \delta_{k_1 \dots k_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned}
 (\tilde{\alpha}) &= \sum_{j, i <} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \sum_{k <} (-1)^{r(m-r)} \delta_{k_1 \dots k_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \omega^{k_1} \wedge \dots \wedge \omega^{k_r} \\
 &= \sum_{j, i, k <} (-1)^{r(m-r)} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \delta_{k_1 \dots k_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \omega^{k_1} \wedge \dots \wedge \omega^{k_r}
 \end{aligned}$$

由于 $i_1 < \dots < i_r, k_1 < \dots < k_r$, 且最后和式中非零项满足 $\{i_1, \dots, i_r\} = \{k_1, \dots, k_r\} = \{1, \dots, m\} - \{j_{r+1}, \dots, j_m\}$, 故有 $i_1 = k_1, \dots, i_r = k_r$. 且当 (i_1, \dots, i_r) 固定时, j_{r+1}, \dots, j_m 也随之完全确定. 故

$$\begin{aligned}
 (\tilde{\alpha}) &= \sum_{i, j <} (-1)^{r(m-r)} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} \\
 &= (-1)^{r(m-r)} \sum_{i <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} = (-1)^{r(m-r)} \alpha
 \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}
 \alpha \wedge * \beta &= \left(\sum_{i <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} \right) \wedge \left(\sum_{j <} * \tilde{\beta}_{j_{r+1} \dots j_m} \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m} \right) \\
 &= \sum_{i, j, k <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \tilde{\beta}_{k_1 \dots k_r} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} \wedge \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m}
 \end{aligned}$$

由 $\delta_{k_1 \dots k_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \neq 0$ 及 $\omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} \wedge \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m} \neq 0$ 同 (ii) 中讨论可知, 最后和式中非零项满足 $i_1 = k_1, \dots, i_r = k_r$. 且当 (i_1, \dots, i_r) 固定时, j_{r+1}, \dots, j_m 也随之完全确定. 于是有

$$\begin{aligned}
 \alpha \wedge * \beta &= \sum_{i, j <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \tilde{\beta}_{i_1 \dots i_r} \delta_{i_1 \dots i_r j_{r+1} \dots j_m}^{1 \dots m} \omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_r} \wedge \omega^{j_{r+1}} \wedge \dots \wedge \omega^{j_m} \\
 &= \left(\sum_{i <} \tilde{\alpha}_{i_1 \dots i_r} \tilde{\beta}_{i_1 \dots i_r} \right) \omega^1 \wedge \omega^2 \wedge \dots \wedge \omega^m
 \end{aligned}$$

由定义 2 及 $\tilde{\beta}_{i_1 \dots i_r} = \tilde{\beta}^{i_1 \dots i_r}, \omega^1 \wedge \omega^2 \wedge \dots \wedge \omega^m = \eta$ 可知

$$\alpha \wedge * \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \eta$$

同理可证 $\beta \wedge * \alpha = \langle \beta, \alpha \rangle \eta = \langle \alpha, \beta \rangle \eta$. 命题证毕。 \square

或许你可以不相信上帝, 但是你不能不相信数学; 无论用什么方法论证, 你都没法证到二加二不等于四, 它决不可能等于五。

— 康威

推论 1 $\alpha \wedge * \alpha = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$ 。

为了更清楚地理解 Hodge 星算子, 我们来看几个例子。

例 1 $\alpha = \alpha_1 dx^1, m = 3$, 求 $*\alpha$ 。

解: 由定义 1,

$$*\alpha = \sum_{j_1 < j_2} * \alpha_{j_1 j_2} dx^{j_1} \wedge dx^{j_2}$$

而

$$\begin{aligned} * \alpha_{j_1 j_2} &= \eta_{ij_1 j_2} \alpha^i = \eta_{ij_1 j_2} g^{ik} \alpha_k \\ &= \alpha_1 \eta_{ij_1 j_2} g^{i1} = \alpha_1 \sqrt{G} \delta_{ij_1 j_2}^{123} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} *\alpha &= \sum_{j_1 < j_2} \alpha_1 \sqrt{G} \delta_{ij_1 j_2}^{123} dx^{j_1} \wedge dx^{j_2} \\ &= \alpha_1 \sqrt{G} (g^{31} dx^1 \wedge dx^2 + g^{11} dx^2 \wedge dx^3 - g^{21} dx^1 \wedge dx^3) \end{aligned}$$

例 2 $\alpha = \alpha_{12} dx^1 \wedge dx^2, m = 3$, 求 $*\alpha$ 。

解: 首先将 α 写成对称形式:

$$\alpha = \frac{1}{2} (\alpha_{12} dx^1 \wedge dx^2 - \alpha_{12} dx^2 \wedge dx^1)$$

则 $*\alpha = \sum_j * \tilde{\alpha}_j dx^j$ 。其中:

$$*\tilde{\alpha}_j = \sum_{i_1 < i_2} \eta_{i_1 i_2 j} \tilde{\alpha}^{i_1 i_2} = \sum_{i_1 < i_2} \sqrt{G} \delta_{i_1 i_2 j}^{123} g^{i_1 k_1} g^{i_2 k_2} \tilde{\alpha}_{k_1 k_2}$$

注意到:

$$\tilde{\alpha}_{ij} = \begin{cases} \alpha_{12}, & \text{当 } i = 1, j = 2 \text{ 时;} \\ -\alpha_{12}, & \text{当 } i = 2, j = 1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} *\tilde{\alpha}_3 &= \sqrt{G} g^{1k_1} g^{2k_2} \tilde{\alpha}_{k_1 k_2} = \alpha_{12} \sqrt{G} (g^{11} g^{22} - g^{12} g^{21}) \\ *\tilde{\alpha}_1 &= \sqrt{G} g^{2k_1} g^{3k_2} \tilde{\alpha}_{k_1 k_2} = \alpha_{12} \sqrt{G} (g^{21} g^{32} - g^{22} g^{31}) \end{aligned}$$

$$*\tilde{\alpha}_2 = -\sqrt{G}g^{1k_1}g^{3k_2}\tilde{\alpha}_{k_1k_2} = -\alpha_{12}\sqrt{G}(g^{11}g^{32} - g^{12}g^{31})$$

从而:

$$\begin{aligned} *\alpha &= \alpha_{12}\sqrt{G}[(g^{21}g^{32} - g^{22}g^{31})dx^1 - (g^{11}g^{32} - g^{12}g^{31})dx^2 + (g^{11}g^{22} - g^{12}g^{21})dx^3] \\ &= \alpha_{12}\sqrt{G}\det \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} & dx^1 \\ g^{21} & g^{22} & dx^2 \\ g^{31} & g^{32} & dx^3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例 3 $\alpha = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3, m = 3$, 求 $*\alpha$.

解: 首先将 α 写成对称形式:

$$\begin{aligned} \alpha &= dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \\ &= \frac{1}{3!}[dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 - dx^1 \wedge dx^3 \wedge dx^2 + dx^3 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \\ &\quad - dx^3 \wedge dx^2 \wedge dx^1 + dx^2 \wedge dx^3 \wedge dx^1 - dx^2 \wedge dx^1 \wedge dx^3] \end{aligned}$$

于是 $\beta_{ijk} = \delta_{ijk}^{123}$. 由定义 1 知

$$\begin{aligned} *(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3) &= \sum_{i_1 < i_2 < i_3} \eta_{i_1 i_2 i_3} \beta^{i_1 i_2 i_3} = \sqrt{G} \beta^{123} \\ &= \sqrt{G} g^{1i_1} g^{2i_2} g^{3i_3} \beta_{i_1 i_2 i_3} \\ &= \sqrt{G} [g^{11} g^{22} g^{33} - g^{11} g^{23} g^{32} + g^{12} g^{23} g^{31} \\ &\quad - g^{12} g^{21} g^{33} + g^{13} g^{21} g^{32} - g^{13} g^{22} g^{31}] \\ &= \sqrt{G} \det \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} & g^{13} \\ g^{21} & g^{22} & g^{23} \\ g^{31} & g^{32} & g^{33} \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{G} \cdot \frac{1}{G} = \frac{1}{\sqrt{G}} \end{aligned}$$

特别地, 在局部正交标架下, $dx^i = \omega^i, i = 1, 2, 3, G = \det(g_{ij}) = 1$, 有

$$*(\omega^1 \wedge \omega^2 \wedge \omega^3) = 1$$

参考文献

- [1] 白正国, 沈一兵等著.《黎曼几何初步》, 高等教育出版社出版。

曲面的自然标架与正交标架

0201 修大成

在微分几何的课程中, 我们利用正则曲面的自然标架与正交标架两种活动标架研究了曲面的几何, 并结合运动方程推导了 *Gauss – Codazzi* 方程, 由此引出曲面理论中一系列更加深刻的结果。两种标架都用来描述曲面的几何, 但借助于不同的符号。自然标架运用了复杂的 *Christoffel* 符号, 与之相反, 正交标架运用了简洁的微分形式, 将复杂的运动方程和结构方程以优美的形式展现了出来。我们不禁会想, 既然两种表述语言是等价的, 那么两种符号之间的关系是怎样的呢?

首先, 让我们回顾一下曲面的自然标架和正交标架的基本概念。

定义 1 E^3 中参数曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$ 的自然标架场是全体 $\{r; r_1, r_2, n\}$ 标架构成的以 $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ 为原点的活动标架场。其中, r_1, r_2 是曲面的坐标切向量, $r_3 = \frac{r_1 \wedge r_2}{|r_1 \wedge r_2|}$ 是 S 的单位法向量。

定义 2 E^3 中参数曲面 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$ 各点的切平面上取向量 e_1, e_2 , 使得 $(e_1, e_1) = (e_2, e_2) = 1, (e_1, e_2) = 0$, 并且 e_1, e_2 关于 (u^1, u^2) 光滑。取 $e_3 = e_1 \wedge e_2$ 为曲面的单位法向量场, 则 $\{r; e_1, e_2, e_3\}$ 构成了曲面 S 的一个正交标架。这些标架的全体构成曲面 S 正交标架场。

下面给出两种活动标架下曲面的运动方程, 这是我们推导的出发点。

定理 1 曲面的运动方程

自然标架下:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u^\alpha} = r_\alpha \quad (M_1)$$

$$\frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} r_3 \quad (M_2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u^\alpha} = -b_\alpha^\beta r_\beta \quad (M_3)$$

正交标架下:

$$d\mathbf{r} = \omega^\alpha e_\alpha, \quad \alpha = 1, 2 \quad (M_4)$$

$$de_\eta = \omega_\eta^k e_k, \quad \eta, k = 1, 2, 3 \quad (M_5)$$

引理 1 设 $r_\alpha = a_\alpha^\eta e_\eta$, $\alpha, \beta, \gamma, \eta = 1, 2$, 那么曲面两种标架下的运动方程中的系数有如下的关系:

$$a_\gamma^l \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta - da_\alpha^l - a_\alpha^\eta \omega_\eta^l = 0 \quad (1.1)$$

$$b_{\alpha\beta} du^\beta = a_\alpha^\eta \omega_\eta^3 \quad (1.2)$$

证明

在 $r_\alpha = a_\alpha^\eta e_\eta$ 两边对 u^β 求导得:

$$\frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} = a_\alpha^\eta \frac{de_\eta}{du^\beta} + \frac{\partial a_\alpha^\eta}{\partial u^\beta} e_\eta$$

结合 (M_2) , (M_5) 式得:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} r_3 = \frac{\partial a_\alpha^\eta}{\partial u^\beta} e_\eta + a_\alpha^\eta \frac{\omega_\eta^k}{du^\beta} e_k$$

设 $a_\alpha^\eta \tilde{a}_\eta^\lambda = \delta_\alpha^\lambda$, 再由 $r_\alpha = a_\alpha^\eta e_\eta$ 可知:

$$r_\lambda \tilde{a}_\eta^\lambda = e_\eta, \quad e_3 = r_3, \quad \lambda = 1, 2$$

代入上式即得:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma r_\gamma + b_{\alpha\beta} r_3 = \frac{\partial a_\alpha^\eta}{\partial u^\beta} r_\lambda \tilde{a}_\eta^\lambda + a_\alpha^\eta \frac{\omega_\eta^k}{du^\beta} r_\lambda \tilde{a}_k^\lambda + a_\alpha^\eta \frac{\omega_\eta^3}{du^\beta} r_3 \quad l, k = 1, 2, 3$$

整理得:

$$(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma - \frac{\partial a_\alpha^\eta}{\partial u^\beta} \tilde{a}_\eta^\gamma - a_\alpha^\eta \tilde{a}_k^\gamma \frac{\omega_\eta^k}{du^\beta}) r_\gamma + (b_{\alpha\beta} - a_\alpha^\eta \frac{\omega_\eta^3}{du^\beta}) r_3 = 0 \quad \gamma = 1, 2$$

由 r_1, r_2, r_3 的线性无关性知:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma - \frac{\partial a_\alpha^\eta}{\partial u^\beta} \tilde{a}_\eta^\gamma - a_\alpha^\eta \tilde{a}_k^\gamma \frac{\omega_\eta^k}{du^\beta} = 0$$

$$b_{\alpha\beta} - a_\alpha^\eta \frac{\omega_\eta^3}{du^\beta} = 0$$

用微分形式写出即得:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta - da_\alpha^\eta \tilde{a}_\eta^\gamma - a_\alpha^\eta \tilde{a}_k^\gamma \omega_\eta^k = 0$$

$$b_{\alpha\beta} du^\beta - a_\alpha^\eta \omega_\eta^3 = 0$$

$$\alpha, \beta, \eta, \gamma, k = 1, 2$$

最后在第一式两边乘以 a_r^l 即得结论。 \square

通过以上论述, 我们可以看出隐含在外微分形式 ω_η^k 后复杂的 *Christoffel* 符号, 由此可以看出利用微分形式表达运动方程的优越性。

[1] 中给出当 $e_1 = \frac{r_1}{\sqrt{E}}, e_2 = \frac{r_2}{\sqrt{G}}$ 时, 自然标架与正交标架下 *Gauss - Codazzi* 公式的等价性。下面我们利用上面的引理证明一般情形时, 两组公式的一致性。

定理 2 Gauss-Codazzi 方程

自然标架下:

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\xi}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\eta \Gamma_{\eta\gamma}^\xi - \Gamma_{\alpha\gamma}^\eta \Gamma_{\eta\beta}^\xi - b_{\alpha\beta} b_\gamma^\xi + b_{\alpha\gamma} b_\beta^\xi = 0 \quad (G_1)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\xi b_{\xi\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^\xi b_{\xi\beta} = 0 \quad (C_1)$$

正交标架下:

$$d\omega_\alpha^\beta = \omega_\alpha^3 \wedge \omega_\beta^3 \quad (G_2)$$

$$d\omega_k^3 = \omega_k^l \wedge \omega_l^3 \quad (C_2)$$

定理 3 自然标架下的 Gauss 方程 (G) 和 Codazzi 方程 (C) 与正交标架下相应的方程是等价的.

证明 对 (1.1) 和 (1.2) 式进行适当的变形可得:

$$\omega_k^l = \tilde{a}_k^\alpha a_\gamma^l \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta - \tilde{a}_k^\alpha da_\alpha^l \quad (2.1)$$

$$\omega_k^3 = \tilde{a}_k^\alpha b_{\alpha\eta} du^\eta \quad (2.2)$$

“(C₂) \longrightarrow (C₁)”

(2.2) 式两边微分得:

$$d\omega_k^3 = b_{\alpha\eta} d\tilde{a}_k^\alpha \wedge du^\eta + \tilde{a}_k^\alpha db_{\alpha\eta} \wedge du^\eta = (b_{\alpha\eta} \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} + \tilde{a}_k^\alpha \frac{\partial b_{\alpha\eta}}{\partial u^\beta}) du^\beta \wedge du^\eta$$

$$\begin{aligned} \omega_k^l \wedge \omega_l^3 &= (\tilde{a}_k^\alpha a_\gamma^l \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta - \tilde{a}_k^\alpha da_\alpha^l) \wedge (\tilde{a}_l^m b_{m\eta} du^\eta) \\ &= (\tilde{a}_k^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^m b_{m\eta} - \tilde{a}_k^\alpha \tilde{a}_l^m b_{m\eta} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\beta}) du^\beta \wedge du^\eta \end{aligned}$$

由 (C₂) $d\omega_k^3 = \omega_k^l \wedge \omega_l^3$,

再结合 $du^\beta \wedge du^\eta = -du^\eta \wedge du^\beta$ 及 $\{du^\beta \wedge du^\eta \mid \beta < \eta\}$ 的无关性知,

$$\tilde{a}_k^\alpha (\Gamma_{\alpha\beta}^m b_{m\eta} - \Gamma_{\alpha\eta}^m b_{m\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\eta} - \frac{\partial b_{\alpha\eta}}{\partial u^\beta}) = b_{\alpha\eta} \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} - b_{\alpha\beta} \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\eta} + \tilde{a}_k^\alpha \tilde{a}_l^m b_{m\eta} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\beta} - \tilde{a}_k^\alpha \tilde{a}_l^m b_{m\beta} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\eta}$$

两边乘以 a_ξ^k , 并适当调整求和指标, 即有

$$\Gamma_{\xi\beta}^m b_{m\eta} - \Gamma_{\xi\eta}^m b_{m\beta} + \frac{\partial b_{\xi\beta}}{\partial u^\eta} - \frac{\partial b_{\xi\eta}}{\partial u^\beta} = b_{\alpha\eta} a_\xi^k \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} - b_{\alpha\beta} a_\xi^k \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\eta} + \tilde{a}_l^\alpha b_{\alpha\eta} \frac{\partial a_\xi^l}{\partial u^\beta} - \tilde{a}_l^\alpha b_{\alpha\beta} \frac{\partial a_\xi^l}{\partial u^\eta}$$

又由于 $a_\xi^l \tilde{a}_l^\alpha = \delta_\xi^\alpha$, 故有

$$\frac{\partial a_\xi^l}{\partial u^\beta} + a_\xi^k a_\mu^l \frac{\partial \tilde{a}_k^\mu}{\partial u^\beta} = 0$$

代入上式, 即得上式右边为 0。

从而得到

$$\Gamma_{\xi\beta}^m b_{m\eta} - \Gamma_{\xi\eta}^m b_{m\beta} + \frac{\partial b_{\xi\beta}}{\partial u^\eta} - \frac{\partial b_{\xi\eta}}{\partial u^\beta} = 0$$

此即为 *Codazzi* 方程。

“(C₁) → (C₂)”

上述证明仅用到了消元, 交换求和指标等方法, 从而可以逆向推回, 得证。

“(G₂) → (G₁)”

直接计算可得:

$$d\omega_k^l = \left(\frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} a_\gamma^l \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma + \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma}{\partial u^\xi} \tilde{a}_k^\alpha a_\gamma^l + \tilde{a}_k^\alpha \frac{\partial a_\gamma^l}{\partial u^\xi} \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma - \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\beta} \right) du^\xi \wedge du^\beta$$

$$\omega_k^3 \wedge \omega_l^3 = \tilde{a}_k^m \tilde{a}_l^n b_{m\xi} b_{n\beta} du^\xi \wedge du^\beta$$

由 (G₂) 得到: $d\omega_k^l = -\omega_k^3 \wedge \omega_l^3$, 将其代入上式整理得:

$$\left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma}{\partial u^\beta} \right) \tilde{a}_k^\alpha a_\gamma^l - \tilde{a}_k^m \tilde{a}_l^n (b_{m\beta} b_{n\xi} - b_{m\xi} b_{n\beta}) + a_\gamma^l (\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} - \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta}) + \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\beta} = 0$$

两边乘以 $a_s^k \tilde{a}_l^t$ 得到:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial \Gamma_{s\beta}^t}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \Gamma_{s\xi}^t}{\partial u^\beta} \right) - \tilde{a}_l^t \tilde{a}_l^n (b_{s\beta} b_{n\xi} - b_{s\xi} b_{n\beta}) + a_s^k (\Gamma_{\alpha\beta}^t \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} - \Gamma_{\alpha\xi}^t \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta}) \\ & + a_s^k \tilde{a}_l^t \left(\frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} \frac{\partial a_\alpha^l}{\partial u^\beta} \right) = 0 \end{aligned} \quad (A_1)$$

注意到上式第二项, 并利用 $g^{\beta\alpha} = \tilde{a}_l^\alpha \tilde{a}_l^\beta$

得到:

$$\tilde{a}_l^n \tilde{a}_l^t (b_{s\beta} b_{n\xi} - b_{s\xi} b_{n\beta}) = g^{nt} (b_{s\beta} b_{n\xi} - b_{s\xi} b_{n\beta}) = b_{s\beta} b_\xi^t - b_{s\xi} b_\beta^t \quad (A_2)$$

结合已知结果: $\frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} + \frac{\partial a_\mu^\mu}{\partial u^\xi} \tilde{a}_\mu^\alpha \tilde{a}_k^\eta = 0$

代入 (1) 最后两项得到:

$$a_s^k (\Gamma_{\alpha\beta}^t \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} - \Gamma_{\alpha\xi}^t \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta}) + a_s^k \tilde{a}_l^t \left(\frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\beta} \frac{a_\alpha^l}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \tilde{a}_k^\alpha}{\partial u^\xi} \frac{a_\alpha^l}{\partial u^\beta} \right)$$

当数学家导出方程式和公式, 如同看到雕像、美丽的风景, 听到优美的曲调等等一样而得到充分的快乐。

$$= -\Gamma_{\alpha\beta}^t \frac{\partial a_s^l}{\partial u^\xi} \tilde{a}_l^\alpha + \Gamma_{\alpha\xi}^t \frac{\partial a_s^l}{\partial u^\beta} \tilde{a}_l^\alpha - \tilde{a}_\mu^t \frac{\partial a_\alpha^\mu}{\partial u^\xi} \frac{\partial a_s^l}{\partial u^\beta} \tilde{a}_l^\alpha + \tilde{a}_\mu^t \frac{\partial a_\alpha^\mu}{\partial u^\beta} \frac{\partial a_s^l}{\partial u^\xi} \tilde{a}_l^\alpha$$

可以直接验证:

$$\text{上式} = \Gamma_{s\beta}^\eta \Gamma_{\eta\xi}^t - \Gamma_{s\xi}^\eta \Gamma_{\eta\beta}^t \quad (A_3)$$

综合 $(A_1), (A_2), (A_3)$ 式, 得到 Gauss 方程:

$$\frac{\partial \Gamma_{s\beta}^t}{\partial u^\xi} - \frac{\partial \Gamma_{s\xi}^t}{\partial u^\beta} + \Gamma_{s\beta}^\eta \Gamma_{\eta\xi}^t - \Gamma_{s\xi}^\eta \Gamma_{\eta\beta}^t - b_{s\beta} b_\xi^t + b_{s\xi} b_\beta^t = 0$$

“(G_1) \longrightarrow (G_2)”


完全类似的, 将上述证明反向回推即得。 □

参考文献

- [1] 彭家贵, 陈卿。《微分几何》, 高等教育出版社。

=====

Koch Snow Curves



[-2,2] 中一类点集的稠密性

0201 朱家林

定义点集列:

$$\begin{aligned} F_1 &= \{\pm\sqrt{2}\} \\ F_2 &= \{\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2}}\} \\ F_3 &= \{\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2}}}\} \\ &\vdots \\ F_n &= \underbrace{\{\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2\pm\cdots\pm\sqrt{2}}}\}}_n \end{aligned}$$

令

$$S = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

其中 F_n 中 \pm 表示各处正负号均可任意组合, 例如

$$F_2 = \{\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2}}\} = \{+\sqrt{2+\sqrt{2}}, +\sqrt{2-\sqrt{2}}, -\sqrt{2+\sqrt{2}}, -\sqrt{2-\sqrt{2}}\}$$

不难知道 $F_n \subset [-2, 2]$, 从而 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \subset [-2, 2]$.

问题: S 在 $[-2, 2]$ 中是否稠密? 即是否 $[-2, 2]$ 中任意点均可用 S 中的点逼近?

下面将证明 $[-2, 2]$ 中具有这种形式的点集的稠密性. 他们是某簇整系数多项式 $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 在 $[-2, 2]$ 中的零点集. 下面给出多项式簇 $\{f_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 的定义: 令

$$f_1(z) = z^2 - 2$$

将 $f_n(z)$ 定义为由 $f_1(z)$ 作 n 次迭代得到的多项式

$$f_n(z) = f_1^n(z) = \underbrace{f_1 \circ \cdots \circ f_1}_n(z)$$

从 $f_n(z)$ 定义可知, 它是 2^n 次的整系数多项式且可验证集合 F_n 中的点均是 $f_n(z)$ 的零点. 2^n 次的整系数多项式至多有 2^n 个零点, 而 $|F_n| = 2^n$, 故 F_n 为 $f_n(z)$ 的零点集. 从而, 我们得到:

结论 1 多项式簇 $\{f_i\}_{i \in N}$ 的零点集为 S .

为证明多项式簇 $\{f_i\}_{i \in N}$ 零点集 S 在 $[-2, 2]$ 中的稠密性, 下面给出这些零点的另一种表示: 做变换

$$z = \omega + \frac{1}{\omega}$$

则得

$$f_n(\omega) = f^n(\omega + \frac{1}{\omega}) = \omega^{2^n} + \frac{1}{\omega^{2^n}}$$

下面求 $f_n(\omega) = 0$ 的零点:

$$\omega^{2^n} + \frac{1}{\omega^{2^n}} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\omega^{2^{n+1}} = -1 = e^{i\pi}$$

$$\Downarrow$$

$$\omega = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2^{n+1}} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{2^{n+1}}, 0 \leq k \leq 2^{n+1} - 1$$

$$\Downarrow$$

$$z = \omega + \frac{1}{\omega} = 2 \cos \theta, \theta = \frac{(2k+1)\pi}{2^{n+1}}, 0 \leq k \leq 2^{n+1} - 1$$

令

$$T = \{\theta | \theta = \frac{(2k+1)\pi}{2^{n+1}}, 0 \leq k \leq 2^{n+1} - 1, \forall n \in N\}$$

有连续满映射 $\varphi: [0, 2\pi] \rightarrow [-2, 2], \theta \mapsto 2\cos\theta$, 且 $\varphi(T) = S$. 因为不难看出 T 在 $[0, 2\pi]$ 中稠密, 从而它的象 S 在 $[-2, 2]$ 中稠密.

结论 2 S 在 $[-2, 2]$ 中稠密.

类似 S 得定义, $\forall x \in [-2, 2]$ 令

$$H_1(x) = \{\pm x\}$$

$$H_2(x) = \{\pm \sqrt{2 \pm x}\}$$

$$H_3(x) = \{\pm \sqrt{2 \pm \sqrt{2 \pm x}}\}$$

$$\vdots$$

$$H_n(x) = \underbrace{\{\pm \sqrt{2 \pm \sqrt{2 \pm \dots \sqrt{2 \pm x}}}\}}_n$$

令

$$H_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n(x)$$

给我空间、时间、及对数, 我可以创造一个宇宙。

— 伽利略

你能一直赌下去吗？

04001 管枫 罗世森

也许我们都听说过这样的告诫：如果你无限制地赌博，你迟早会倾家荡产。

这句话到底有多少道理？下面我们用随机游动模型来一探究竟（关于随机游动及其相关概念，可参看苏淳老师编著的《概率论》P74-75）。

我们的横坐标代表资产数，为简化讨论，我们假设资产取整数，0 代表破产，不能再赌。每次输的概率都设为 p ，资产减少 1，在坐标轴体现为向左移动一格；赢的概率为 $q = 1 - p$ ，资产增加 1，坐标轴上体现为向右移动一格。

设初始资产为 k ，若资产增加到 m ($m > k$)，则收手不赌。由苏淳老师编《概率论》P74 例题 2.4.4 的结果可以知道，输光的概率是：

$$p_k = \begin{cases} 1 - \frac{k}{m}, & p = 1 = \frac{1}{2}; \\ \frac{\left(\frac{p}{q}\right)^k - \left(\frac{p}{q}\right)^m}{1 - \left(\frac{p}{q}\right)^m}, & p \neq q. \end{cases} \quad (1)$$

可见，如果有节制地赌，输赢皆有可能。但如果无节制地赌，直到破产为止，那又是怎样的情形呢？将模型稍作修改：去掉 m 点的吸附壁，只剩 0 点一个吸附壁。我们想算出破产的概率 P 。

并且，我们设初始资产为 1（由后面的方法三，我们会发现初始资产为 k 的情形容易从这种特殊情形推广得到）。

怎么算？一个最自然的想法是利用 (1) 式。令 $k = 1$, $m \rightarrow +\infty$ ，得到：

$$P = \begin{cases} 1, & p \geq \frac{1}{2}; \\ \frac{p}{1-p}, & p < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

这么算合理吗？分析如下：

用 A 表示破产， A_i 表示在时刻 i 破产， $i = 1, 2, 3, \dots$ 。则 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ，其中 A_i 两两不交。所以，

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} P(A_i).$$

注意到 $\sum_{i=1}^{n-1} P(A_i)$ 正是 (1) 式中 $m = n$ 时求出的 p_i ，故取极限是合理的。

以上方法我们称之为方法一。这个方法通过书上方法得到, 下面来介绍几个其它的方法。

方法二:

这是一个最朴实的方法。 A 的意义不变, 用 B_l 表示先赢了 l 次, 然后输了 $l+1$ 次的事件, $l=0, 1, 2, \dots$ 。则 $A = \bigcup_{l=0}^{\infty} B_l$, 且 B_l 两两不交。所以有,

$$P(A) = \sum_{l=0}^{\infty} P(B_l) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l \cdot p^{l+1} q^l.$$

其中 a_l 是 B_l 的走法数。利用组合数学的知识, 可以算出

$$a_l = \frac{1}{1+l} \binom{2l}{l}.$$

由二项式定理知

$$(1-4x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{i=1}^{+\infty} \binom{2i}{i} x^i,$$

两边积分可得:

$$-\frac{1}{2}\sqrt{1-4x} + c = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{1+i} \binom{2i}{i} x^{i+1}.$$

令 $x=0$, 得到 $c = \frac{1}{2}$ 。所以有:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{1}{q} \sum_{l=0}^{\infty} a_l \cdot (pq)^{l+1} = \frac{1}{q} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l+1} \binom{2l}{l} \cdot (pq)^{l+1} \\ &= \frac{1}{2q} (1 - \sqrt{1-4pq}) = \frac{1}{2q} (1 - |1-2p|). \end{aligned}$$

故

$$P = \begin{cases} 1, & p \geq \frac{1}{2}; \\ \frac{p}{1-p}, & p < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

如果注意到一个事实, 从坐标 2 出发走到坐标 1 的概率, 等于从 1 出发能走到 0 的概率, 那么能得到以下的方法三:

从 k 出发能走到 0 的概率记为 p_k , 从 k 出发能走到 i 的概率记为 p_{k_i} 。则有:

$$p_2 = p_{21}p_{10} = p_1^2 \quad (2)$$

另外, 显然有关系式:

$$p_1 = p + (1-p)p_1^2 \quad (3)$$

联立 (2) 和 (3), 有

$$p_1 = p + (1-p)p_1^2,$$

解之得:

$$p_1 = 1 \text{ 或 } \frac{p}{1-p}.$$

人总要死的, 但是, 他们的业绩永存!

— 柯西

1. 当 $\frac{1}{2} \leq p$ 时,

$$\frac{p}{1-p} \geq 1, \text{ 而 } p_1 \in [0, 1], \text{ 所以 } p_1 = 1. \text{ 此即所求的 } P.$$

2. $p < \frac{1}{2}$ 时,

由方法二, $p_1 = \sum_{l=0}^{\infty} a_l \cdot p^{l+1} q^l$, a_l 是与 p 无关的组合数。

$$\text{而 } p^{l+1} q^l = p^{l+1} (1-p)^l = p(p(1-p))^l \leq p \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^l < \left(\frac{1}{2}\right)^{l+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^l$$

当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $p_1 = 1$ 。所以 $p < \frac{1}{2}$ 时, $p_1 < 1$ 。

所以 $p_1 = \frac{p}{1-p}$, 此即 P 。

所以有

$$P = \begin{cases} 1, & p \geq \frac{1}{2}; \\ \frac{p}{1-p}, & p < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

同理于 (2)(3) 式, 我们有 $p_k = p_1^k$, $p_k = p \cdot p_{k-1} + (1-p)p_{k+1}$, $k \geq 2$ 。由此即可求得 p_k , 且易知, 当 $p < \frac{1}{2}$ 时, k 越大, P 越小, 即越不可能破产。

以上, 我们从三个不同的角度, 用三种不同的方法, 得到了同一个结果。从讨论的结果可以知道, 如果输的概率不小于一半, 一直赌下去的结果是几乎必然会破产。

念数学的名人

• Music

Art Garfunkel: 这个就是无人不知了。Simon & Garfunkel 有著名的歌曲 Scarborough Fair. Columbia 1967 的 MA, 继续在 Columbia 念 PhD, 不过中途退学, 专心音乐事业

• Literature

Lewis Carroll: “Alice in Wonderland” 和 “Through the Looking Glass” 的作者. 真名 Charles Lutwidge Dodgson, 这时候他就是一逻辑学家

• Finance

John Maynard Keynes: 经济学家, Cambridge

J. P. Morgan: 银行, 钢铁, 铁路巨头. 不用细说, 详细见 www.jpmorgan.com. 传说 Gottigen 的数学家曾经意图劝说他做一个职业的数学家

• Philosophers

Edmund Husserl: 现象学之父. Vienna 1883 PhD

Ludwig Wittgenstein: 20 世纪哲学巨人. 师从 Bertrand Russell 学数理逻辑

• Athletes

Michael Jordan: 篮球巨星. 不过他在 junior 的时候转系了

David Robinson: 另一个 NBA 巨星. BS in math from Annapolis

钻研然而知不足, 虚心是从知不足而来的。虚伪的谦虚, 仅能博得庸俗的掌声, 而不能求得真正的进步。

— 华罗庚

The 65th William Lowell Putnam Mathematical Competition

Saturday, December 4, 2004

- A1 Basketball star Shanille O'Keal's team statistician keeps track of the number, $S(N)$, of successful free throws she has made in her first N attempts of the season. Early in the season, $S(N)$ was less than 80% of N , but by the end of the season, $S(N)$ was more than 80% of N . Was there necessarily a moment in between when $S(N)$ was exactly 80% of N ?
- A2 For $i = 1, 2$ let T_i be a triangle with side lengths a_i, b_i, c_i , and area A_i . Suppose that $a_1 \leq a_2, b_1 \leq b_2, c_1 \leq c_2$, and that T_2 is an acute triangle. Does it follow that $A_1 \leq A_2$?
- A3 Define a sequence $\{u_n\}_{n=0}^\infty$ by $u_0 = u_1 = u_2 = 1$, and thereafter by the condition that

$$\det \begin{pmatrix} u_n & u_{n+1} \\ u_{n+2} & u_{n+3} \end{pmatrix} = n!$$

for all $n \geq 0$. Show that u_n is an integer for all n . (By convention, $0! = 1$.)

- A4 Show that for any positive integer n , there is an integer N such that the product $x_1 x_2 \cdots x_n$ can be expressed identically in the form

$$x_1 x_2 \cdots x_n = \sum_{i=1}^N c_i (a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \cdots + a_{in} x_n)^n$$

where the c_i are rational numbers and each a_{ij} is one of the numbers $-1, 0, 1$.

- A5 An $m \times n$ checkerboard is colored randomly: each square is independently assigned red or black with probability $1/2$. We say that two squares, p and q , are in the same connected monochromatic component if there is a sequence of squares, all of the same color, starting at p and ending at q , in which successive squares in the sequence share a common side. Show that the expected number of connected monochromatic regions is greater than $mn/8$.
- A6 Suppose that $f(x, y)$ is a continuous real-valued function on the unit square $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. Show that

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right)^2 dy + \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right)^2 dx \\ & \leq \left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \right)^2 + \int_0^1 \int_0^1 (f(x, y))^2 dx dy. \end{aligned}$$

- B1 Let $P(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_0$ be a polynomial with integer coefficients. Suppose that r is a rational number such that $P(r) = 0$. Show that the n numbers

$$c_n r, c_n r^2 + c_{n-1} r, c_n r^3 + c_{n-1} r^2 + c_{n-2} r, \\ \dots, c_n r^n + c_{n-1} r^{n-1} + \cdots + c_1 r$$

are integers.

- B2 Let m and n be positive integers. Show that

$$\frac{(m+n)!}{(m+n)^{m+n}} < \frac{m!}{m^m} \frac{n!}{n^n}.$$

- B3 Determine all real numbers $a > 0$ for which there exists a nonnegative continuous function $f(x)$ defined on $[0, a]$ with the property that the region

$$R = \{(x, y); 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

has perimeter k units and area k square units for some real number k .

- B4 Let n be a positive integer, $n \geq 2$, and put $\theta = 2\pi/n$. Define points $P_k = (k, 0)$ in the xy -plane, for $k = 1, 2, \dots, n$. Let R_k be the map that rotates the plane counterclockwise by the angle θ about the point P_k . Let R denote the map obtained by applying, in order, R_1 , then R_2 , \dots , then R_n . For an arbitrary point (x, y) , find, and simplify, the coordinates of $R(x, y)$.

- B5 Evaluate

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n}.$$

- B6 Let \mathcal{A} be a non-empty set of positive integers, and let $N(x)$ denote the number of elements of \mathcal{A} not exceeding x . Let \mathcal{B} denote the set of positive integers b that can be written in the form $b = a - a'$ with $a \in \mathcal{A}$ and $a' \in \mathcal{A}$. Let $b_1 < b_2 < \cdots$ be the members of \mathcal{B} , listed in increasing order. Show that if the sequence $b_{i+1} - b_i$ is unbounded, then

$$\lim_{x \rightarrow \infty} N(x)/x = 0.$$

主编： 中国科学技术大学 2002 级数学系
编委： 修大成 雷 涛 张 智 王 可
审稿： 金天灵 张鹏飞 孙 俊 王麒麟
设计： 张翔雄 胡雪莹 刘 欣