


# Lista de Exercícios 1 – Seleção e Repetição

## 1) Coordenadas de um Ponto

Leia 2 valores com uma casa decimal (x e y), que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem ( $x = y = 0$ ).



Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem “Origem”.

Se o ponto estiver sobre um dos eixos escreva “Eixo X” ou “Eixo Y”, conforme for a situação.

### Entrada

A entrada contém as coordenadas de um ponto.

### Saída

A saída deve apresentar o quadrante em que o ponto se encontra.

Exemplo de Entrada

4.5 -2.2

0.1 0.1

0.0 0.0

Exemplo de Saída

Q4

Q1

Origem

## 2) Tipos de Triângulos

Leia 3 valores de ponto flutuante A, B e C e ordene-os em ordem decrescente, de modo que o lado A representa o maior dos 3 lados. A seguir, determine o tipo de triângulo que estes três lados formam, com base nos seguintes casos, sempre escrevendo uma mensagem adequada:

- se  $A \geq B+C$ , apresente a mensagem: **NAO FORMA TRIANGULO**
- se  $A^2 = B^2 + C^2$ , apresente a mensagem: **TRIANGULO RETANGULO**
- se  $A^2 > B^2 + C^2$ , apresente a mensagem: **TRIANGULO OBTUSANGULO**
- se  $A^2 < B^2 + C^2$ , apresente a mensagem: **TRIANGULO ACUTANGULO**
- se os três lados forem iguais, apresente a mensagem: **TRIANGULO EQUILATERO**
- se apenas dois dos lados forem iguais, apresente a mensagem: **TRIANGULO ISOSCELES**

### Entrada

A entrada contém três valores de ponto flutuante de dupla precisão A ( $0 < A$ ), B ( $0 < B$ ) e C ( $0 < C$ ).

### Saída

Imprima todas as classificações do triângulo especificado na entrada.

Exemplos de Entrada

7.0 5.0 7.0

6.0 6.0 10.0

6.0 6.0 6.0

5.0 7.0 2.0

6.0 8.0 10.0

Exemplos de Saída

TRIANGULO ACUTANGULO  
TRIANGULO ISOSCELES

TRIANGULO OBTUSANGULO  
TRIANGULO ISOSCELES

TRIANGULO ACUTANGULO  
TRIANGULO EQUILATERO

NAO FORMA TRIANGULO

TRIANGULO RETANGULO

### 3) Tempo de Jogo

Leia a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir calcule a duração do jogo, sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração máxima de 24 horas.

#### Entrada

Dois números inteiros representando o início e o fim do jogo.

#### Saída

Mostre a duração do jogo conforme exemplo abaixo.

Exemplo de Entrada

16 2

0 0

2 16

Exemplo de Saída

O JOGO DUROU 10 HORA(S)

O JOGO DUROU 24 HORA(S)

O JOGO DUROU 14 HORA(S)

## 4) Pares, Ímpares, Positivos e Negativos

Leia N valores Inteiros. A seguir mostre quantos valores digitados foram pares, quantos valores digitados foram ímpares, quantos valores digitados foram positivos e quantos valores digitados foram negativos.

### Entrada

A entrada contém o valor N, seguido de N valores inteiros quaisquer.

### Saída

Imprima a mensagem conforme o exemplo fornecido, uma mensagem por linha, não esquecendo o final de linha após cada uma.

Exemplo de Entrada

5  
-5  
0  
-3  
-4  
12

Exemplo de Saída

3 valor(es) par(es)  
2 valor(es) impar(es)  
1 valor(es) positivo(s)  
3 valor(es) negativo(s)

## 5) Médias Ponderadas

Leia 1 valor inteiro  $N$ , que representa o número de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de 3 valores reais, cada um deles com uma casa decimal. Apresente a média ponderada para cada um destes conjuntos de 3 valores, sendo que o primeiro valor tem peso 2, o segundo valor tem peso 3 e o terceiro valor tem peso 5.

### Entrada

A entrada contém um valor inteiro  $N$  na primeira linha. Cada  $N$  linha a seguir contém um caso de teste com três valores reais.

### Saída

Para cada caso de teste, imprima a média ponderada dos 3 valores, conforme exemplo abaixo.

Exemplo de Entrada

```
3
6.5 4.3 6.2
5.1 4.2 8.1
8.0 9.0 10.0
```

Exemplo de Saída

```
5.7
6.3
9.3
```

## 6) Soma de Impares Consecutivos I

Leia 2 valores inteiros **X** e **Y**. A seguir, calcule e mostre a soma dos números ímpares entre eles.

### Entrada

Dois valores inteiros.

### Saída

O programa deve imprimir um valor inteiro. Este valor é a soma dos valores ímpares que estão entre os valores fornecidos na entrada que deverá caber em um inteiro.

Exemplo de Entrada

6  
-5

Exemplo de Saída

5

## 7) Soma de Ímpares Consecutivos II

Leia um valor inteiro **N** que é a quantidade de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de dois inteiros **X** e **Y**. Você deve apresentar a soma de todos os ímpares existentes **entre X** e **Y**.

### Entrada

A primeira linha de entrada é um inteiro **N** que é a quantidade de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste em uma linha contendo dois inteiros **X** e **Y**.

### Saída

Imprima a soma de todos valores ímpares *entre X* e *Y*.

Exemplo de Entrada

7

4 5

13 10

6 4

3 3

3 5

3 4

3 8

Exemplo de Saída

0

11

5

0

0

0

12