الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سوق أهراس — وزارة التربية الوطنية — ثانوية حاجي حسين


سنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا — يوم: 2024/10/29

الفرض الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة — المدة: 01 ساعة

التمرين:

تتأثر عملية النمو لدى الكائنات الحية بمجموعة من العوامل المختلفة من بينها بعض المواد الكيميائية مثل جزيئتي Cycline وCDK، حيث ينتج عن اتحاد هاتين الجزيئتين بفضل تكاملهما بنيويا العامل MDF المعزز لإحدى آليات النمو، لدراسة آلية تأثير هذه المركبات الكيميائية على عملية النمو نقوم بالدراسة التالية:

الجزء الأول: نقوم بمتابعة معدل النمو على مستوى خلايا نباتية مأخوذة من قمة نامية (الأعمدة المتحصل عليها) وذلك في شروط تجريبية مختلفة (حسب الجدول)، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).




Cycline (و.ا)	50	50	50	20
CDK (و.ا)	00	50	20	50

الوثيقة (1)


1/ باستغلالك لمعطيات الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك القبلية، اقترح فرضيتين توضح بهما سبب تسمية المركب MDF بالعامل المعزز للنمو.

الجزء الثاني: للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بمتابعة وقياس تركيز المركب MDF خلال مراحل مختلفة من الدورة الخلوية، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (3)، بينما تمثل الوثيقة (4) تأثير العامل MDF على الظواهر الخلوية المرتبطة بعملية النمو.



الوثيقة (3)

الوثيقة (4)



1/ باستغلالك معطيات الوثائق، بين دور المركب MDF في عملية النمو مصادقا على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا.

موقع الدراسة
eddirasa.com

العرض الحال غير الكامل

ولاجابة "نعتذر"

الرقم		العلامة
الجزء الأول -1-	التمرين الرابع: 01: استغلال الوثيقة الوسط 01: في وجود Cycline وغياب CDK كانت نسبة النمو شبه منعدمة. الوسط 02: في وجود Cycline و CDK بنسبة متساوية كانت نسبة النمو مرتفعة في قيمة أعظمية تقدر بـ 100٪ الوسط 3,4: بعد توقف الخليتين فإن Cycline او CDK تظل بنسبة ثابتة متوسطة تقدر بـ 45٪, 50٪ الاستنتاج: يتشكل MDF في وجود Cy Cline و CDK و يحفز النمو	0,5 0,25
	اقتراح فرضيات يحفز MDF النمو في الخلية السامية التي تنظم في منطقتين مرستيمية واستطالة على الفرضيات المقترحة. الفرضية 1: يسبب تثبيط MDF بالعامل المعزز للنمو هو تحفيز تكاثر الخلايا في المنطقة المرستيمية.	0,5 (1)
	الفرضية 2: تسبب تثبيط MDF بالعامل المعزز للنمو هو تحفيز الخلايا على الاستطالة وزيادة ابعادها.	(1)
الجزء الثاني -2-	1- استغلال الوثيقة 03: يمثل المنحنى تحرر الكربون MDF خلال مراحل مختلفة من الدورة الخلوية يبدأ من الزمن حيث تلاحظ: الطور البيني: تلاحظ انخفاض تركيز MDF الى ان ينعدم في الزمن (t3, t4) في الانتصاف الطور: تلاحظ تزايد تركيز MDF الى ان يصل الى قيمة أعظمية تقدر بـ 85٪ الاستنتاج: تحفز مركب MDF حدوث الانقسام الخلوي المتساوي.	

موقع الدراسة
eddirasa.com